

PROSPECT

Advantage 80 soluție spot-on pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie
Advantage 40 soluție spot-on pentru pisici de talie mică și pentru iepuri-animale de companie

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania

Producător pentru eliberarea seriei: KVP, Pharma- und Veterinär-Produkte GmbH, Kiel, (Germania)

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Advantage 40 soluție spot-on pentru pisici de talie mică și pentru iepuri-animale de companie
Advantage 80 soluție spot-on pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie
Imidacloprid

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

Advantage pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie conține 10 % imidacloprid.

Fiecare doză (pipetă) de Advantage conține:

	Volum [ml]	Imidacloprid
Advantage pentru pisici de talie mică și pentru iepuri-animale de companie (≤ 4 kg)	0.4 ml	40 mg
Advantage pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie ($> 4-8$ kg)	0.8 ml	80 mg

Excipienți: 0,1 % butilhidroxitoluen (Ph Eur)(antioxidant), Alcool benzilic, Carbonat de propilen

4 INDICAȚII


Pentru prevenirea și tratamentul infestărilor cu purici la pisici.
Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament în cazul dermatitei alergice provocată de purici (FAD) la pisici.

Pentru prevenirea și tratamentul infestărilor cu purici la iepuri-animale de companie.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu tratați pisoi neînțărcați mai mici de 8 săptămâni de viață.
Nu tratați iepurii cu o vârstă mai mică de 10 săptămâni de viață.
A nu se utiliza la iepuri care sunt pentru consum uman.

6. REACȚII ADVERSE



Produsul are gust amar și ocazional, poate să apară salivăție dacă animalul linge zona de aplicare imediat după tratament. Acesta nu este un semn de intoxicație și dispare în câteva minute fără tratament (vezi și secțiunea 8 Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare).

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Schema de dozare:

Dozele minime recomandate sunt 10 mg/kg greutate vie imidacloprid echivalent cu 0.1ml/kg greutate vie Advantage pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie.

Schema de tratament este în funcție de situația epidemiologică locală.

Greutatea pisicii, iepurelui [kg]	Tipul de pipetă utilizat	Volum [ml]	Imidacloprid [mg/kg g.v.]
< 4 kg	Advantage pentru pisici de talie mică și pentru iepuri-animale de companie	0.4	Minim 10
≥ 4 kg	Advantage pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie	0.8	Maxim 20

Un tratament previne infestația cu purici timp de 4 săptămâni și până la o săptămână pentru iepuri-animale de companie.


Puștele din mediul înconjurător pot ecloziona timp de 6 luni sau o perioadă mai lungă după inițierea tratamentului, în funcție de condițiile climatice. De aceea uneori este necesar ca tratamentul cu Advantage să fie combinat cu dezinsecții ale mediului înconjurător pentru întreruperea ciclului de viață al puricilor prezenți aici. Rezultatul va fi reducerea mai rapidă a puricilor din zona unde trăiește animalul tratat.


Produsul trebuie administrat la interval de o lună la pisici în scopul prevenirii apariției dermatitei alergice provocată de purici.

Produsul rămâne eficient dacă animalul se udă de exemplu, după expunerea la ploii torențiale. Totuși, în funcție de gradul de infestare al mediului înconjurător, ar putea fi nevoie de un al doilea tratament. În acest caz, nu tratați mai frecvent de o dată pe săptămână.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ


Scoateți o pipetă din pachet. Țineți pipeta în poziție verticală, răsușiți și scoateți capacul. Întoarceți capacul invers și cu ajutorul lui desigilați pipeta (prin răsucire și apăsare asupra sigiliului, ca în fotografie).






Administrarea la pisici

Îndepărtați părul de pe gâtul pisicii la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă.



Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele.

Administrarea la iepuri



Îndepărtați părul de pe gâtul iepurelui la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă.

Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele.

Pentru toate speciile țintă

Aplicarea la baza craniului, reduce posibilitatea ca animalul să se lingă și să ingere produsul. Aplicați numai pe pielea sănătoasă fără leziuni.. Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă reciproc.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul, deoarece Advantage pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie nu se utilizează la animalele care produc alimente pentru consum uman.


11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A se păstra departe de apă, mâncare și hrană pentru animale.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE



Precauții speciale pentru utilizare la animale

Trebuie să asigurați măsuri de precauție deoarece conținutul pipetei sau doza aplicată nu trebuie să vină în contact cu ochii sau cu gura animalului.

Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă reciproc.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Spălați bine mâinile după aplicarea produsului.

Dacă produsul ajunge accidental pe piele spălați imediat zona cu săpun și apă.

Persoanele cunoscute cu piele sensibilă pot fi de asemenea sensibile și la acest produs.

Evitați contactul produsului cu ochii sau cu gura.

Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălați ochii cu multă apă.

Dacă simptomele cutanate sau oculare persistă sau produsul este înghițit accidental, consultați medicul.

Nu mâncați, nu beți, nu fumați în timpul aplicării produsului.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Ianuarie 2010


15. ALTE INFORMAȚII

Mărimea ambalajului	0,4 ml și 0,8 ml pentru o pipetă
Pipeta	Pipetă din polipropilenă albă cu capac înșurubat
Cutie de carton	Fiecare cutie conține un blister. Blister cu 2 pipete, doză unică. Blister cu 3 pipete, doză unică. Blister cu 4 pipete, doză unică. Blister cu 6 pipete, doză unică.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

S.C. Alapis România S.R.L., Str. Leordeni, nr. 13, Bragadiru, Ilfov, 077025, tel: +40 21 314 59 31



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Advantage 40 soluție spot-on pentru pisici de talie mică și pentru iepuri-animale de companie

Advantage 80 soluție spot-on pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Advantage pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie conține 10 % imidacloprid.

Fiecare doză (pipetă) de Advantage conține:

	Doza (pipetă)	Imidacloprid
Advantage pentru pisici de talie mică și pentru iepuri-animale de companie (≤ 4 kg)	0.4 ml	40 mg
Advantage pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie ($> 4-8$ kg)	0.8 ml	80 mg

Excipienți:

alcool benzilic,

0,1 % butilhidroxitoluen (E321: ca antioxidant).

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot-on.

Soluție limpede de culoare galbenă până la maroniu.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru prevenirea și tratamentul infestărilor cu purici la pisici.

Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament în cazul dermatitei alergice provocată de purici (FAD) la pisici.

Pentru prevenirea și tratamentul infestărilor cu purici la iepuri-animale de companie.

4.3 Contraindicații


Nu tratați pisoii neînțărcați mai mici de 8 săptămâni de viață.

Nu tratați iepurii cu o vârstă mai mică de 10 săptămâni de viață.

A nu se utiliza la iepuri care sunt pentru consum uman.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu sunt atenționări speciale pentru speciile țintă.



4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale.

Trebuie asigurate măsuri de precauție deoarece conținutul pipetei sau doza aplicată **nu trebuie să vină în contact** cu ochii sau cu gura animalului.

Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă reciproc.



Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.

Spălați bine mâinile după aplicarea produsului.

Dacă produsul ajunge accidental pe piele spălați imediat zona cu săpun și apă

Persoanele cunoscute cu piele sensibilă pot fi de asemenea sensibile și la acest produs.

Evitați contactul produsului cu ochii sau cu gura.

Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălați ochii cu multă apă.

Dacă simptomele cutanate sau oculare persistă sau produsul este înghițit accidental, consultați medicul.

Nu mâncați, nu beți, nu fumați în timpul aplicării produsului.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Produsul are gust amar și ocazional, poate să apară salivă dacă animalul linge zona de aplicare imediat după tratament. Acesta nu este un semn de intoxicație și dispare în câteva minute fără tratament (vezi și secțiunea 4.9 Cantități de administrat și calea de administrare).

4.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație

Nu au fost observate efecte negative asupra funcției de reproducere la șobolani. Studiile efectuate cu imidacloprid pe șobolani și iepuri nu au evidențiat efecte embrio-toxice și terato-toxice.

Studiile pe pisici gestante, pe cele care alăptează ca și pe puii lor sunt limitate. Rezultatele obținute până în prezent arată că nu apar efecte adverse la aceste animale.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu au fost observate incompatibilități între acest produs administrat în doză dublă și următoarele produse medicinale veterinare utilizate în mod frecvent: lufenuron, pirantel și praziquantel (pisică). A fost de asemenea demonstrată compatibilitatea produsului cu o gamă largă de tratamente de rutină aplicate în condiții de teren, inclusiv vaccinarea.


4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Schema de dozare:

Dozele minime recomandate sunt 10 mg/kg greutate vie imidacloprid echivalent cu 0.1ml/kg greutate vie Advantage pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie.

Schema de tratament este în funcție de situația epidemiologică locală.

Greutatea pisicii, iepurelui [kg]	Tipul de pipetă utilizat	Volum [ml]	Imidacloprid [mg/kg g.v.]
< 4 kg	Advantage pentru pisici de talie mică și pentru iepuri-animale de companie	0.4	Minim 10



> 4 kg	Avantage pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie	0.8	Maxim 20
--------	---	-----	----------

Un tratament previne infestația cu purici timp de 4 săptămâni și până la o săptămână pentru iepuri-animale de companie.


Pupele din mediul înconjurător pot ecloziona timp de 6 luni sau o perioadă mai lungă după inițierea tratamentului, în funcție de condițiile climatice. De aceea uneori este necesar ca tratamentul cu Advantage să fie combinat cu dezinsecții ale mediului înconjurător pentru întreruperea ciclului de viață al puricilor prezenți aici. Rezultatul va fi reducerea mai rapidă a puricilor din zona unde trăiește animalul tratat.

Produsul trebuie administrat la interval de o lună la pisici în scopul prevenirii apariției dermatitei alergice provocată de purici.

Produsul rămâne eficient dacă animalul se udă de exemplu, după expunerea la ploi torențiale. Totuși, în funcție de gradul de infestare al mediului înconjurător, ar putea fi nevoie de un al doilea tratament. În acest caz, nu tratați mai frecvent de o dată pe săptămână.


Metoda de administrare

Scoateți o pipetă din pachet. Țineți pipeta în poziție verticală, răsuciți și scoateți capacul. Întoarceți capacul invers și cu ajutorul lui desigilați pipeta (prin răsucire și apăsare asupra sigiliului, ca în fotografie).




Administrarea la pisici


Îndepărtați părul de pe gâtul pisicii la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă.



Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele.

Administrarea la iepuri





Îndepărtați părul de pe gâtul iepurelui la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă

Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele.

Pentru toate speciile țintă

Aplicarea la baza craniului, reduce posibilitatea ca animalul să se lingă și să ingere produsul. Aplicați numai pe pielea sănătoasă fără leziuni.. Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă reciproc.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

La pisici nu au fost observate reacții adverse nici când s-au utilizat doze de 5 ori mai mari decât doza terapeutică administrată săptămânal, timp de 8 săptămâni consecutiv.

La iepuri nu au fost observate reacții adverse nici când s-au utilizat doze de până la 45 mg/kg greutate vie (de patru ori nivelul terapeutic) administrate săptămânal timp de 4 săptămâni consecutiv.

Este puțin probabil ca animalele să se otrăvească prin ingerare accidentală. În acest caz se aplică tratament simptomatic sub supraveghere medicală veterinară. Nu există antidot specific, dar poate fi benefică administrarea de cărbune medicinal activ

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul, deoarece Advantage pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie nu se utilizează la animalele care produc alimente pentru consum uman.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE


Grupa farmacoterapeutică: alte ectoparazitare pentru uz topic ; codul veterinar ATC: QP53AX17

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Imidaclopridul posedă proprietăți farmacologice inedite. Această substanță are o afinitate crescută față de receptorii nicotinerfici de acetilcolină din regiunea postsinaptică a sistemului nervos central (SNC). Inhibiția continuă a transmisiei colinergice determină paralizia și moartea insectelor. Datorită interacțiunii scăzute cu receptorii nicotinerfici ai mamiferelor și penetrării scăzute a barierei hemato-encefalice, nu are practic nici un efect asupra SNC al mamiferelor. Activitatea farmacologică minimă la mamifere a fost demonstrată în urma studiilor efectuate prin administrarea sistemică la iepuri, șoareci și șobolani a unor doze subletale.

Studiile recente au demonstrat că pe lângă efectul distructiv asupra puricilor adulți, imidacloprid are și un efect de distrugere a larvelor de purici care se găsesc în zona unde se află animalul tratat. Stadiile larvare ale puricilor sunt distruse după ce vin în contact cu animalele tratate.

5.2 Particularități farmacocinetice



Calea de administrare a produsului este cea cutanată. După aplicarea topică (cutanată) soluția se distribuie rapid la nivelul dermului. Studiile cutanate făcute pe șobolani, supradozările la speciile țintă și testele sângvine, au demonstrat că absorbția sistemică este foarte scăzută, pasageră și nerelevantă pentru eficacitatea clinică. Acest lucru a fost demonstrat printr-un studiu în care pielea și blana au fost curățate de substanța activă iar puricii care s-au hrănit de pe aceste animale tratate anterior nu au murit.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Butilhidroxitoluen (Ph Eur)(antioxidant)

Alcool benzilic

Carbonat de propilen

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare 60 de luni

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A se păstra departe de apă, mâncare și hrană pentru animale.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Mărimea ambalajului 0,4 ml și 0,8 ml pentru o pipetă

Pipeta Pipetă din polipropilenă albă cu capac înșurubat

Cutie de carton Fiecare cutie conține un blister.
Blister cu 2 pipete, doză unică.
Blister cu 3 pipete, doză unică.
Blister cu 4 pipete, doză unică.
Blister cu 6 pipete, doză unică.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania


8. NUMERELE AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Advantage 40 - 060628

Advantage 80 - 060629

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Advantage 40 {05.04.2006}



Advantage 80 {05.04.2006}

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Ianuarie 2010

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.

10111
10101A



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Advantage 80 soluție spot-on pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie
Cutie de carton, cu 2, 3, 4, 6 pipete

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Advantage 80 soluție spot-on pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie
Imidacloprid

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Fiecare pipetă de 0,8 ml conține:

Substanțe active: 80 mg imidacloprid,
Alcool benzilic, 0,1 % butilhidroxitoluen (E321: ca antioxidant).

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot-on.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

2 pipete x 0,8 ml
3 pipete x 0,8 ml
4 pipete x 0,8 ml
6 pipete x 0,8 ml

5. SPECII ȚINTĂ

Pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie (>4kg)

6. INDICAȚII

Pentru prevenirea și tratamentul infestărilor cu purici la pisici.
Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament în cazul dermatitei alergice provocată de purici (FAD) la pisici.

Pentru prevenirea și tratamentul infestărilor cu purici la iepuri-animale de companie.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.


8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul, deoarece Advantage pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie nu se utilizează la animalele care produc alimente pentru consum uman.

9. ATENȚIONARE SPECIALĂ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII



EXP {lună/an}

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A se păstra departe de apă, mâncare și hrană pentru animale.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA

Numai pentru uz veterinar - produs eliberat numai cu prescripție medicală veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

060629

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}



**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ
PRIMAR**

Advantage 80 soluție spot-on pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie
Eticheta pipetei

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Advantage 80 soluție spot-on pentru pisici și pentru iepuri-animale de companie.

Imidacloprid

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Imidacloprid 100 mg/ml

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

0.8 ml

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Soluție spot-on

5. TIMP DE AȘTEPTARE

Timp de așteptare, nu este cazul.

6. NUMĂRUL SERIEI


Lot: {număr}

7. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.



INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII

Advantage 80 soluție spot-on pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie

Blister

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Advantage 80 soluție spot-on pentru pisici de talie mare și pentru iepuri-animale de companie

Imidacloprid

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE



3. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

4. NUMĂRUL SERIEI

{număr}

5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

