


SUMARUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

AMOXICRID 60 %



1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR:
AMOXICRID 60 % ,pulbere hidrosolubila pentru suine si broileri

2. COMPOZITIE CALITATIVA SI CANTITATIVA:

Fiecare gram de produs contine:

Substanta activa:

Amoxicilina trihidrat.....600 mg

Excipient add.....1 g

Pentru lista completa a excipientilor, vezi sectiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA:

Pulbere hidrosolubila

Pulbere omogena de culoare alba

4. PARTICULARITATI CLINICE:

4.1. Speciile tinta:

-broileri,

-suine,

4.2.Indicatii de utilizare la speciile tinta:

Broileri: in tratamentul colibacilozei si tratamentul afectiunilor respiratorii

Suine: in tratamentul dizenteriei si pasterurelozei porcine.

4.3.Contraindicatii:

Nu se administreaza in cazuri de hipersensibilitate la amoxicilina sau alte substante din grupa beta-lactaminelor.

4.4. Precautii speciale pentru fiecare specie tinta:

Pe toata perioada tratamentului animalele trebuie sa consume numai apa medicamentata sau furaj medicamentat.

Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniforma in toata masa acestuia.



4.5. Precautii speciale de utilizare:

Precautii speciale de utilizare la animale:

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate.

Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la doxiciclina și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa tetraciclinelor ca urmare a rezistenței încrucișate.

Ingerarea apei medicamentate și a furajului medicamentat de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a apei și furajului medicamentat se va revizui schema de tratament.

Apa de băut medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată, la fiecare 12 ore.

Precautii speciale pentru personalul care administrează produsul:

Produsul poate cauza iritarea tractului respirator și ochii în caz de inhalare sau contact.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul incorporării produsului în furaj și/sau când este administrat în apă. Personalul specializat trebuie să poarte ochelari de protecție și mască. În caz de contact cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă și săpun.

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manipularii produsului. După utilizare se spală mainile.

4.6. Reactii adverse:


Ocazional pot apărea reacții de hipersensibilitate.

4.7. Utilizare în perioada de gestație, lactație sau perioada de ouat.:

A nu se utiliza la animalele gestante.

4.8. Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu combinați cu alte antibiotice ca tetraciline, deoarece pot produce efect antagonic.



4.9. Cantitati de administrat si calea de administrare:

Tratamentul constă în administrarea produsului Amoxicrid 60%, pe cale orală, individual sau masal (prin încorporare în furaje sau în apa de baut), timp de 3-5 zile consecutiv, în doze diferite, în functie de specie, vârstă, greutate corporala, stare fiziologică si stare de sănătate. Pentru tratamentul masal, prin furaje sau apa de baut, recomandam calcularea corecta a greutății vii totale și a cantității de produs ce trebuie administrată, precum si prepararea de preamestecuri, pentru o omogenizare corecta.

- La suine: Trebuie asigurată o doza de 15-20 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 25-34 mg Amoxicrid 60% / kg g.v. / zi.

CATEGORIA	10-20 KG	21-40 KG	41-60 KG	61-80 KG	81-100 KG	SCROAFE ȘI SCROFIȚE ÎNAINTE ȘI DUPĂ MONTĂ.	SCROAFE ÎN LACTAȚIE.	VIERI
Necesar zilnic de apă	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
Amoxicrid 60% (gr /1000 L apa)	350 gr	350 gr	390 gr	445 gr	485 gr	610 gr	280 gr	700 gr
Necesar zilnic n.c.	0,7 kg	1,4 kg	2,2 kg	2,7 kg	3,0 kg	3,2 kg	5,5 kg	3,0 kg
Amoxicrid 60% (gr / to n.c.)	750 gr	750 gr	800 gr	900 gr	1000 gr	1450 gr	890 gr	1750 gr

- La păsări: Trebuie asigurată o doza de 15-20 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 25-34 mg Amoxicrid 60% / kg g.v. / zi.

CATEGORIA	BROILER 0 – 14 ZILE	BROILER 15 - 28 ZILE	BROILER 29 - 35 ZILE
Amoxicrid 60% (gr / 1000 L apa)	90 gr	170 gr	200 gr
Amoxicrid 60% (gr / to n.c.)	180 gr	340 gr	400 gr

4.10. Supradozare:

Nu depasiti doza recomandata.

4.11. Timp de asteptare:

Carne si organe:


Broileri : 7 zile

Suine : 7zile

5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE:

Grupa farmacoterapeutica: peniciline cu spectru larg

ATCvet code QJ01CA04



5.1 Proprietati farmacodinamice:

Amoxicilina este o penicilina semisintetica cu un spectru larg de activitate, asemanator ampicilinei, activa fata de microorganisme Gram pozitive si Gram negative: streptococi, stafilococi penicilino-negativi, bacillus anthracis, Corynebacterium spp, Clostridium spp, Brucella spp, Bordetella spp, Erysipelothrix rhusiopathie, Proteus mirabilis, Seratia macrescences.

Mecanismul de actiune se realizeaza prin inhibarea sintezei peptidoglicanului la nivelul membranei citoplasmatic. Activitatea antibacteriana este legata de difuzia prin peretele celular(caracter hidrofil), de absenta inductiei cromozomiale, a sintezei betalactamazei si de fixare pe tinte specifice.

5.2. Farmacocinetica:

Datorita liposolubilitatii sale, amoxicilina se raspandeste uniform in toate tesuturile organismului, concentratia maxima plasmatica se atinge in 1-2 ore si timpul de injumatatire este 1-1.5 ore.

Absorbtia ei nu este influentata de continutul alimentar. fiind stabila in sucul gastric este bine absorbita in tractusul gastrointestinal, obtinandu-se rapid concentratia sanguina terapeutica. Se metabolizeaza partial in ficat si se elimina in principal pe cale renala si prin urina, o mica paret prin bila si fecale.

6. PARTICULARITATI FARMACEUTICE:

6.1.Lista excipientilor:

Carbonat de sodiu anhidru

Citrat trisodic dihidrat


Dextroza monohidrat

6.2. Incompatibilitati:

Nu se cunosc..

6.3. Valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului asa cum este ambalat pentru vanzare: 2 ani;



Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile;

Perioada de valabilitate dupa reconstituirea in baut: 12 ore;

Perioada de valabilitate dupa incorporarea in furaj: 28 zile;

6.4. Precautii speciale de depozitare:

A nu se pastra la temperaturi mai mari de 25°C.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina directă.

6.5. Natura si compozitia ambalajului:

Natura ambalajului

Produsul este ambalat in : pungă x 25g, 50 g, 100 g, 1 kg din folie laminata Polietilena tereftalat/ Polietilena de joasa densitate.

Punga x 5 kg având forma de sticlă, din folie laminata Polietilena tereftalat/Folie aluminiu/ Polietilena de joasa densitate.

Saci x 10, 25, 50 kg.

400 pungi x 25 g

200 pungi x 50 g,

100 pungi x 100 g

15 pungi x 1 kg,

3 pungi x 5 kg

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje sa fie comercializate.

6.6. Precautii speciale pentru eliminarea produsului medicinal veterinar neutilizat sau a deseurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse :

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deseurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate in conformitate cu cerintele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Producatorul recomanda pentru evitarea contaminarii mediului ca dejectiile provenite de la animalele supuse tratamentelor sa fie administrate si inactivate in conformitate cu legislatia in vigoare.

7. DETINATORUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.

Str. Intrarea Vagonetului nr 2.BI 101, ap 47.Sector 6 Bucuresti.



Tel. +40 024 251 5005; Fax.+40 024 252 5925 Bucuresti, ROMANIA.


8. NUMARUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZARI/ REAUTORIZARI

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

11. INTERDICTII PENTRU VANZARE,ELIBERARE SI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Pungă x 25 g, 50 g, 100 g, 1 kg, din folie laminata Polietilena tereftalat/ Polietilena de densitate.

Punga x 5 kg având forma de sticlă, din folie laminata Polietilena tereftalat/folie alun Polietilena de joasa densitate.

Saci x 10 kg, 25 kg, 50 kg

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AMOXICRID 60% , pulbere hidrosolubila pentru broileri si suine.

Amoxicilina trihidrat

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Fiecare g de produs contine:

Substanta activa:

Amoxicilina trihidrat.....600 mg

Excipient add.....1 g

3. FORMA FARMACEUTICĂ

pulbere hidrosolubila

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Pungă x 25 g, 50g, 100 g, 1 kg, din folie laminata Polietilena tereftalat/ Polietilena de joasa densitate.

Punga x 5 kg având forma de sticlă, din folie laminata Polietilena tereftalat/folie aluminiu/ Polietilena de joasa densitate.


Saci x 10 kg, 25 kg 50 kg

5. SPECII ȚINTĂ

Pasari (broileri) si suine

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Cititi prospectul inainte de utilizare.



7. MOD ȘI CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Administrare în apă de baut și furaj
Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Broileri (carne și organe) : 7 zile
Suine (carne și organe): 7 zile

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare

10. DATA EXPIRĂRII

Perioada de valabilitate a produsului așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile

Perioada de valabilitate după reconstituire în apă de baut: 12 ore

Perioada de valabilitate după incorporarea în furaj: 28 zile

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C.

A nu se refrigera sau congela.

A se păstra în ambalajul original.


A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele naționale.



**13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII
SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz**

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

**14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA
COPILOR”**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

**15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE
COMERCIALIZARE**

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.

Str. Intrarea Vagonetului nr 2.BI 101, ap 47.Sector 6 Bucuresti.


Tel. +40 024 251 5005; Fax.+40 024 252 5925 Bucuresti, ROMANIA.

**16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE
COMERCIALIZARE**

-

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot { numar }



**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE DE CARTON**

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AMOXICRID 60% , pulbere hidrosolubila pentru broileri si suine.
Amoxicilina trihidrat

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Fiecare g de produs contine:

Substanta activa:

Amoxicilina trihidrat.....600 mg

Excipient add.....1 g

3. FORMA FARMACEUTICĂ

pulbere hidrosolubila

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Pungă x 50g, 100 g, 1 kg, din folie laminata Polietilena tereftalat/ Polietilena de joasa densitate.

Punga x 5 kg având forma de sticlă, din folie laminata Polietilena tereftalat/folie aluminiu/ Polietilena de joasa densitate.

400 pungi x 25 g

200 pungi x 50 g

100 pungi x 100 g

15 pungi x 1 kg,


3 pungi x 5 kg

5. SPECII ȚINTĂ

Pasari (broileri) si suine

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Cititi prospectul inainte de utilizare.



7. MOD ȘI CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Administrare în apă de băut și furaj

Citiți prospectul înainte de utilizare

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Broileri (carne și organe) : 7 zile

Suine(carne și organe): 7 zile

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare

10. DATA EXPIRĂRII

Perioada de valabilitate a produsului așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile

Perioada de valabilitate după reconstituire în apă de băut: 12 ore

Perioada de valabilitate după incorporarea în furaj: 28 zile

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C.

A nu se refrigera sau congela.

A se păstra în ambalajul original.


A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele naționale.



13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.

Str. Intrarea Vagonetului nr 2.BI 101, ap 47.Sector 6 Bucuresti.

Tel. +40 024 251 5005; Fax.+40 024 252 5925 Bucuresti, ROMANIA.

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

-

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot { numar }



PROSPECT

AMOXICRID 60 %

pulbere hidrosolubila pentru broileri si suine

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACA SUNT DIFERITI

S.C. CRIDA PHARM S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, Nr. 2, Bloc 101, Ap. 47, Parter, Sector 6, București, România. Punct de lucru Oltenița, Str. Stadionului, Nr. 1, Jud. Călărași.

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR:

AMOXICRID 60% , pulbere hidrosolubila pentru broileri si suine.

Amoxicilina trihidrat

3. DECLARAREA SUBSTANTEI ACTIVE SI A ALTOR INGREDIENTI

Fiecare gram de produs contine:

Substanta activa:

Amoxicilina trihidrat.....600 mg

Excipient add.....1 g

4. INDICATII:

Broileri: in tratamentul colibacilozei si tratamentul afectiunilor respiratorii

Suine: in tratamentul dizenteriei si pasterurelozei porcine.

5. CONTRAINDICATII:


Nu se administreaza in cazuri de hipersensibilitate la amoxicilina sau alte substante din grupa beta-lactaminelor.

6. REACȚII ADVERSE:

Ocazional pot aparea reactii de hipersensibilitate.

7. SPECII ȚINTĂ:

Suine și broileri



8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE:

Administrare: pe cale orala, in apa de baut si furaj.

Tratamentul constă în administrarea produsului Amoxicrid 60%, pe cale orală, individual sau masal (prin încorporare în furaje sau în apa de baut), timp de 3-5 zile consecutiv, în doze diferite, în functie de specie, vârstă, greutate corporala, stare fiziologică si stare de sănătate. Pentru tratamentul masal, prin furaje sau apa de baut, recomandam calcularea corecta a greutății vii totale și a cantității de produs ce trebuie administrată, precum si prepararea de preamestecuri, pentru o omogenizare corecta.

- La suine: Trebuie asigurată o doza de 15-20 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 25-34 mg Amoxicrid 60% / kg g.v. / zi.

CATEGORIA	10-20 KG	21-40 KG	41-60 KG	61-80 KG	81-100 KG	SCROAFE ȘI SCROFIȚE ÎNAINTE ȘI DUPĂ MONTĂ.	SCROAFE ÎN LACTAȚIE.	VIERI
Necesar zilnic de apă	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
Amoxicrid 60% (gr /1000 L apa)	350 gr	350 gr	390 gr	445 gr	485 gr	610 gr	280 gr	700 gr
Necesar zilnic n.c.	0,7 kg	1,4 kg	2,2 kg	2,7 kg	3,0 kg	3,2 kg	5,5 kg	3,0 kg
Amoxicrid 60% (gr / to n.c.)	750 gr	750 gr	800 gr	900 gr	1000 gr	1450 gr	890 gr	1750 gr

- La păsări: Trebuie asigurată o doza de 15-20 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 25-34 mg Amoxicrid 60% / kg g.v. / zi.


CATEGORIA	BROILER 0 – 14 ZILE	BROILER 15 - 28 ZILE	BROILER 29 - 35 ZILE
Amoxicrid 60% (gr / 1000 L apa)	90 gr	170 gr	200 gr
Amoxicrid 60% (gr / to n.c.)	180 gr	340 gr	400 gr

Consumul de apa medicamentata si de furaj depinde de starea clinica a animalelor. Pentru a obtine o doza corecta, concentratia de amoxicilina trebuie ajustata corespunzator.

9. ATENȚIONĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura un dozaj corespunzător, se va determina cât mai exact greutatea corporală pentru a se evita subdozarea sau supradozarea

Consumul de apa si furaj trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantat dozajul adecvat. In cazul in care consumul de apa si furaj nu corespunde cantitatilor pentru care au fost calculate concentratiile recomandate, concentratia de AMOXICRID60% trebuie adaptata astfel incat animalele sa asimileze doza recomandata, în caz contrar trebuind să fie luata în considerare o alta medicatie.



10 TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne și organe porc: 7 zile

Carne și organe broileri: 7 zile

Nu este autorizată utilizarea la pasarile care produc oua pentru consum uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C.

A nu se refrigera sau congela.

A se păstra în ambalajul original.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumină directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE):

Pe toată perioada tratamentului animalele trebuie să consume numai apă medicamentată sau furaj medicamentat.

Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia.

Precauții speciale de utilizare la animale:

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate.

Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la doxiciclina și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa tetraciclinelor ca urmare a rezistenței încrucișate.


Ingerarea apei medicamentate și a furajului medicamentat de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a apei și furajului medicamentat se va revizui schema de tratament.

Apă de băut medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată, la fiecare 12 ore.

Precauții speciale pentru personalul care administrează produsul:

Produsul poate cauza iritarea tractului respirator și ochii în caz de inhalare sau contact.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție în timpul incorporării produsului în furaj și/sau când este administrat în apă. Personalul specializat trebuie să poarte ochelari de protecție și mască. În caz de contact cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă și săpun.



A nu se mananca, bea sau fuma in timpul manipularii produsului. Dupa utilizare se spala mainile.
prezintă simptome severe și necesită asistență medicală de urgență.

Reactii adverse:

Ocazional pot aparea reactii de hipersensibilitate.

Utilizare in perioada de gestatie sau perioada de ouat:

A nu se utiliza la animalele gestante.

Interactiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interactiune:

Nu combinati cu alte antibiotice ca tetraciline, deoarece pot produce efect antagonic.

Supradozare:

Nu depasiti doza recomandata.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deseurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:

În conformitate cu prevederile I.C.B.M.V. București.


15. ALTE INFORMAȚII:

Produsul este ambalat in : pungă x 25g, 50 g, 100 g, 1 kg din folie laminata Polietilena tereftalat/ Polietilena de joasa densitate.

Punga x 5 kg având forma de sticlă, din folie laminata Polietilena tereftalat/Folie aluminiu/ Polietilena de joasa densitate.

Saci x 10 kg, 25 kg, 50 kg

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.



S.C. CRIDA PHARM S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, Nr. 2, Bloc 101, Ap. 47, Parter,
Sector 6, București, România. Punct de lucru Oltenița, Str. Stadionului, Nr. 1, Jud. Călărași.

Rugam însoțiți orice reclamație cu numărul seriei înscris pe eticheta.

