



PROSPECTUL PRODUSULUI

50 ML, 250 ML, 1L, 5L

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Detinatorul autorizatiei de comercializare:

SC Maravet SRL-, dr. Korponay F.

RO-430000, Str. Europa nr. 9

Baia Mare, Romania

Tel/Fax: +40 262 211 964

Responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

LABORATORIOS KARIZOO, S.A.

Poligono Industrial La Borda

Mas Pujades, 11-12

08140- CALDES DE MONTBUI (Barcelona)

Spania

6. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

11. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml contine:

Substanta activa:

Enrofloxacin.....100 mg

Excipienti:

Alcool benzilic (E 1519)

Hidroxid de potasiu

12. FORMA FARMACEUTICA

Solutie orala.

5. SPECII TINTA

Pui si curcani.

10. INDICATII

Enrofloxacin este un bactericid antimicrobian sintetic cu spectru larg de actiune impotriva unei game largi de bacterii gram negative si gram pozitive cat si impotriva micoplasmelor. Este eficienta impotriva bolilor tractului respirator si digestiv de origine bacteriana sau micoplasmatice la pui si curcani (ex.: pasteureloza, micoplasmoza, colibaciloza si salmoneloza), cazuri in care examenele clinice, testele de sensibilitate, indica Enrofloxacinul ca cel mai indicat medicament.

7. SPECII ȚINTĂ

Pui si curcani.

8. REACTII ADVERSE

Nu exista.



[Handwritten signature]

9. CONTRAINDICAȚII

Nu este permisă utilizarea la pasările ouătoare care produc oua pentru consum uman.

ANKA-FLOXACIN 10% Soluție orală nu trebuie utilizată pentru profilaxie.

10. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare orală în apă de băut. Această soluție poate fi pusă direct în adapatoare sau rezervoarele de apă.

Dozare:

50 ml de ANKA-FLOXACIN 10% per 100 litri apă sau 10 mg de ingredient activ/ kg greutate corporală vie/ zi. Tratamentul trebuie continuat timp de 3 zile. Pentru tratarea salmonelozei tratamentul poate fi extins până la 5 zile.

Apă medicamentată va fi singura sursă pe toată perioada tratamentului. Nu se va folosi altă sursă de apă.

11. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie golite și curățate și reumplute cu apă curată înainte de a adăuga soluția ANKA-FLOXACIN 10%. Mixtura obținută trebuie agitată foarte bine.

16. TIMP DE AȘTEPTARE

În perioada tratamentului pasările nu pot fi sacrificate pentru consum uman.

Puii nu pot fi sacrificați pentru consum uman până la 3 zile după ultimul tratament.

Curcanii nu pot fi sacrificați pentru consum uman până la 3 zile după ultimul tratament.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

14. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie inspectate la intervale de timp regulate pentru a constata prezența prafului, formării de alge și sedimente.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtate mănuși. A se spăla imediat orice strop de pe piele și ochi. Spălați-vă pe mâini imediat după utilizare. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării acestui produs.

15. VALABILITATE

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar:

3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare:

24 ore.

16. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

17. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

22. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru uz veterinar!

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!



[Handwritten signature]



Impozitat
Maravet SRL-, dr. Korponay F.
430006, Str. Europa nr. 9
Bila Mare, Romania
Tel/Fax: 40 262 211 964



Korponay F.

VERIFICAT
h. Oprisan George
H.



Rezumatul Caracteristicilor Produsului

NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANKA-FLOXACIN 10%

Soluție Orală pentru pui și curcani.

2. COMPOZITIE CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml conține:

Substanțe active:

Enrofloxacin..... 100 mg

Excipienți:

Alcool benzilic (E 1519)

Pentru lista completă a excipienților, vezi sect. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție orală.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii Tinta

Pui și curcani.

4.2 Indicații pentru utilizare

Enrofloxacin este un antimicrobian bactericid sintetic cu spectru larg de acțiune împotriva unei game largi de bacterii gram negative și gram pozitive cât și împotriva micoplasmelor. Este eficientă împotriva bolilor tractului respirator și digestiv de origine bacteriană sau micoplasmatică la pui și curcani (ex.: pasteureloza, micoplasmoză, colibaciloza și salmoneloza), cazuri în care examenele clinice, testele de sensibilitate, indică Enrofloxacină ca cel mai indicat medicament.

4.3 Contraindicații

Nu este permisă utilizarea la pasările ouătoare care produc oua pentru consum uman.

ANKA-FLOXACIN 10% Soluție orală nu trebuie utilizată pentru profilaxie.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie tinta

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale.

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie golite și curățate și reumplute cu apă curată înainte de a adăuga soluția ANKA-FLOXACIN 10%. Mixtura obținută trebuie agitată foarte bine.

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie inspectate la intervale de timp regulate pentru a constata prezența sau formării de alge și sedimente.



[Signature]

Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtate manusi. A se spala imediat orice strop de produs pe pielea si ochi. Spalati-va pe maini imediat dupa utilizare. A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizarii acestui produs.

4.6. Reactii adverse

Nu exista.

4.7 Utilizarea in perioada de gestatie, lactatie sau in perioada de ouat:

Nu este aplicabil.

4.8 Interactiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interactiune:

Nu se cunosc.

4.8 Cantitati de administrat si calea de administrare:

Administrare orala în apa de baut. Aceasta solutie poate fi pusa direct în adapatoare sau rezervoarele de apa.

Dozare:

50 ml de ANKA-FLOXACIN 10% per 100 litri apa sau 10mg de ingredient activ/ kg greutate corporala vie/ zi.

Tratamentul trebuie continuat timp de 3 zile. Pentru tratarea salmonelozei tratamentul poate fi extins pana la 5 zile.

Apa medicamentata va fi singura sursa pe toata perioada tratamentului. Nu se va folosi alta sursa de apa.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi), dupa caz:

A nu se depasi doza recomandata. In caz de supradozare accidentala nu exista antidot iar tratamentul trebuie sa fie simptomatic.

4.11 Timp de asteptare:

In perioada tratamentului pasarile nu pot fi sacrificate pentru consum uman.

Puii nu pot fi sacrificati pentru consum uman pana la 3 zile dupa ultimul tratament.

Curcanii nu pot fi sacrificati pentru consum uman pana la 3 zile dupa ultimul tratament.

5 PROPRIETATI FARMACOLOGICE, IMUNOLOGICE

Grupa farmacoterapeutica: Fluoroquinolone

ATC vet cod: QJ01MA90

5.1 Proprietati farmacodinamice

Enrofloxacină este o substanță antimicrobiană sintetică cu spectru larg de acțiune, aparținând grupului de antibiotice fluoroquinolone. Ea are o acțiune bactericidă împotriva bacteriilor Gram-pozitive, Gram-negative și micoplasmelor. Mecanismul de acțiune al quinolonelor este unic în rândul antibioticelor – ele acționează în principal prin inhibarea ADN girazei bacteriene, o enzimă responsabilă pentru controlul dublului helix al ADN-ului bacterian, în timpul replicării. Realizarea dublului helix este inhibată realizând o degradare ireversibilă a ADN-ului cromozomial. De asemenea, fluoroquinolonele acționează împotriva bacteriilor în faza staționară, prin alterarea permeabilității membranei fosfolipidice a peretelui celular.



[Handwritten signature]



5.2 Particularitati farmacocinetice

Proprietățile farmacocinetice ale enrofloxacinii administrate oral și parenteral demonstrează existența de nivele similare. Enrofloxacină are un volum mare de distribuție. Nivelele tisulare sunt de 2-3 ori mai mari decât cele din ser și au fost demonstrate pe animalele de laborator și speciile tinta. Organele în care se regăsesc nivele de enrofloxacină sunt: pulmoni, ficat, rinichi, piele, oase și sistem limfatic. De asemenea, enrofloxacină este distribuită în fluidul cerebrospinal și în umorile apoase.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

Alcool benziic (E 1519)
Hidroxid de potasiu
Apa purificată.

6.2 Incompatibilitati

Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare:	36 luni.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar:	3 luni.
Perioada de valabilitate după diluare:	24 ore.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Containere albe din polietilenă cu densitate ridicată de patru feluri: 50 ml – flacoane, 250 ml – flacoane, 1 L – flacoane și 5 L- bidoane. Containerele sunt sigilate, cu capac rasucibil din același material ca discul de inducție.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor neutilizate și a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7 DETINATORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

SC Maravet SRL-, dr. Korponay F.
RO-430000, Str. Europa nr. 9
Baia Mare, România
Tel/Fax: +40 262 211 964

8 NUMARUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9 DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/ REINNOIRII AUTORIZAȚIEI

10 DATA REVIZUIRII TEXTULUI

INTERDICȚII PENTRU VANZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

nu este cazul.



VERIFICAT
M. Oprisan George
H.



ETICHETA PRODUSULUI

50 ML

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

**DETINATORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A
DETINATORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA
SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Detinatorul autorizatiei de comercializare:

SC Maravet SRL-, dr. Korponay F.
RO-430000, Str. Europa nr. 9
Baia Mare, Romania
Tel/Fax: +40 262 211 964

Responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

LABORATORIOS KARIZOO, S.A.
Poligono Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140- CALDES DE MONTBUI (Barcelona)
Spania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE
(INGREDIENTI)**

1 ml contine:

Substanta activa:

Enrofloxacin.....100 mg

Excipienti:

Alcool benzilic (E 1519)
Hidroxid de potasiu

4. FORMA FARMACEUTICA

Solutie orala.

5. SPECII TINTA

Pui si curcani.

6. INDICATII

Enrofloxacin este un bactericid antimicrobian sintetic cu spectru larg de actiune impotriva unei game largi de bacterii gram negative si gram pozitive cat si impotriva micoplasmelor. Este eficienta impotriva bolilor tractului respirator si digestiv de origine bacteriana sau micoplasmatica la pui si curcani (ex.: pasteureloza, micoplasmoza, colibaciloza si salmoneloza), cazuri in care examenele clinice, testele de sensibilitate, indica Enrofloxacinul ca cel mai indicat medicament.

7. SPECII ȚINTĂ

Pui si curcani.

8. REACTII ADVERSE

Nu exista.



9. CONTRAINDICATII

Nu este permisa utilizarea la pasarile ouatoare care produc oua pentru consum uman.

ANKA-FLOXACIN 10% Solutie orala nu trebuie utilizata pentru profilaxie.

10. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare orala în apa de baut. Aceasta solutie poate fi pusa direct in adapatoare sau rezervoarele de apa.

Dozare:

50 ml de ANKA-FLOXACIN 10% per 100 litri apa sau 10 mg de ingredient activ/ kg greutate corporala vie/ zi.

Tratamentul trebuie continuat timp de 3 zile. Pentru tratarea salmonelozei tratamentul poate fi extins pana la 5 zile.

Apa medicamentata va fi singura sursa pe toata perioada tratamentului. Nu se va folosi alta sursa de apa.

11. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Inainte de utilizare, rezervoarele de apa trebuie golite si curatate si reumplute cu apa curata inainte de a adauga solutia ANKA-FLOXACIN 10%. Mixtura obtinuta trebuie agitata foarte bine.

12. TIMP DE AȘTEPTARE

In perioada tratamentului pasarile nu pot fi sacrificate pentru consum uman.

Puii nu pot fi sacrificati pentru consum uman pana la 3 zile dupa ultimul tratament.

Curcanii nu pot fi sacrificati pentru consum uman pana la 3 zile dupa ultimul tratament.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesita conditii speciale de depozitare.

14. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Inainte de utilizare, rezervoarele de apa trebuie inspectate la intervale de timp regulate pentru a constata prezenta prafului, formarii de alge si sedimente.

La manipulara produsului medicinal veterinar trebuie purtate manusi. A se spala imediat orice strop de pe piele si ochi. Spalati-va pe maini imediat dupa utilizare. A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizarii acestui produs.

15. VALABILITATE

Perioada de valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului primar:

3 luni.

Perioada de valabilitate dupa diluare:

24 ore.

16. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deseu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate in conformitate cu cerintele locale.

17. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

18. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru uz veterinar!

A nu se lasa la indemana copiilor!



VERIFICAT
A. Oprisan George Ia
H.



ETICHETA PRODUSULUI

250 ML

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

I. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Detinatorul autorizatiei de comercializare:

SC Maravet SRL-, dr. Korponay F.
RO-430000, Str. Europa nr. 9
Baia Mare, Romania
Tel/Fax: +40 262 211 964

Responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

LABORATORIOS KARIZOO, S.A.
Poligono Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140- CALDES DE MONTBUI (Barcelona)
Spania

3. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

5. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml contine:

Substanta activa:

Enrofloxacin.....100 mg

Excipienti:

Alcool benzilic (E 1519)
Hidroxid de potasiu

6. FORMA FARMACEUTICA

Solutie orala.

5. SPECII TINTA

Pui si curcani.

7. INDICATII

Enrofloxacin este un bactericid antimicrobian sintetic cu spectru larg de actiune impotriva unei game largi de bacterii gram negative si gram pozitive cat si impotriva micoplasmelor. Este eficienta impotriva bolilor tractului respirator si digestiv de origine bacteriana sau micoplasmatica la pui si curcani (ex.: pasteureloza, micoplasmoza, colibaciloza si salmoneloza), cazuri in care examenele clinice, testele de sensibilitate, indica Enrofloxacinul ca cel mai indicat medicament.

7. SPECII ȚINTĂ

Pui si curcani.

8. REACTII ADVERSE

Nu exista.



Korponay F.

9. CONTRAINDICAȚII

Nu este permisă utilizarea la pasările ouătoare care produc oua pentru consum uman.

ANKA-FLOXACIN 10% Soluție orală nu trebuie utilizată pentru profilaxie.

10. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare orală în apă de băut. Această soluție poate fi pusă direct în adapatoare sau rezervoarele de apă.

Dozare:

50 ml de **ANKA-FLOXACIN 10%** per 100 litri apă sau 10 mg de ingredient activ/ kg greutate corporală vie/ zi.

Tratamentul trebuie continuat timp de 3 zile. Pentru tratarea salmonelozei tratamentul poate fi extins până la 5 zile.

Apă medicamentată va fi singura sursă pe toată perioada tratamentului. Nu se va folosi altă sursă de apă.

11. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie golite și curățate și reumplute cu apă curată înainte de a adăuga soluția **ANKA-FLOXACIN 10%**. Mixtura obținută trebuie agitată foarte bine.

13. TIMP DE AȘTEPTARE

În perioada tratamentului pasările nu pot fi sacrificate pentru consum uman.

Puii nu pot fi sacrificați pentru consum uman până la 3 zile după ultimul tratament.

Curcanii nu pot fi sacrificați pentru consum uman până la 3 zile după ultimul tratament.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

14. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie inspectate la intervale de timp regulate pentru a constata prezența prafului, formării de alge și sedimente.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtate măști. A se spăla imediat orice strop de pe piele și ochi. Spălați-vă pe mâini imediat după utilizare. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării acestui produs.

15. VALABILITATE

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar:

3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare:

24 ore.

16. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

17. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

19. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru uz veterinar!

A nu se lăsa la îndemana copiilor!



VERIFICAT
M. Oprisan George
H.



1 L

ETICHETA PRODUSULUI

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

I. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Detinatorul autorizatiei de comercializare:

SC Maravet SRL-, dr. Korponay F.

RO-430000, Str. Europa nr. 9

Baia Mare, Romania

Tel/Fax: +40 262 211 964

Responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

LABORATORIOS KARIZOO, S.A.

Poligono Industrial La Borda

Mas Pujades, 11-12

08140- CALDES DE MONTBUI (Barcelona)

Spania

4. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

7. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml contine:

Substanta activa:

Enrofloxacin.....100 mg

Excipienti:

Alcool benzilic (E 1519)

Hidroxid de potasiu

8. FORMA FARMACEUTICA

Solutie orala.

5. SPECII TINTA

Pui si curcani.

8. INDICATII

Enrofloxacin este un bactericid antimicrobian sintetic cu spectru larg de actiune impotriva unei game largi de bacterii gram negative si gram pozitive cat si impotriva micoplasmelor. Este eficienta impotriva bolilor tractului respirator si digestiv de origine bacteriana sau micoplasmatica la pui si curcani (ex.: pasteureloza, micoplasmoza, colibaciloza si salmoneloza), cazuri in care examenele clinice, testele de sensibilitate, indica Enrofloxacinui ca cel mai indicat medicament.

7. SPECII ȚINTĂ

Pui si curcani.

8. REACTII ADVERSE

Nu exista.



Korponay F.

9. CONTRAINDICAȚII

Nu este permisă utilizarea la pasările ouătoare care produc oua pentru consum uman.

ANKA-FLOXACIN 10% Soluție orală nu trebuie utilizată pentru profilaxie.



10. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare orală în apă de băut. Aceasta soluție poate fi pusă direct în adapatoare sau rezervoarele de apă.

Dozare:

50 ml de **ANKA-FLOXACIN 10%** per 100 litri apă sau 10 mg de ingredient activ/ kg greutate corporală vie/ zi.

Tratamentul trebuie continuat timp de 3 zile. Pentru tratarea salmonelozei tratamentul poate fi extins până la 5 zile.

Apă medicamentată va fi singura sursă pe toată perioada tratamentului. Nu se va folosi altă sursă de apă.

11. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie golite și curățate și reumplute cu apă curată înainte de a adăuga soluția **ANKA-FLOXACIN 10%**. Mixtura obținută trebuie agitată foarte bine.

14. TIMP DE AȘTEPTARE

În perioada tratamentului pasările nu pot fi sacrificate pentru consum uman.

Puii nu pot fi sacrificați pentru consum uman până la 3 zile după ultimul tratament.

Curcanii nu pot fi sacrificați pentru consum uman până la 3 zile după ultimul tratament.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

14. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie inspectate la intervale de timp regulate pentru a constata prezența prafului, formării de alge și sedimente.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtate măști. A se spăla imediat orice strop de pe piele și ochi. Spălați-vă pe mâini imediat după utilizare. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării acestui produs.

15. VALABILITATE

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar:

3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare:

24 ore.

16. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

17. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

20. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru uz veterinar!

A nu se lăsa la îndemana copiilor!



[Signature]

VERIFICAT
M. Oprisan George
H.



5 L

ETICHETA PRODUSULUI

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

I. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținatorul autorizației de comercializare:

SC Maravet SRL-, dr. Korponay F.
RO-430000, Str. Europa nr. 9
Baia Mare, Romania
Tel/Fax: +40 262 211 964

Responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

LABORATORIOS KARIZOO, S.A.
Poligono Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140- CALDES DE MONTBUI (Barcelona)
Spania

5. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANKA-FLOXACIN 10%

Solutie Orala pentru pui si curcani.

9. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml contine:

Substanta activa:

Enrofloxacin.....100 mg

Excipienti:

Alcool benzilic (E 1519)
Hidroxid de potasiu

10. FORMA FARMACEUTICA

Solutie orala.

5. SPECII TINTA

Pui si curcani.

9. INDICATII

Enrofloxacin este un bactericid antimicrobian sintetic cu spectru larg de actiune impotriva unei game largi de bacterii gram negative si gram pozitive cat si impotriva micoplasmelor. Este eficienta impotriva bolilor tractului respirator si digestiv de origine bacteriana sau micoplasmatica la pui si curcani (ex.: pasteureloza, micoplasmoza, colibaciloza si salmoneloza), cazuri in care examenele clinice, testele de sensibilitate, indica Enrofloxacinul ca cel mai indicat medicament.

7. SPECII ȚINTĂ

Pui si curcani.

8. REACTII ADVERSE

Nu exista.



Korponay F

9. CONTRAINDICAȚII

Nu este permisă utilizarea la pasările ouătoare care produc oua pentru consum uman.

ANKA-FLOXACIN 10% Soluție orală nu trebuie utilizată pentru profilaxie.

10. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare orală în apă de băut. Această soluție poate fi pusă direct în adapatoare sau rezervoarele de apă.

Dozare:

50 ml de ANKA-FLOXACIN 10% per 100 litri apă sau 10 mg de ingredient activ/ kg greutate corporală vie/ zi.

Tratamentul trebuie continuat timp de 3 zile. Pentru tratarea salmonelozei tratamentul poate fi extins până la 5 zile.

Apă medicamentată va fi singura sursă pe toată perioada tratamentului. Nu se va folosi altă sursă de apă.

11. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie golite și curățate și reumplute cu apă curată înainte de a adăuga soluția ANKA-FLOXACIN 10%. Mixtura obținută trebuie agitată foarte bine.

15. TIMP DE AȘTEPTARE

În perioada tratamentului pasările nu pot fi sacrificate pentru consum uman.

Puii nu pot fi sacrificați pentru consum uman până la 3 zile după ultimul tratament.

Curcanii nu pot fi sacrificați pentru consum uman până la 3 zile după ultimul tratament.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

14. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Înainte de utilizare, rezervoarele de apă trebuie inspectate la intervale de timp regulate pentru a constata prezența prafului, formării de alge și sedimente.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtate mănuși. A se spăla imediat orice strop de pe piele și ochi. Spălați-vă pe mâini imediat după utilizare. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării acestui produs.

15. VALABILITATE

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar:

3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare:

24 ore.

16. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

17. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

21. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru uz veterinar!

A nu se lăsa la îndemana copiilor!



VERIFICAT
M. Oprisan George
H.

