



SUMARUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANTIPOUX MD 100 mg / ml, soluție spot on pentru câini și pisici

2. Compoziția cantitativă și calitativă

1 ml soluție conține:

Substanța activă:

Fipronil 100 mg

Excipienți:

Butilhidroxitoluen (E321) 1 mg

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot on, limpede, incoloră, până la slab gălbuie.


4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Câini și pisici

4.2 Indicații pentru utilizare cu specificarea speciilor tinta

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), păduchi malofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) și căpușe (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*, *Amblyomma spp.*) la câini și pisici.



Eficacitatea produsului, împotriva unor noi infestații cu purici adulți, persistă până la 8 săptămâni la câine și 30 zile la pisică. Eficacitatea produsului împotriva căpușelor și a păduchilor este de circa 4 săptămâni.

Poate fi utilizat și ca parte a strategiei de tratament pentru dermatita alergică produsă de înțepăturile puricilor.

4.3 Contraindicații

Nu se utilizează la iepuri, pot apare reacții severe la această specie. Nu se administrează în caz de hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau oricare dintre excipienți.

Nu se administrează la animalele bolnave sau aflate în convalescență.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie

Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea administrării tratamentului.

Nu aplicați produsul pe răni sau pe pielea cu leziuni.

Se va evita îmbăierea/șamponarea animalului tratat timp de două zile de la aplicarea produsului.

4.5 Precauții pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Se va evita administrarea produsului la animale mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică de 1 kg.

A se evita contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii clătiți imediat cu multă apă.



Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura și ochii trebuie evitat.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul cu produsul.

Evitați contactul degetelor cu produsul.

În cazul expunerii accidentale a ochilor, aceștia se vor clăti cu apă curată..

Spălați-vă mâinile după utilizarea produsului.

A nu se fuma, bea sau mânca în timpul aplicării produsului.

Animalele tratate nu vor fi manipulate până când locul de aplicare nu este uscat.

Copiii nu se vor juca cu animalele tratate, până când locul de aplicare nu este complet uscat.

4.6 Reacții adverse(frecvența și gravitate)


Printre reacțiile adverse rare, au fost raportate reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau alopecie. În mod excepțional, au fost observate hipersalivație, semne neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă perioadă pot fi observate fenomene de hipersalivație temporară.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Studiile de laborator nu au arătat că fipronilul ar avea efecte teratogene sau embriotoxice.

Nu există date disponibile legate de siguranța produsului la animale aflate în perioada de gestație și lactație. Prin urmare produsul se va utiliza în aceste





perioade în conformitate cu evaluarea balanței risc/beneficiu realizată de medicul veterinar responsabil.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

4.9. Cantități de administrat și calea de administrare


Dozele recomandate sunt:

Pisica: 7,5 mg – 15 mg fipronil/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml

Antipoux MD/pisică.

Câine: max 13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/4 kg.

Greutate corporală	Doza ANTIPOUX MD de administrat
0 - 4 kg	0,5 ml
4 – 8 kg	1 ml
8 -12 kg	1,5 ml
12 – 16 kg	2 ml
16 – 20 kg	2,5 ml
20 – 24 kg	3 ml
24 – 28 kg	3,5 ml
28 – 32 kg	4 ml
32 – 36 kg	4,5 ml
36 – 40 kg	5 ml





Mod de administrare:

Produsul se aplică la baza cefei, între omoplați, într-unul sau mai multe locuri, la distanță de 2-3 cm unul de celălalt la animalele mai mari..

Se desparte blana animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se rotește inelul de pe piston la semnul corespunzător greutății animalului.

Trebuie să vă asigurați că aplicarea produsului se face într-o zonă în care animalul nu se poate linge, și că animalele nu se ling între ele după tratament. Se va evita umezirea excesivă a blănii animalului cu produsul, deoarece acest lucru poate provoca un aspect lipicios al părului la locul de tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, acesta va dispărea ulterior în 24 – 48 ore de la aplicare.

4.10 Supradozare(simptome, proceduri de urgență,antidoturi) după caz

Pisici

Nu au fost observate efecte adverse în studii de siguranță realizate la pisici în vârstă de 8 săptămâni și mai mari în greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu o doză, de cinci ori doza recomandată, timp de șase luni consecutiv.


Câini:

Nu au fost observate efecte adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 săptămâni și mai mari în greutate de 2 kg tratați cu o doză, de cinci ori doza recomandată. Riscul de apariție a efectelor adverse poate totuși crește la supradozaj
Nu se va depăși doza recomandată.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.





5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide pentru utilizare topică, inclusiv insecticide.

Codul veterinar ATC :QP53AX15

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Fipronilul aparține familiei fenilpirazolelor și acționează ca insecticid și acaricid. Fipronilul acționează asupra sistemului nervos central al insectelor prin blocarea transferului ionilor de clor datorită inhibării exercitate la nivelul receptorilor GABA(γ -aminobutiric acid). Aceasta duce la hiperexcitație și în final la moartea ectoparazitului. Afinitatea crescută a fipronilului pentru receptorii GABA ai insectelor și slaba afinitate pentru receptorii mamiferelor conferă o marjă suplimentară de siguranță produsului.

5.2 Particularități farmacocinetice


Absorbția:

După administrarea produsului, cantitatea de fipronil absorbită la nivelul pielii este mică. Cantități mici de fipronil pot fi detectate la nivelul plasmii, cantitățile variază foarte mult de la un animal la altul.

Distribuirea: După aplicarea topică, produsul se răspândește pornind din locul aplicării pe toată suprafața pielii în 24 de ore. Un gradient de concentrație de fipronil se instaurează la nivelul blanei animalului, distribuindu-se treptat din zona de aplicare către zonele periferice (zona lombară, zonele laterale)

Biotransformare:

Fipronil este metabolizat mai ales în derivați sulfonă care au de asemenea proprietăți insecticide și acaricide.



Eliminarea:cu timpul concentrația de fipronil de la nivelul blanei descrește până atinge nivelul de 3-4 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ la 56 de zile după adiministrarea la câini.

6. Particularitati farmaceutice

6.1 Lista excipientilor:

Butilhidroxitoluen(E321)

Etanol anhidru

Dietilenglicol monoetileter

Propilenglicol

6.2 Incompatibilități majore

Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.

6.4 Precautii speciale de depozitare

A se păstra la temperatura mai mică de 25°C.


A se păstra în loc uscat


A se păstra în ambalajul original

6.5 Natura și compozitia ambalajului primar

Seringă din polietilenă de joasă densitate de 14 ml prevăzută cu: corp, piston, inel de strângere, capac de protecție din polipropilenă.

Ambalaj secundar: cutie de carton x 12 seringi de 14 ml.





6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor, după caz

Fipronil poate fi dăunător pentru organismele acvatice.

Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu ambalajul utilizat al acestuia.

Câinii tratați nu vor fi lăsați să înoate în lacuri.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DETINATORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:

S.C. VANELLI S.R.L.

Strada Iași- Târgu Frumos Km 10,

Sat Lețcani, Comuna Lețcani ,707280

Jud. Iași, Romania

Tel.: 40 232 253 442

E-mail: office@vanellivet.ro www.vanellivet.ro

8. NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI /REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

16.07.2015

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI


Iulie 2020

INTERDICȚII PENTRU VANZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul



ETICHETA ȘI PROSPECT



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton x 12 seringi de 14 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANTIPOUX MD 100 mg/ml, soluție spot on pentru câini și pisici

Fipronil

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

1 ml soluție conține:

Substanța activă:

Fipronil 100 mg

Excipienți:

Butilhidroxitoluen (E321) 1 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot on.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Cutie de carton cu 12 seringi x14 ml


5. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

6. INDICATIE(INDICAȚII)

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), păduchi malofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) și căpușe





(*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*, *Amblyomma spp.*), la câini și pisici.

Eficiența produsului, împotriva unor noi infestații cu purici adulți, persistă până la 8 săptămâni la câine și 30 zile la pisică. Eficiența împotriva căpușelor și a păduchilor este de circa 4 săptămâni.

Poate fi utilizat și ca parte a strategiei de tratament pentru dermatita alergică produsă de înțepăturile puricilor

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Dozele recomandate sunt:

Pisica: 7,5 mg – 15 mg fipronil/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml

Antipoux MD/pisică.

Caine: max 13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/4 kg.

Greutate corporală	Doza ANTIPOUX MD de administrat
0 - 4 kg	0,5 ml
4 – 8 kg	1 ml
8 -12 kg	1,5 ml
12 – 16 kg	2 ml
16 – 20 kg	2,5 ml
20 – 24 kg	3 ml
24 – 28 kg	3,5 ml
28 – 32 kg	4 ml
32 – 36 kg	4,5 ml
36 – 40 kg	5 ml



Mod de administrare:

Produsul se aplică la baza cefei, între omoplați, într – unul sau mai multe locuri, la distanța de 2-3 cm unul de celălalt la animalele mai mari.

Se desparte blana animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se rotește inelul de pe piston la semnul corespunzător greutateii animalului.

Trebuie să vă asigurați că aplicarea produsului se face într-o zonă în care animalul nu se poate linge, și că animalele nu se ling între ele după tratament. Se va evita umezirea excesivă a blănii animalului, deoarece acest lucru poate provoca un aspect lipicios al părului la locul de tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, acesta va dispărea ulterior în 24 – 48 ore de la aplicare.

8. TIMP(TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

<Exp luna/an>

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.





11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra la temperatura mai mică de 25°C.

A se păstra în loc uscat.

A se păstra în ambalajul original.

**12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR
NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Eliminarea: citiți prospectul produsului.

**13. MENȚIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI
CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI
UTILIZAREA, DUPĂ CAZ**

Numai pentru uz veterinar.

**14. MENȚIUNEA “A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA
COPIILOR”**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE
COMERCIALIZARE**

S.C. VANELLI S.R.L.

Strada Iași- Târgu Frumos Km 10,

Sat Lețcani, Comuna Lețcani ,707280

Jud. Iași, Romania

Tel.: 40 232 253 442


E-mail: office@vanellivet.ro www.vanellivet.ro



16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE
COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

<Serie> <Lot> <BN>{număr}



INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE

MICI DE AMBALAJ PRIMAR

Seringi din polietilenă de joasă densitate x 14 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANTIPOUX MD 100 mg/ml, soluție spot on pentru câini și pisici

Fipronil

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE)
ACTIVĂ(ACTIVE)**

Fipronil 100 mg /ml

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU
NUMĂR DE DOZE**

14 ml

4. CALE (CĂI)DE ADMINISTRARE

5. TIMP(TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

6. NUMĂRUL SERIEI

<Serie> <Lot> <BN>{număr}

7. DATA EXPIRĂRII

<Exp luna/an>




Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.

8. MENȚIUNEA "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR"

Numai pentru uz veterinar.





PROSPECT

ANTIPOUX MD, 100 mg/ml soluție spot on pentru câini și pisici

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE
COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE
FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR
DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

S.C. VANELLI S.R.L.

Strada Iași- Târgu Frumos Km 10,

Sat Lețcani, Comuna Lețcani ,707280

Jud. Iași, Romania

Tel.: 40 232 253 442

E-mail: office@vanellivet.ro www.vanellivet.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ANTIPOUX MD, 100 mg/ml soluție spot on pentru câini și pisici

Fipronil

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A
ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)**

1 ml soluție conține:

Substanța activă:

Fipronil 100 mg

Excipienți:

Butilhidroxitoluen (E321) 1 mg



4. INDICAȚIE(INDICAȚII)

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), păduchi malofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) și căpușe (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*, *Amblyomma spp.*), la câini și pisici.

Eficiența produsului, împotriva unor noi infestații cu purici adulți, persistă până la 8 săptămâni la câine și 30 zile la pisică. Eficiența împotriva căpușelor și a păduchilor este de circa 4 săptămâni.

Poate fi utilizat și ca parte a strategiei de tratament pentru dermatita alergică produsă de înțepăturile puricilor.

5.CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la iepuri, pot apare reacții severe la această specie. Nu se administrează în caz de hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau oricare dintre excipienți.

Nu se administrează la animalele bolnave sau aflate în convalescență.

6.REACȚII ADVERSE

Printre reacțiile adverse rare, au fost raportate reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit general sau alopecie. În mod excepțional, au fost observate hipersalivație, semne neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, nervozitate) sau vărsături după utilizare. Dacă animalele se ling, după o scurtă perioadă pot fi observate fenomene de hipersalivație temporară. Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.





7.SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

8.POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE(CAD) DE ADMINISTRAREȘI MODUL DE ADMINISTRARE

Dozele recomandate sunt:

Pisică: 7,5 mg – 15 mg fipronil/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml


Antipoux MD/pisică.

Caine: max 13 mg/kg greutate corporală, echivalent cu 0,5 ml Antipoux MD/4 kg.

Greutate corporală	Doza ANTIPOUX MD de administrat
0 - 4 kg	0,5 ml
4 – 8 kg	1 ml
8 -12 kg	1,5 ml
12 – 16 kg	2 ml
16 – 20 kg	2,5 ml
20 – 24 kg	3 ml
24 – 28 kg	3,5 ml
28 – 32 kg	4 ml
32 – 36 kg	4,5 ml
36 – 40 kg	5 ml

Mod de administrare:

Produsul se aplică la baza cefei, între omoplați într – unul sau mai multe locuri, la distanța de 2-3 cm unul de celalalt la animalele mai mari.



Se desparte blana animalului în cărare până ce pielea devine vizibilă. Vârful seringii se plasează pe piele, apoi se rotește inelul de pe piston la sensul corespunzător greutateii animalului.

Trebuie să vă asigurați că aplicarea produsului se face într-o zonă în care animalul nu se poate linge, și că animalele nu se ling între ele după tratament. Se va evita umezirea excesivă a blănii animalului, deoarece acest lucru poate provoca un aspect lipicios al părului la locul de tratament. Dacă acest lucru se întâmplă, acesta va dispărea ulterior în 24 – 48 ore de la aplicare.

9.RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de tratament.

10.TIMP (TIMPI)DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

A se păstra în loc uscat.

A se păstra în ambalajul original.

A nu se utiliza după data expirării menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.


12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale pentru fiecare specie țintă

Animalele trebuie cântărite cu precizie înaintea administrării tratamentului.

Nu aplicați produsul pe răni sau pe pielea cu leziuni.





Se va evita îmbăierea/șamponarea animalului tratat timp de două zile de la aplicarea produsului.

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Se va evita administrarea produsului la animale mai mici de două luni, la câinii cu greutate mai mică de 2 kg sau la pisicile cu greutate mai mică de 1 kg.

A se evita contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii clătiți imediat cu multă apă.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Acest produs poate provoca iritarea mucoaselor și ochilor. Prin urmare, contactul produsului cu gura și ochii trebuie evitat.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul cu produsul.

Evitați contactul degetelor cu produsul.

În cazul expunerii accidentale a ochilor, aceștia se vor clăti cu apă curată..

Spălați-vă mâinile după utilizarea produsului.


A nu se fuma, bea sau mânca în timpul aplicării produsului.

Animalele tratate nu vor fi manipulate până când locul de aplicare nu este uscat,

Copiii nu se vor juca cu animalele tratate, până când locul de aplicare nu este complet uscat.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Studiile de laborator nu au arătat că fipronilul ar avea efecte teratogene sau embriotoxice.



Nu există date disponibile legate de siguranța produsului la animale aflate în perioada de gestație și lactație. Prin urmare produsul se va utiliza în aceste perioade în conformitate cu evaluarea balanței risc/beneficiu realizată de medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

Supradozare(simptome,proceduri de urgenta,antidot)

Pisici

Nu au fost observate efecte adverse în studii de siguranță realizate la pisici în vârstă de 8 săptămâni și mai mari în greutate de 1 kg tratate o dată pe lună cu o doză, de cinci ori doza recomandată, timp de șase luni consecutiv.

Câini:

Nu au fost observate efecte adverse în studii de siguranță la puii în vârstă de 8 săptămâni și mai mari în greutate de 2 kg tratați cu o doză, de cinci ori doza recomandată. Riscul de apariție a efectelor adverse poate totuși crește la supradozaj Nu se va depăși doza recomandată.

Incompatibilități

Nu se cunosc.

13.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ.


Fipronil poate fi dăunător pentru organismele acvatice.

Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu ambalajul utilizat al acestuia.

Câinii tratați nu vor fi lăsați să înoate în lacuri.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.





Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Iulie 2020

15.ALTE INFORMAȚII

Dimensiuni de ambalaje:

Seringă de polietilenă de joasa densitate de 14 ml prevăzută cu: corp, piston, inel de strângere, capac de protecție din polipropilenă.

Ambalaj secundar: cutie de carton x 12 seringi de 14 ml.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

