

ANTRAVAC
VACCIN ANTICĂRBUNOS
- uz veterinar -

1. Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare și fabricație:

Societatea Națională "Instituțiu Pasteur" S.A.
Calea Chiulești nr. 333, sector VI, București, cod 060269
Tel. (01) 220.69.20 Fax (01) 220.69.13



Răsun însoțit orice reclamație cu numărul seriei înscris pe etichetă

2. Denumirea medical-veterinară a produsului:

ANTRAVAC - Suspensie concentrată de spori *Bacillus anthracis* 1190 R-Stamatin în excipient glicerinat-soponinat.

Caracteristici generale

Vaccin viu reprezentat de o suspensie concentrată de spori de *Bacillus anthracis* în excipient glicerinat-soponinat.

Lichid opalescent cu sediment ușor omogenizabil prin agitare.

3. Substanțe active și alte ingrediente:

- Spori de <i>Bacillus anthracis</i>	$\geq 2,5 \times 10^7$ UFC
- Soponina	0,0006 g
- Excipient glicerinat	ad. 1 ml

4. Indicații:

Se utilizează în imunoprofilaxia antraxului la toate speciile receptivă. Vaccinarea preventivă se va efectua de preferință primăvara cu 14 zile înainte de scoaterea animalelor la pășune și cu 21 zile înainte de preluarea lor la îngrășătoare, la animalele afebrile, clinic sănătoase.

5. Contraindicații:

Nu se vaccinează animalele:

- sub vârsta indicată la fiecare specie;
- febrile, slabe, sumenitate;
- în ultima lună de gestație și primele 3 săptămâni după fătare;
- oile, cu 5 zile înainte și după tundere sau îmbolțire antiparazitară.

6. Reacții postvaccinale:

Pot apărea ușoare edeme la locul de inoculare și uneori scăderi nesemnificative ale producției de lapte (bovine, ovine, caprine) care revine la normal în 2-3 zile.

În cazurile cu reacții postvaccinale accentuate, manifestate prin febră și edeme de 10-20 cm la locul de inoculare, persistente mai multe zile, animalele vor fi ținute în udăposturi și se vor aplica comprese reci pe zona edematiată.

Dacă febra persistă, iar edemele devin declive, depășind 20 cm în diametru, se administrează antibiotice de elecție.

Laptele de la animalele febrile se va da în consum după fierbere.

În condițiile practicii curente, inocularea unor vaccinuri, indiferent de producător, poate cauza reacții anafilactice la unele animale. Se recomandă supravegherea animalelor 1-2 ore după vaccinare și dacă este necesar se va interveni cu un antihistaminic.

Amplas

Vaccinul anticărbunos se condiționează în flacoane cu 5, 10, 50 sau 100 doze.

7. Specii țintă:

Bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline.

8. Posologie pentru fiecare specie și cale de administrare:

Produsul se administrează pe cale subcutanată în doză unică după cum urmează:

- bovine de la vârsta de 2 luni 0,5 ml;
- ovine de la vârsta de 2 luni 0,2 ml;
- porcine de la vârsta de 2 luni 0,2 ml;
- cabaline de la vârsta de 6 luni 0,2 ml;
- caprine de la vârsta de 2 luni 0,1 ml.

9. Recomandări privind administrarea corectă:

Nu se recomandă:

- vaccinarea simultană anticărbunoasă, antipasteurelică, contra mameite gangrenoase, salmonelozelor și enterobacteriozei taurinelor;
- în zonele enzootice pentru pasteureloză, cărbunc emfizematos sau alte anaerobioze, în care s-au înregistrat cazuri de antrax în ultimii 10 ani; vaccinarea contra acestor boli se va face cu 21 de zile înainte de vaccinarea anticărbunoasă.

10. Timp de așteptare:

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare:

- A se păstra în flacoane bine închise, la frigider (2-8 °C).
- A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2-8 °C), ferit de lumina și îngheț.
- A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă de pe flacon/cutie.
- A nu se utiliza dacă se observă semne de deteriorare.

12. Atenționări speciale:

- Agitati bine flaconul cu vaccin înainte de utilizare;
- Utilizați întregul conținut al flaconului în decurs de maxim 2 ore de la desigilare;
- Folosiți pentru fiecare animal un ac separat, steril;
- Protejați animalele de intemperii, efort fizic câteva zile după vaccinare.

13. Precauții pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor:

Flacoanele goale care au resturi de vaccin se sterilizează prin fierbere timp de 30 minute. Seringile de unica folosință se distrug prin

incinerare.

Valabilitate

24 luni de la data condiționării.