



**AVINEW**

## **VACCIN VIU, IMPOTRIVA BOLII NEWCASTLE LA GAINI, TULPINA VG/GA – LIOFILIZAT**

### **Compozitie:**

Tulpina vaccinala este VG/GA - tulpina virusului bolii Newcastle.

Fiecare doză de vaccin contine min. 15 DP90 (doza protectoare 90%).

### **Indicatii:**

Imunizarea activa a galinaceelor împotriva Bolii Newcastle.

### **Mod, cale de administrare si dozare:**

- A se folosi la cel mult 2 ore de la reconstituirea cu apa potabilă fara urme de antiseptic sau dezinfectanti.

- Cale de administrare si dozare:

#### **1. Vaccinare individuală**

- **pe cale oculară:** se pune o picătură de solutie vaccinală într-unul din ochii fiecărei păsări si se așteaptă până ce vaccinul se disperseaza uniform pe toată suprafata oculară, dupa care pasărea poate fi eliberată.

- **pe cale respiratorie** (pe cioc) (numai la puii de 1 zi): se introduce ciocul în solutia vaccinală până la narine pentru ca astfel substanța să pătrundă pe canalele nazale.

#### **2. Vaccinarea în masă**

- **în apa de băut (cale orală)** (de la vârsta de 4 zile): se adauga solutia vaccinală preparata chiar înainte de a fi folosită in apa destinata a fi bauta in mod normal in 1-2 ore de pasarile, care nu au mai primit apa timp de 2 ore înainte de vaccinare;
- **aerosolizare (cale respiratorie):** se pulverizează solutia vaccinală deasupra păsărilor cu ajutorul unui spray care poate elibera microparticule de solutie.

### **Programul de vaccinare**

- prima vaccinare - de la vârsta de 1 zi;

- rapeluri - pui de carne:       - eventual la 2-3 saptamani dupa prima vaccinare  
  - la viitoare reproducatoare si ouatoare; rapeluri la 2-3 saptamani si 7-8 saptamani de la prima vaccinare, iar apoi un rapel cu un vaccin inactivat administrat înainte de inceputul perioadei de ouat.

N.B. Vaccinul AVINEW poate fi administrat asociat cu un vaccin inactivat.

### **Contraindicatii:**

Nu se vaccinează potarnichiile rosii.

### **Precautii:**

- Se vaccinează numai păsările sănătoase.
- Se aplică măsurile de asepsie obisnuite.
- Pentru prepararea solutiei vaccinale se vor utiliza numai materiale sterile, dar fără urme de antiseptic si/ sau dezinfectant.
- Se recomandă distrugerea continutului nefolosit al flacoanelor de vaccin si dezinfectarea flacoanelor goale înainte ca acestea sa fie eliminate.

### **Perioada de așteptare:**

Nu este cazul

**Păstrare:**

A se pastra la temperaturi cuprinse intre 2-8<sup>0</sup>C, intr-un loc ferit de lumina

**Mod de prezentare**

Flacoane de 1000 doze

Flacoane de 2000 doze

**Utilizarea tulpinii VG/ GA este autorizata de Universitatea din Georgia  
Patent US 5118502**

**Numai pentru uz veterinar. A nu se elibera decat pe baza de reteta**

**PRODUCATOR:** Merial SAS -Rue Bourgelat 17, 69002 Lyon - Franta

**IMPORTATOR :** VETECO ROMANIA SRL - Str. Mr. Av. Stefan Sanatescu nr. 41, Sector 1  
– Bucuresti

**Institi orice reclamatie cu numarul seriei in scris pe eticheta.**