


[Version 7.1, 10/2006]



ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AviPro PRECISE

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanță activă:

1 doză conține min. 10^3 și max $10^{4,5}$ EID₅₀* virusul viu IBD (bursita infecțioasă aviară), tulpină LC 75.

Cultivare: oua embrionate SPF

* EID₅₀ = 50% doză infectantă: titrurile necesare pentru a cauza infecția la 50% din embrionii inoculați

Excipient (excipienți):

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Liofilizat pentru suspensie

Aspect: pastila albicioasă

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

găini, începând cu vârsta de 7 zile

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru imunizarea activă a găinilor împotriva Bursitei infecțioase aviare (IBD/Bolii de Gumboro), în vederea prevenirii mortalității, simptomelor clinice și leziunilor specifice acestei boli.

Țimp de instalare a imunității: 14 zile

Durata imunității: 28 zile, demonstrată prin infecția de control; nivelul anticorpilor se poate menține până la 15 săptămâni.

4.3 Contraindicații

A nu se vaccina găinile bolnave.

4.4 Atenționări speciale <pentru fiecare specie țintă>

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Virusul vaccinal se poate răspândi la păsările nevaccinate deoarece este excretat prin fecale cel puțin 9 zile. Evitați răspândirea la găinile ouătoare.



Pentru reducerea presiunii infectioase înainte de instalarea imunitatii gunoierul trebuie evacuat si adapostul curatat intre doua cicluri de crestere.

Asigurati-va ca apa de baut este rece, curata si fara detergenti sau dezinfectanti pentru a garanta viabilitatea virusului vaccinal.

Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Vaccin cu virus viu atenuat, a nu se pulveriza sau imprastia. Spalati si dezinfectati mainile si echipamentele dupa folosire.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

In ziua a 7-a dupa vaccinare poate fi observata o depletie generalizata moderata de limfocite. Repopularea cu limfocite incepe dupa ziua a 7-a post vaccinare si dureaza pana in ziua 28 post vaccinare, si doar cateva mici necroze pot fi prezente la unele pasari.

4.7 Utilizare în perioada de ouat

A nu se utiliza la gaini în perioada de ouat

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu există informații disponibile referitoare la siguranță și eficacitate în urma utilizării simultane a acestui vaccin cu orice alt vaccin. De aceea, se recomandă ca nici un alt vaccin să nu fie administrat în interval de 14 zile înainte de sau după vaccinarea cu acest produs.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

O singura doza (min. 10^3 EID₅₀) trebuie administrata per pasare, in apa de baut incepand cu varsta de 7 zile.

Determinarea varstei de vaccinare depinde de o serie de factori incluzand nivelul anticorpilor maternali, hibridul, presiunea infectioasa, adapostul si conditiile de management.

Anticorpii maternali pot interfera cu virusul vaccinal viu IBD. Varsta optima de vaccinare depinde deopotriva de nivelul anticorpilor maternali impotriva bursitei infectioase si de capacitatea vaccinului de a face fata acestor anticorpi maternali (titru de patrundere). Omogenitatea nivelurilor de anticorpi maternali din efectiv este importanta pentru stabilirea timpului de vaccinare si garanteaza o administrare corespunzatoare a vaccinului. Pentru a stabili varsta cand nivelul de anticorpi maternali a scazut suficient pentru a permite efectuarea vaccinarii, se recolteaza probe de la cel putin 24 pui si se aplica formula Deventer pentru vaccinuri intermediare. Pentru puii proveniti din parinti vaccinati de mai multe ori sau infectati cu virus salbatic, varsta la care se efectueaza vaccinarea poate fi de 14 zile sau mai mult. Pentru cei serologic negativi, vaccinarea se face la varsta de 7 zile.

O vaccinare ulterioara se poate face la interval de 7 zile fata de prima in cazul in care puii au o mare variabilitate a anticorpilor maternali (ex. C.V. mai mare de 30%) sau provin din surse diferite.

Broileri:

- Fara prezenta anticorpilor maternali – incepand cu varsta de 7 zile
- Cu anticorpi maternali– incepand cu varsta de 14 zile



Gaini ouatoare/ reproducatoare:

- Fara prezenta anticorpilor maternali – incepand cu vasta de 7 zile
- Cu anticorpi maternali– din 3-4-a saptamana de viata

Dozare si administrare:

Aplicarea prin apa de baut:

- Determinati numarul de doze vaccinale necesare si cantitatea de apa necesara. Nu impartiti flacoanele cu dozaj mare la mai mult de 1 hala sau sistem de adapare pentru a evita comiterea de erori
- Asigurati-va ca toate conductele, tuburile, adaptorile nu contin urme de detergenti, dezinfectanti.
- Asigurati-va ca apa de baut este rece, curata si fara detergenti si dezinfectanti pentru a garanta viabilitatea virusului vaccinal.
Folositi apa proaspata , de preferinta fara cloruri sau ioni metalici.
Poate fi adaugat lapte praf degresat (i.e.<1 % grasime - 2-4 grame per litru) sau lapte degresat (20-40 ml per litru de apa) pentru a creste calitatea apei si stabilitatea virusului vaccinal. Aceasta trebuie realizata cu 10 minute inaintea reconstituirii vaccinului.
- Deschideti flaconul sub apa si reconstituiti continutul in intregime.
Asigurati-va ca flaconul este golit si continutul complet disipat in apa.
- Apa trebuie consumata asa incat nivelul din adaptorii sa fie minim inainte de aplicarea vaccinului.Toate tuburile trebuie golite de apa reziduala asa incat adaptorile sa contina numai apa vaccinala; daca apa este prezenta goliti liniile inainte de aplicarea vaccinului.
- Administrati vaccinul intr-un interval de 2 ore, asigurandu-va ca toate pasarile beau in acest timp. Deoarece comportamentul de consum al apei variaza, s-ar putea sa fie necesara oprirea apei anterior vaccinarii la unele loturi pentru ca toate pasarile sa consume apa in timpul vaccinarii.
- Scopul este ca fiecare pasare sa primeasca cate o doza de vaccin.
- Ideal vaccinul trebuie administrat intr-un volum de apa consumat de pasari in maxim 2 ore.Ca regula generala aplicati vaccinul reconstituit in apa rece si proaspata in proportie de 1000 de doze vaccin la 1 litru de apa pe zi de viata pentru 1000 de pasari.ex: 10 litri ar fi necesari pentru 1000 de pasari in varsta de 10 zile. In zonele cu clima fierbinte la reproducatorii rase grele se poate ajunge pana la 40 litri la 1000 de pasari. Daca sunt dubii masurati cantitatea de apa administrata cu o zi inaintea vaccinarii.
- Vaccinul se administreaza imediat dupa reconstituire. Asigurati-va ca pasarile nu au acces la apa nevaccinala
- Vaccinul reconstituit nu trebuie expus la actiunea razelor solare si temperaturi peste 25°C.
- Continutul flacoanelor deschise se consuma o singura data.
Preparati doar cantitatea de solutie vaccinala care poate fi consumata in 2 ore.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Supradozarea nu prezinta risc, iar subdozarea poate duce la imunizare necorespunzatoare. In ziua a 7-a post vaccinare se poate observa o depletie medie pana la severa generalizata a numarului de limfocite la majoritatea pasarilor . Repopularea cu limfocite incepe dupa

ziua a 7-a post vaccinare si dureaza pana in ziua 28 post vaccinare, si doar cateva mici necroze pot fi prezente la unele pasari.

4.11. Timp de așteptare

30 zile.

PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE

Codul veterinar ATC: QI01AD09

Grupa farmacoterapeutică: vaccine importiva Bursita Infectioasa Aviara (Bolii de Gumboro)

Substanța activă care intră în componența vaccinului este virusul viu, atenuat al bursitei infectioase aviare, tulpina LC 75 care stimulează imunitatea împotriva Bolii de Gumboro.

Tulpina este intermediară, cu un grad de lezionare al bursei de 0,6 la 28 de zile după vaccinare.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Di-sodiu hidrogen fosfat,
Potasiu di- hidrogen fosfat,
Lactoza monohidrat,
Lapte praf degresat

6.2 Incompatibilități

A nu se amesteca cu alte substanțe în afara de apă și lapte degresat.

Asigurați-vă că apa de băut este rece, curată, non-clorinată și liberă de detergenți, dezinfectanți și ioni metalici.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a vaccinului ambalat pentru vânzare: 36 luni

Vaccinul reconstituit trebuie folosit în maximum 2 ore.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C)

A nu se congela

A se proteja de lumină

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

- Recipient din sticlă hidrolitică tip 1
- Dop din clorobutil elastomer
- Capsa de aluminiu


Vaccinul este disponibil în următoarele dimensiuni:

Flacon x 1000 doze

Flacon x 2500 doze

Flacon x 5000 doze

Flacon x 10000 doze



Cutie cu 10 x 1000 doze
Cutie cu 10 x 2500 doze
Cutie cu 10 x 5000 doze
Cutie cu 10 x 10000 doze

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Distrugerea deșeurilor se va realiza prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat în acord cu cerințele naționale și autorizat pentru utilizare de către autoritățile competente.>

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Strasse 4, 27472 Cuxhaven, Germany
Tel.: +49/4721 747 0
Fax: +49/4721 747 105

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Nr 090050

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI



03.02.2004/ 05.06.2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

09.2012

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE


Nu este cazul.






ANEXA III
ETCHETARE ȘI PROSPECT





A. ETICHETARE



INFORMATII CARE TREBUIE INSCRIESE PE AMBALAJUL SECUNDAR

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AVIA PRECISE

2. DECLARAREA SUBSTANTELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 doze contine min. 10^3 si max $10^{4.5}$ EID₅₀ * virusul viu IBD (bursita infectioasa aviara), tulpina LC 75.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Liofilizat pentru suspensie

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Flacoane cu 1000, 2500, 5000, 10000 doze;
Cutii cu 10x1000, 10x2500, 10x5000, 10x10000 doze

5. SPECII ȚINTĂ

Gaini

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru imunizarea activa a gainilor impotriva Bursitei infectioase aviare (IBD/Bolii de Gumboro)

7. METODA ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru administrare in apa de baut dupa reconstituire.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

0 zile

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra la frigider (2° - 8° C)
A nu se congela
A se proteja de lumină solara directa



12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Pentru distrugerea flacoanelor nefolosite sau a deșeurilor provenite din acestea cititi prospectul.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRIȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

“A nu se lăsa la îndemâna copiilor”

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Lohmann Animal Health GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 4, 27472 Cuxhaven, Germany

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Nr. 090050

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot



INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AviPro PRECISE

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

1 doza contine min. 10^3 si max $10^{4,5}$ EID₅₀ virusul viu IBD (bursita infectioasa aviara), tulpina LC 75

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

Flacoane cu 1000, 2500, 5000 si 10000 doze

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Pentru administrarea in apa de baut dupa reconstituire.

5. TIMP DE AȘTEPTARE

0 zile

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot

7. DATA EXPIRĂRII

EXP

8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

„Numai pentru uz veterinar”.





B. PROSPECT



PROSPECT
AviPro PRECISE

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

<Deținătorul autorizației de comercializare <și producător>>:

Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Strasse 4, 27472 Cuxhaven, Germany

<Producător pentru eliberarea seriei: >

Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Strasse 4, 27472 Cuxhaven, Germany

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AviPro PRECISE

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 doza contine min. 10^3 și max $10^{4.5}$ EID₅₀ * virusul viu IBD (bursita infectioasa aviara), tulpina LC 75.

Cultivare: oua embrionate SPF

* EID₅₀ = 50% doza infectanta: titrurile necesare pentru a cauza infectia la 50% din embrionii inoculati

Lista excipientilor

Di-sodiu hidrogen fosfat,

Potasiu di- hidrogen fosfat,

Lactoza monohidrat,

Lapte praf degresat

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru imunizarea activa a gainilor impotriva Bursitei infectioase aviare (IBD/Bolii de Gumboro), in vederea prevenirii mortalitatii, simptomelor clinice si leziunilor specifice acestei boli.

Timp de instalare a imunitatii: 14 zile.


Durata imunitatii: 28 zile, demonstrata prin infectia de control; nivelul anticorpilor se poate mentine pana la 15 saptamani.

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se vaccina pasarile bolnave

6. REACȚII ADVERSE

In ziua a 7-a dupa vaccinare, poate fi observata o depletie generalizata moderata de limfocite la gainile vaccinate. Repopularea cu limfocite incepe dupa ziua a 7-a post



vaccinare si dureaza pana in ziua 28 post vaccinare, si doar cateva mici necroze pot fi observate la unele pasari.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar sau farmacistul.

7. SPECII ȚINTĂ

găini, începând cu vârsta de 7 zile

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

O singură doză (min. 10^3 EID₅₀) trebuie administrată fiecărei păsări în apa de băut începând cu vârsta de 7 zile.

Determinarea vârstei de vaccinare depinde de o serie de factori inclusiv nivelul anticorpilor maternali, hibridul, presiunea infecțioasă, adăpostul și condițiile de management.

Anticorpii maternali pot interfera cu virusul vaccinului viu. Vârsta optimă de vaccinare depinde deopotrivă de nivelul anticorpilor maternali împotriva bursitei infecțioase și de capacitatea vaccinului de a face față acestor anticorpi maternali (titru de patrundere). Omogenitatea înaltă a nivelurilor de anticorpi maternali din efectiv este importantă pentru stabilirea timpului de vaccinare și garantează o administrare mai bună a vaccinului. Pentru a stabili vârsta când nivelul de anticorpi maternali a scăzut suficient pentru a permite efectuarea vaccinării, se recoltează probe de la cel puțin 24 pui și se aplică formula Deventer pentru vaccinuri intermediare. Pentru puii proveniți din părinți vaccinați de mai multe ori sau infectați cu virus salbatic, vârsta poate fi de 14 zile sau mai mult. Pentru cei serologic negativi, vaccinarea se face la 7 zile.

O vaccinare ulterioară se poate face la 7 zile interval față de prima, în cazul în care puii au o mare variabilitate a anticorpilor maternali (ex. C.V. mai mare de 30%) sau provin din surse diferite.

Broileri:

- Fără prezenta anticorpilor maternali – începând cu vârsta de 7 zile
- Cu anticorpi maternali – începând cu vârsta de 14 zile

Găini ouătoare/reproductoare:


- Fără prezenta anticorpilor maternali – începând cu vârsta de 7 zile
- Cu anticorpi maternali – din 3-4-a săptămână de viață

Dozare și administrare:

Aplicarea prin apă de băut:

- Determinați numărul de doze vaccinale necesare și cantitatea de apă necesară. Nu împărțiți flacoanele cu dozaj mare la mai mult de 1 hală sau sistem de adăpare pentru a evita comiterea de erori.
- Asigurați-vă ca conductele, tuburile, adaptorii nu conțin urme de detergenți, dezinfectanți.
- Asigurați-vă ca apa de băut este rece, curată și fără detergenți și dezinfectanți pentru a garanta viabilitatea virusului vaccinal.





Folositi apa proaspata, de preferinta fara cloruri sau ioni metalici.

Poate fi adaugat laptele praf degresat (i.e. <1 % grasime, 2-4 grame per litru) sau lapte degresat (20-40 ml per litru de apa) pentru a creste calitatea apei si stabilitatea virusului vaccinal. Aceasta trebuie realizata cu 10 minute inaintea reconstituirii vaccinului.

- Deschideti flaconul cu vaccin sub apa si reconstituiti continutul in intregime. Asigurati-va ca flaconul este golit si continutul complet disipat in apa.
 - Apa trebuie consumata asa incat nivelul din adapatori sa fie minim inainte de aplicarea vaccinului. Toate tuburile trebuie golite de apa reziduala asa incat adaptoarele sa contina numai apa vaccinala; daca apa este prezenta goliti liniile inainte de aplicarea vaccinului.
 - Administrati vaccinul intr-un interval de 2 ore, asigurandu-va ca toate pasarile beau in acest timp. Deoarece comportamentul de consum al apei variaza, s-ar putea sa fie necesara oprirea apei anterior vaccinarii la unele loturi pentru ca toate pasarile sa consume apa in timpul vaccinarii.
 - Scopul este ca fiecare pasare sa primeasca cate o doza de vaccin.
 - Ideal vaccinul trebuie administrat intr-un volum de apa consumat de pasari in maxim 2 ore. Ca regula generala aplicati vaccinul reconstituit in apa rece si proaspata in proportie de 1000 de doze vaccin la 1 litru de apa pe zi de viata pentru 1000 de pasari. ex: 10 litri ar fi necesari pentru 1000 de pasari in varsta de 10 zile. In zonele cu clima fierbinte la reproducatorii rase grele se poate ajunge pana la 40 litri la 1000 de pasari. Daca sunt dubii masurati cantitatea de apa administrata cu o zi inaintea vaccinarii.
 - Vaccinul se administreaza imediat dupa reconstituire. Asigurati-va ca pasarile nu au acces la apa nevaccinala
 - Vaccinul reconstituit nu trebuie expus la actiunea razelor solare si temperaturi peste 25°C.
 - Continutul flacoanelor deschise se consuma o singura data.
- Preparati doar cantitatea de solutie vaccinala care poate fi consumata in 2 ore.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Evitati stresul inainte, in timpul si dupa vaccinare.

Protejati vaccinul reconstituit de lumina solara directa si temperaturi de peste 25°C.

Asigurati-va ca apa de baut si adaptoarele sunt fara urme de dezinfectanti si detergenti pentru a garanta viabilitatea vaccinului.

Folositi intregul continut odata.

Preparati cantitatea de solutie vaccinala care poate fi consumata in 2 ore.

Pentru a reduce presiunea infectioasa inaintea instalarii imunitatii, gunoiul trebuie indepartat si halele curatate intre ciclurile de productie.

Vaccinul se poate raspandi la pasarile nevaccinate, fiind excretat prin fecale cel putin 9 zile dupa vaccinare.

Evitati raspandirea virusului vaccinal la gainile ouatoare.

Supradozarea nu prezinta risc iar subdozarea poate duce la imunizare necorespunzatoare.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.



11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produc finit:

A se păstra la frigider la temperatură de 2 °C - 8 °C.

A nu se congela.

Protejați vaccinul de lumina directă solară.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor.

Vaccinul reconstituit trebuie folosit în 2 ore.

Preparați cantitatea de vaccin care poate fi aplicat în 2 ore.

Protejați vaccinul reconstituit de lumina directă de la soare și temperaturi peste 25°C.

A nu se congela.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există nici o informație disponibilă despre siguranța și eficacitatea folosirii vaccinului împreună cu un altul. De aceea, se recomandă ca nici un alt vaccin să nu fie administrat în interval de 14 zile înainte de sau după vaccinarea cu acest produs.

A nu se folosi la găini în perioada de ouat.

A nu se amesteca cu alte substanțe în afara de apă și lapte degresat.

Asigurați-vă ca apa de băut este rece, curată, non-clorinată și liberă de detergenți, dezinfectanți pentru a asigura viabilitatea virusului vaccinal.

Supradozarea nu prezintă risc dar subdozarea poate duce la imunizare necorespunzătoare.

Precauții speciale care trebuie luate de către persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Vaccin cu virus viu, se va evita orice contaminare prin stropire sau vărsare.

După utilizare, spălați și dezinfectați mâinile.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Distrugerea deșeurilor se realizează prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat, în acord cu cerințele naționale și autorizat pentru utilizare de către autoritățile competente.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Cod veterinar ATC: QI01AD09

Se eliberează doar pe bază de rețetă medicală.


Dimensiuni de ambalaje

Flacon x 1000 doze

Flacon x 2500 doze

Flacon x 5000 doze

Flacon x 10000 doze



Cutie cu 10 x 1000 doze
Cutie cu 10 x 2500 doze
Cutie cu 10 x 5000 doze
Cutie cu 10 x 10000 doze

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru informații suplimentare referitoare la medicament, luați legătura cu reprezentantul zonal al deținătorului autorizației.

DEVCO AGRO-CHEMIE SRL, Str. Maria Rosetti nr. 7-9, RO-020481
Bucharest 2, Romania

