

PROSPECT

Biocan LR inj. ad us. vet.

Vaccin inactivat impotriva leptospirozei si rabiei la caini.

COMPOZITIA- 1 ml:

Virus rabic inactivat	min. 2 U.I.
Leptospira icterohaemorrhagiae inact.	min. $1 \times 10^{7,0}$
Leptospira canicola inact.	min. $1 \times 10^{7,0}$
Leptospira grippotyphosa inact.	min. $1 \times 10^{7,0}$

Algeldrati suspensio

Nutrimentum ad cultivationem

FORMA FARMACEUTICA: Solutie injectabila

GRUPA FARMACOTERAPEUTICA:

97 Veterinaria immunopraeparata

CLASIFICAREA ATC :

Q15AA Vaccinuri veterinare

MODUL DE ACTIUNE/EFECTE: Dupa vaccinare, se formeaza anticorpi specifici impotriva antigenilor determinanti continuti in vaccin. Imunitatea se instaleaza la 14 zile dupa vaccinare si dureaza cel putin 12 luni.

Pentru componenta leptospirica, revaccinarea trebuie efectuata in timp de 2 – 4 saptamani; imunitatea totala se obtine la 14 zile dupa revaccinare. Pentru ambele antigene, se va efectua vaccinarea anuala pentru a se mentine imunitatea. O a treia doza de vaccin **Biocan L inj. ad us. vet.** trebuie efectuata la 6 luni de la prima imunizare, mai ales la cainii care au acces in zonele cu risc endemic de leptospiroza, daca nu este posibila evitarea contactului animalelor cu apa (adaparea, innotul).

DETINATORUL AUTORIZATIEI DE INREGISTRARE SI PRODUCATOR:

Bioveta, a.s.

Ivanovice na Hané

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Republica Ceha

SPECII TINTA: Cainii

TIMP DE ASTEPTARE: Nu este destinat animalelor de consum.

INDICATII: Pentru imunizarea activa a cainilor impotriva rabiei si a serotipurilor de leptospire continute de vaccin.

CONTRAINDICATII: Boli febrile grave. Animalele care au venit in contact sau au fost ranite de catre animalele turbate, nu se vor vaccina. Animalele care au muscat sau au ranit oameni, vor putea fi vaccinate numai dupa incheierea perioadei de observatie.

PRECAUTII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:

Flaconul se agita bine si se pastreaza la o temperatura de 15 – 25 °C inainte de utilizare.


Se vor vaccina numai animalele clinic sanatoase, in stare buna de intretinere. Evetualele tratamente antiparazitare trebuie efectuate cu cel putin 10 zile inainte de vaccinare. Animalele vaccinate nu trebuie supuse antrenamentului sau efortului timp de o saptamana dupa vaccinare.

INTERACTIUNI CU ALTE MEDICAMENTE SI ALTE FORME DE INTERACTIUNI:

Vaccinul Biocan LR poate fi utilizat separat sau simultan cu alte vaccinuri Biocan:

A) Vaccinul Biocan LR poate fi utilizat ca si diluant pentru alte vaccinuri Biocan liofilizate (de exemplu, Biocan DHPPi, DHP, DP, P).

B) Vaccinul Biocan LR poate fi utilizat in combinatie cu vaccinuri lichide Biocan C, Biocan B, Biocan M (sau cu vaccinul liofilizat Biocan DHPPi).



SCHEMA DE VACCINARE BIOCAN RECOMANDATA:

Varsta catelului	Situatia infectiei		
	Favorabila	Nefavorabila Parvoviroza	Nefavorabila Jigodie
5 la 6 saptamani		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7 la 8 saptamani		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8 la 10 saptamani	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12 la 16 saptamani	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Revaccinare anuala	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

Nota:

Vaccinurile din paranteze insemnana posibilitatea administrarii alternative in locul vaccinului Biocan Puppy

Vaccinurile insemnate cu: +C, +L, +LR insemnana posibilitatea administrarii simultane sau in asociere cu alte vaccinuri Biocan (de exemplu DHPPi, DP, P, Puppy).

Seria de vaccinuri Biocan asigura de asemenea imunizari speciale impotriva urmatoarelor boli infectioase majore la caini:

Boala lui Lyme (Biocan B) pentru caini incepand cu varsta de 12 saptamani, dermatite fungice datorate dermatofitului *Microsporum canis* (Biocan M plus) pentru caini incepand cu varsta de 8 saptamani, tetanus (Biocan T) pentru caini incepand cu varsta de 12 saptamani.

POSOLOGIA SI MOD DE ADMINISTRARE:

1 ml subcutanat, indiferent de varsta, greutatea sau rasa animalului.

Modul de vaccinare:

Prima vaccinare efectuata la varsta de 8 saptamani

Daca este necesar, cateii pot fi vaccinati la varsta de 8 saptamani si peste cu vaccinul Biocan L sau Biocan LR (in cazul existentei in mediu a rabiei). Apoi trebuie efectuata revaccinarea cu vaccinul Biocan LR la varsta de 12 saptamani si repetata anual, pentru mentinerea imunitatii.

Prima vaccinare efectuata incepand cu varsta de 12 saptamani

Animalele trebuie vaccinate cu vaccinul Biocan LR urmate de revaccinare cu vaccinul Biocan L efectuat in intervalul de 14 - 28 zile.

Apoi trebuie efectuata revaccinarea cu vaccinul Biocan LR odata pe an, pentru pastrarea imunitatii la rabie si leptospiroza.

FRECVENTA REACTIILOR SECUNDARE SI GRAVITATEA LOR:

La locul de inoculare se poate forma o reactie locala (cat un bob de mazare) care dispare de la sine in trei saptamani.

Numai arareori se poate constata hipersensibilitate.

PASTRAREA:

Depozitati la loc uscat si intunecos, la temperatura de 2-8 °C.

Nu folositi dupa termenul de expirare trecut pe eticheta.

Vaccinul trebuie ferit de inghet.

PREZENTARE:

A) Cutii de plastic cu 10 flacoane

10 x 1 ml de vaccin Biocan LR

B) Cutii de plastic cu 20 flacoane

20 x 1 ml de vaccin Biocan LR

C) Cutii de plastic cu 100 flacoane

50 x 1 ml de vaccin Biocan LR

100 x 1 ml de vaccin Biocan LR

Bioveta

Bioveta, Plc. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic.
e-mail: comm@bioveta.cz

DEȚINĂTORUL AUTORIZĂȚIEI DE ÎNREGISTRARE ȘI PRODUCĂTOR:

Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, Czech Republic

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI: Ianuarie 2004

MĂSURI PENTRU MANIPULAREA PRODUSULUI EXPIRAT SAU NEUTILIZAT:

Manipularea ambalajelor cu produse nefolosite sau expirate se face conform normelor naționale în vigoare.

NUMĂRUL AUTORIZĂȚIEI DE COMERCIALIZARE

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR.

Importator exclusiv pentru România:



SC MARAVET SRL-, dr. Korponay F.
RO-430232 Baia Mare, B-dul Unirii 18
tel./fax: 0262-211.964
www.maravet.ro

Verificat:
dr. Alex. LIONIDE

Însotiti orice reclamație cu numărul seriei înscris pe eticheta produsului