



PROSPECT

Biocan R inj. ad us. vet. Vaccin antirabic inactivat

COMPOZITIA: per 1 ml

- Virus rabic inactivat min 2 U.I.
- Nutrimentum MEM, Algedratum, Thiomersalum

FORMA FARMACEUTICA: Solutie injectabila

GRUPA FARMACOTERAPEUTICA: 97 Veterinaria immunopraeparata
CLASIFICAREA ATC : Q15AA Vaccinuri veterinare

MODUL DE ACTIUNE: Dupa patrunderea in organismul animal, antigenul prezent in vaccin este recunoscut ca si un agent strain si se activeaza o serie de mecanisme de aparare (macrofage, opsonine, interleukine, lifocite B etc.), in urma carora se formeaza anticorpi specifici impotriva antigenului determinant, continut in vaccin. Mecanismele amintite vor preveni aparitia infectiilor ulterioare dupa contaminare.

Animalele se pot vaccina incepand cu varsta de 3 luni. Imunitatea de protectie apare in 14 zile dupa vaccinare. Animalele care au fost vaccinate inainte de a implini varsta de 3 luni, trebuie revaccinate dupa implinirea acestei varste (se va respecta intervalul de minim 14 zile dintre doua vaccinari consecutive). Animalele care au fost vaccinate pentru prima data la varsta cuprinsa intre 3 si 12 luni trebuie revaccinate la un an de la prima vaccinare. Revaccinarea la un an de la prima vaccinare va asigura protectia animalelor imunizate fata de rabie minim 2 ani. Pentru mentinerea imunitatii se recomanda revaccinari, in conformitate cu reglementarile in domeniu ale fiecarei tari.

SPECIILE TINTA: Cainii, pisicile, animalele de blana, caii, oile, caprele, porcii, bovinele.

TIMP DE ASTEPTARE: Nu are.

INDICATII: Imunizarea activa a speciilor tinta impotriva rabiei.

CONTRAINDICATII: Boli febrile grave. Animalele care au fost agresate sau au venit in contact cu animale turbate, nu se vor vaccina. Animalele care au muscat sau au zgariat oameni, se pot vaccina numai dupa terminarea perioadei de observatie a acestora.

PRECAUTII SPECIALE PENTRU UTILIZAREA IN SIGURANTA A PREPARATULUI: Inainte de utilizare agitati bine continutul flaconului.

Se vor vaccina numai animalele clinic sanatoase, in stare buna de intretinere. Eventualele tratamente antiparazitare trebuie efectuate cu cel putin 10 zile inainte de vaccinare. Nu este recomandat ca animalele vaccinate sa fie supuse antrenamentului sau efortului, timp de o saptamana dupa vaccinare.

Dupa deschidere, trebuie utilizat in termen de 8 ore.

INTERACTIUNI CU ALTE PREPARATE VETERINARE SI ALTE TIPURI DE INTERACTIUNI:

Vaccinul Biocan R poate fi utilizat separat, simultan sau in asociere cu alte vaccinuri Biocan.

A/ Vaccinul Biocan R poate fi utilizat ca si diluant pentru alte vaccinuri liofilizate Biocan (de exemplu DHPPi, DP, P).

B/ Vaccinul Biocan R poate fi utilizat simultan cu vaccinul lichid Biocan C, Biocan B, Biocan M si Biocan L.

Schema de vaccinare recomandata Biocan

Varsta cateilor:	Situatia infectiei		
	favorabila	nefavorabila parvoviroza	nefavorabila jigodie
5 la 6 saptamani		Puppy (P) + C	Puppy (DP) + C
7 la 8saptamani		Puppy (P) + C	Puppy (DP) + C
8 la10 saptamani	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12 la 16saptamani	DHPPi + LR	DHPPi + LR	DHPPi + LR
Revaccinarea anuala	DHPPi + LR	DHPPi + LR	DHPPi + LR

Nota:

Vaccinurile din paranteze reprezinta posibilitatea vaccinarilor alternative in locul vaccinului Biocan Puppy.

Vaccinurile marcate cu +C, +L, +LR reprezinta posibilitatea administrarii simultane sau in asociere cu alte vaccinuri Biocan (de exemplu DHPPi, DHP, DP,DH,P, Puppy)

Alte vaccinari posibile: Biocan M – vaccin impotriva Microsporium canis la caini, Biocan B – vaccin impotriva bolii lui Lyme la caini, Biocan T – vaccin impotriva tetanusului la caini.

DOZE SI MOD DE ADMINISTRARE: Doza este de 1 ml indiferent de varsta, greutatea sau rasa individului. Se poate administra incepand cu varsta de 12 saptamani.

Metoda de administrare:

-subcutanat , preferabil inapoia spetei .

-intramuscular, preferabil in muschii membrului pelvin .

Animalele se vaccineaza incepand cu varsta de 3 luni. Imunitatea de protectie se formeaza dupa 14 zile de la imunizare. Animalele vaccinate inainte de implinirea varstei de 3 luni, trebuie revaccinate dupa aceasta varsta (se va respecta intervalul minim de 14 zile dintre doua vaccinari consecutive) .

Animalele vaccinate la varsta cuprinsa intre 3 si 12 luni trebuie revaccinate la un an dupa prima vaccinare. Revaccinarea efectuata la un an dupa prima va asigura protectia animalelor impotriva rabiei pentru minim 2 ani. Pentru mentinerea imunitatii, se recomanda revaccinarea periodica, in conformitate cu reglementarile in domeniu din fiecare tara.

EFACTE SECUNDARE: La locul de inoculare se poate forma o reactie locala de marimea unui bob de mazare. Aceasta dispare in 3 saptamani. Numai exceptional se poate constata hipersensibilitate.

PREZENTARE:

A/ Cutii de plastic cu capac si 10 flacoane:	10 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan R
B/ Cutii de plastic cu capac si 20 flacoane :	20 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan R
C/ Cutii de plastic cu capac si 100 flacoane:	50 flacoane x 1 ml, 100 flacoane x 1 ml vaccin Biocan R
D/ Cutii de plastic cu capac 10 flacoane:	1 flacon x 5 ml, 5 flacoane x 5 ml, 10 flacoane x 5 ml vaccin Biocan R
E/ Cutie de carton:	1 flacon x 10 ml, 5 flacoane x 10 ml, 10 flacoane x 10 ml, 1 flacon x 20 ml, 5 flacoane x 20 ml, 10 flacoane x 20 ml, 1 flacon x 50 ml, 1 flacon x 100 ml vaccin Biocan R

Prospectul face parte din fiecare ambalaj.


PASTRARE: Depozitati intr-un loc uscat si intunecos, la temperaturi de 2 - 8 °C.

Vaccinul trebuie ferit de inghet.

Preparatul nu trebuie utilizat dupa expirarea termenului de valabilitate inscris pe ambalaj.

MASURI SPECIALE PRIVIND MANIPULAREA PREPARATELOR VETERINARE NEFOLOSITE SAU A DESEURILOR PROVENITE DE LA ACESTEA: Ambalajul si orice resturi din preparat se vor manipula in concordanta cu reglementarile in vigoare.

VALABILITATEA: 24 luni, 7 zile dupa prima deschidere a flaconului.



PRODUCATOR: Bioveta, a.s.Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Haně, Republica Ceha

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

A SE ELIBERA NUMAI PE BAZA DE PRESCRIPTIE MEDICALA

NUMARUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

.....

Importator exclusiv pentru Romania:
SC MARAVET SRL ,dr. Korponay F.
RO-430232 Bdul Unirii nr. 18
Tel/Fax: 0262-211.964
www.maravet.ro

Verificat:
dr. A. L. LIQUIDE

