

[Version 8, 10/2012]



**ANEXA I**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**



## 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

**Biocan R suspensie injectabilă**  
Vaccin inactivat împotriva rabiei

## 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

**Substanță activă:** *Virusul rabiei* inactivat, tulpina SAD Vnukovo-32 min. 2 UI

**Adjuvant(adjuvanți):** Algedrat

**Excipient(excipienți):** Tiomersal

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

## 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă.

## 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

### 4.1 Specii țintă

Câini, pisici, dihori , bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine.

### 4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru imunizarea activă a speciilor de animale țintă împotriva rabiei.

### 4.3 Contraindicații

Boli febrile sistemice. Animale nevaccinate, rănite sau în contact cu animale infectate cu rabie. Animale care au mușcat sau rănit un om, pot fi vaccinate numai după încheierea perioadei de observație.

### 4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.


### 4.5 Precauții speciale pentru utilizare

#### Precauții speciale pentru utilizare la animale

Vaccinați numai indivizi clinic sănătoși într-o stare nutrițională adecvată. Posibilele tratamente anti-parazitare trebuie să fie efectuate înainte de vaccinare cu cel puțin 10 zile. O săptămână după vaccinare, nu este recomandat a se efectua antrenamente cu animalele vaccinate sau orice alte proceduri stresante.

#### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de autoinjectare accidentală solicitați sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.



Agitați energic conținutul flaconului înainte de utilizare.

#### 4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Reacție la nivel local (de obicei de dimensiunea unui bob de mazăre), se pot dezvolta la locul de administrare al vaccinului, care de obicei dispăre spontan în termen de trei săptămâni. Hipersensibilitate se dezvoltă foarte rar.

#### 4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

În general, nu este oportună vaccinarea cățelele gestante în ultimele două săptămâni înainte de fătare (manipularea animalelor gestante, neliniște, debut de anticorpi etc.).

#### 4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Vaccinul Biocan R poate fi utilizat separat, simultan sau în asociere cu alte vaccinuri Biocan:  
A / Vaccinul Biocan R poate fi utilizat ca diluant pentru alte vaccinuri Biocan liofilizate (de exemplu Biocan DHPPi, DP, P).  
B / Vaccinul Biocan R poate fi administrat simultan, de asemenea, cu vaccinuri lichide: Biocan C, Biocan B, Biocan M și Biocan L.

Nu există informații disponibile privind siguranța și eficacitatea acestui vaccin atunci când este utilizat cu orice alt produs medicinal veterinar, cu excepția produselor menționate mai sus.

#### 4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Dozare - 1 ml din a 12-a săptămâna de viață, indiferent de greutatea și rasa individului.

##### Mod de administrare:

- Subcutanat, cel mai bine în regiunea din spatele omoplatului.

- Intramuscular, cel mai bine în musculatura membrilor posterioare.

Animalele sunt vaccinate de la vârsta de 3 luni. Animale vaccinate mai devreme de vârsta de 3 luni trebuie să fie revaccinate după ce ajung la această vârstă (un interval de minim 14 zile între vaccinări trebuie să fie respectat). Animalele vaccinate pentru prima dată, la vârsta de 3 - 12 luni, trebuie să fie revaccinate la 1 an după prima vaccinare.

Revaccinarea efectuată la un an după primul vaccin protejează animalele împotriva rabiei cel puțin 2 ani. În scopul menținerii imunității, se recomandă să fie revaccinate în conformitate cu reglementările sanitar-veterinare din fiecare țară.

#### Schemă de vaccinare recomandată pentru Biocan

Vârsta cățelului	Situație infecțioasă		
	Favorabilă	Nefavorabilă parvoviroză	Nefavorabilă Distemper
5 - 6 săptămâni		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7 - 8 săptămâni		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8 - 10 săptămâni	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12 - 16 săptămâni	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Revaccinare anuală	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

##### Nota:

Vaccinurile dintre paranteze (P, R, DP, DHPPi) – indică posibilitatea de aplicare alternativă a vaccin din seria Biocan.



Vaccinurile marcat: + C, + L, + LR - indică posibilitatea de utilizare simultană sau în combinație cu alte vaccinuri

**Alte vaccinări posibile:**

- Biocan M - vaccin împotriva *Microsporium canis* pentru câini cu vârsta de peste 12 săptămâni,
- Biocan B - vaccin împotriva bolii Lyme pentru câini cu vârsta de peste 12 săptămâni
- Biocan T - vaccin împotriva tetanosului pentru câini cu vârsta de peste 12 săptămâni.



**4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

O doză dublă de vaccin, nu are alte efecte adverse asupra animalelor țintă față de cele observate la administrarea unei doze.

**4.11 Timp de așteptare**

Zero zile.

**5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

Grupa farmacoterapeutică: 97 imunopreparate veterinare  
Codul veterinar ATC: Q15AA vaccinuri veterinare

Antigenul din vaccin este recunoscut ca un corp străin, după administrare prin vaccinare de corpul animalului și astfel o varietate de mecanisme de apărare ale organismului sunt activate (macrofage, opsonine, interleukine, limfocite B, etc.), iar rezultatul este producerea de anticorpi specifici împotriva factorilor determinanți din antigeni conținuți în vaccin. Aceste mecanisme sunt concepute pentru a preveni dezvoltarea în continuare a infecției după contractare a bolii.

Animalele sunt vaccinate de la vârsta de 3 luni.

**Proprietăți referitoare la mediul înconjurător**

Nu există nici un pericol dacă produsul este folosit conform instrucțiunilor.

**6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

**6.1 Lista excipienților**

Mediu nutritiv MEM, algedrat, tiomersal.

Cultura celulară folosită pentru producția de vaccin: BHK-21 celule renale de hamster

**6.2 Incompatibilități**

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar, cu excepția vaccinurilor liofilizate Biocan și vaccinurilor lichide Biocan C, Biocan B, Biocan M și Biocan L.

**6.3 Perioadă de valabilitate**

Perioada de valabilitate așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 de luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere - 10 ore.

**6.4 Precauții speciale pentru depozitare**

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A nu se congela.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat.

**6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**



Ambalajul primar este flacon din sticlă cu 1 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml sau 100 ml de vaccin.

A) cutie de plastic cu capac și cu 10 godeuri:  
10 × 1 ml de vaccin Biocan R

B) cutie de plastic cu capac și cu 20 godeuri:  
20 × 1 ml de vaccin Biocan R

C) cutie de plastic cu capac și cu 100 de godeuri:  
50 × 1 ml de vaccin Biocan R  
100 × 1 ml de vaccin Biocan R

D) cutie de plastic cu capac și cu 10 godeuri:  
1 × 5 ml  
5 × 5 ml    5 × 10 ml  
10 × 5 ml    10 × 10 ml

E) cutie de carton  
1 × 10 ml            1 × 20 ml            1 × 50 ml            1 × 100 ml  
                          5 × 20 ml  
                          10 × 20 ml

Prospectul este în fiecare pachet.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

#### **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

#### **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Bioveta, a. s.,  
Komenského 212,  
683 23 Ivanovice na Hané,  
Republica Cehă

#### **8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

#### **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**


Data primei autorizari: 09. 02. 2002  
Data ultimei reinnoiri: 16.07.2012

#### **10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**


07.2012


Informații detaliate referitoare la acest produs medicinal veterinar sunt disponibile pe website-ul Agenției Europene a Medicamentelor: <http://www.ema.europa.eu/>.





**ANEXA III**  
**ETCHETARE ȘI PROSPECT**





**A. ETICHETARE**



## INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

cutie de plastic cu capac și cu 10, 20 și 100 godeuri/ 10 × 1 ml, 20 × 1 ml, 50 × 1 ml, 100 × 1 ml  
cutie de plastic cu capac și cu 10 godeuri / 1 × 5 ml, 5 × 5 ml, 10 × 5 ml, 5 × 10 ml, 10 × 10 ml  
cutie de carton / 1 × 10 ml, 5 × 10 ml, 1 × 20 ml, 5 × 20 ml, 10 × 20 ml, 1 × 50 ml, 1 × 100 ml, 10 × 10 ml

### 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

**Biocan R suspensie injectabilă**  
Vaccin inactivat împotriva rabiei

### 2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Compoziție - 1 ml:

**Substanță activă** Virusul rabiei inactivat, tulpina SAD Vnukovo-32 min. 2 UI

**Excipienți** - Mediu nutritiv MEM, algeidrat, tiomersal

### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă.

### 4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 × 1 ml (sau altă dimensiune)

### 5. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, dihori, bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine.

### 6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru imunizarea activă a speciilor de animale țintă împotriva rabiei.

### 7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Subcutanată, intramusculară.  
Citiți prospectul înainte de utilizare.

### 8. TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

### 9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Agitați energic conținutul flaconului înainte de utilizare. Vaccinați numai indivizi clinic sănătoși într-o stare nutrițională adecvată. Posibilele tratamente anti-parazitare trebuie să fie efectuate înainte de vaccinare cu cel puțin 10 zile. O săptămână după vaccinare, nu este recomandat a se efectua antrenamente cu animalele vaccinate sau orice alte proceduri stresante.

### 10. DATA EXPIRĂRII

EXP:





Perioada de valabilitate după prima deschidere - 10 ore.

**11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A se proteja de lumină. A se păstra într-un loc uscat.  
A nu se congela.

**12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz**

„Numai pentru uz veterinar” Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

**14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPILOR”**

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

**15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Bioveta, a. s.  
Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă

**16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

120237

**17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

Lot:



**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

flacon de sticlă / 50 ml, 100 ml

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**Biocan R suspensie injectabilă**  
Vaccin inactivat împotriva rabiei

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE**

Compoziție - 1 ml:

**Substanță activă** Virusul rabiei inactivat, tulpina SAD Vnukovo-32 min. 2 UI

**Excipienți** - Mediu nutritiv MEM, algedrat, tiomersal

**3. FORMA FĂRMACEUTICĂ**

Suspensie injectabilă.

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

1× 50 ml / 1× 100 ml

**5. SPECII ȚINTĂ**

Câini, pisici, dihori, bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine.

**6. INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Pentru imunizarea activă a speciilor de animale țintă împotriva rabiei.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Subcutanată, intramusculară.  
Citiți prospectul înainte de utilizare.

**8. TIMP DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

**9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Agitați energic conținutul flaconului înainte de utilizare. Vaccinați numai indivizi clinic sănătoși într-o stare nutrițională adecvată. Posibilele tratamente anti-parazitare trebuie să fie efectuate înainte de vaccinare cu cel puțin 10 zile. O săptămână după vaccinare, nu este recomandat a se efectua antrenamente cu animalele vaccinate sau orice alte proceduri stresante.

**10. DATA EXPIRĂRII**

EXP:

Perioada de valabilitate după prima deschidere - 10 ore.

**11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**



A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A se proteja de lumină. A se păstra într-un loc uscat.  
A nu se congela.

**12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

„Numai pentru uz veterinar” Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

**14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPILOR”**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Bioveta, a. s.  
Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă

**16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

120237


**17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

Lot:



**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

flacon de sticlă / 5 ml, 10 ml, 20 ml



**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**Biocan R suspensie injectabilă**  
Vaccin inactivat împotriva rabiei

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)**

Compoziție - 1 ml: *Virusul rabiei* inactivat, tulpina SAD Vnukovo-32 min. 2 UI

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

5 doze / 10 doze / 20 doze

**4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE**

Suspensie injectabilă.

**5. TIMP DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

**6. NUMĂRUL SERIEI**

Lot

**7. DATA EXPIRĂRII**

EXP

**8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.  
Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.



**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

flacon de sticlă / 1 ml

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**Biocan R**

Vaccin inactivat împotriva rabiei

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)**

1 ml: *Virusul rabiei* inactivat, tulpina SAD Vnukovo-32 min. 2 UI

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

1 doză

**4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE**

s.c., i.m.

**5. TIMP DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

**6. NUMĂRUL SERIEI**

Lot

**7. DATA EXPIRĂRII**

EXP


**8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.



ANEXA nr 4



**B.PROSPECT**



**PROSPECT PENTRU**  
**Biocan R suspensie injectabilă**  
Vaccin inactivat împotriva rabiei  
*Virusul rabiei inactivat (min. 2 UI)*

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**Biocan R suspensie injectabilă**  
Vaccin inactivat împotriva rabiei

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)**

Compoziție - 1 ml:

<b>Ingredient activ</b>	-	<i>Virusul rabiei</i> inactivat, tulpina SAD Vnukovo-32	min. 2 UI
<b>Excipienți</b>	-	Mediu nutritiv MEM, algedrat, tiomersal	

**4 INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Pentru imunizarea activă a speciilor de animale țintă împotriva rabiei.

**5. CONTRAINDICAȚII**

Boli febrile sistemice. Animale nevaccinate, rănite sau în contact cu animale infectate cu rabie. Animale, care au mușcat sau rănit un om, pot fi vaccinate numai după încheierea perioadei de observație.

**6. REACȚII ADVERSE**

Reacție la nivel local (de obicei de dimensiunea unui bob de mazăre), se pot dezvolta la locul de administrare al vaccinului, care de obicei dispare spontan în termen de trei săptămâni. Hipersensibilitate se dezvoltă foarte rar.

**7. SPECII ȚINTĂ**

Câini, pisici, dihuri, bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine.

**8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Dozare - 1 ml din a 12-a săptămâna de viață, indiferent de greutatea și rasa individului.

Mod de administrare:

- Subcutanat, cel mai bine în regiunea din spatele omoplatului.

- Intramuscular, cel mai bine în musculatura membrelor posterioare.

Animalele sunt vaccinate de la vârsta de 3 luni. Animale vaccinate mai devreme de vârsta de 3 luni trebuie să fie revaccinate după ce ajung la această vârstă (un interval de minim 14 zile între vaccinări trebuie să fie respectat). Animalele vaccinate pentru prima dată, la vârsta de 3 - 12 luni, trebuie să fie revaccinate la 1 an după prima vaccinare.



## Schemă de vaccinare recomandată pentru Biocan

Vârsta cățelului	Situatie infecțioasă		
	Favorabilă	Nefavorabilă parvoviroză	Nefavorabilă Distemper
5 - 6 săptămâni		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7 - 8 săptămâni		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8 - 10 săptămâni	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12 - 16 săptămâni	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Revaccinare anuală	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)



### Nota:

Vaccinurile dintre paranteze (P, R, DP, DHPPi) – indică posibilitatea de aplicare alternativă a unui alt vaccin din seria Biocan.

Vaccinurile marcat: + C, + L, + LR - indică posibilitatea de utilizare simultană sau în combinație cu alte vaccinuri

### Alte vaccinări posibile:

Biocan M - vaccin împotriva *Microsporum canis* pentru câini cu vârsta de peste 12 săptămâni,

Biocan B - vaccin împotriva bolii Lyme pentru câini cu vârsta de peste 12 săptămâni

Biocan T - vaccin împotriva tetanosului pentru câini cu vârsta de peste 12 săptămâni.

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Agitați energic conținutul flaconului înainte de utilizare.

Vaccinați numai indivizi clinic sănătoși într-o stare nutrițională adecvată. Posibilele tratamente anti-parazitare trebuie să fie efectuate înainte de vaccinare cu cel puțin 10 zile. O săptămână după vaccinare, nu este recomandat a se efectua antrenamente cu animalele vaccinate sau orice alte proceduri stresante.

## 10. TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A se proteja de lumină. A se păstra într-un loc uscat.

A nu se congela.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere - 10 ore.

## 12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Vaccinați numai indivizi clinic sănătoși într-o stare nutrițională adecvată. Posibilele tratamente anti-parazitare trebuie să fie efectuate înainte de vaccinare cu cel puțin 10 zile. O săptămână după vaccinare, nu este recomandat a se efectua antrenamente cu animalele vaccinate sau orice alte proceduri stresante.

Agitați energic conținutul flaconului înainte de utilizare.

În general, nu este oportună vaccinarea cățelele gestante în ultimele două săptămâni înainte de fătare (manipularea animalelor gestante, neliniște, debut de anticorpi etc.)

Vaccinul Biocan R poate fi utilizat separat, simultan sau în asociere cu alte vaccinuri Biocan:





A / Vaccinul Biocan R poate fi utilizat ca diluant pentru alte vaccinuri Biocan liofilizate (de exemplu Biocan DHPPi, DP, P).

B / Vaccinul Biocan R poate fi administrat simultan, de asemenea, cu vaccinuri lichide: Biocan C, Biocan B, Biocan M și Biocan L.

Nu există informații disponibile privind siguranța și eficacitatea acestui vaccin atunci când este utilizat cu orice alt produs medicinal veterinar, cu excepția produselor menționate mai sus. O decizie de a utiliza acest vaccin înainte sau după orice alt produs medicinal veterinar, prin urmare, trebuie să fie luată de la caz la caz.

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar, cu excepția vaccinurilor liofilizate Biocan și vaccinurilor lichide Biocan C, Biocan B, Biocan M și Biocan L.

### 13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

### 14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

07.2012

### 15. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

Ambalaj:

A) cutie de plastic cu capac și cu 10 godeuri:

10 × 1 ml de vaccin Biocan R

B) cutie de plastic cu capac și cu 20 godeuri:

20 × 1 ml de vaccin Biocan R

C) cutie de plastic cu capac și cu 100 de godeuri:

50 × 1 ml de vaccin Biocan R

100 × 1 ml de vaccin Biocan R

D) cutie de plastic cu capac și cu 10 godeuri:

1 × 5 ml

5 × 5 ml    5 × 10 ml

10 × 5 ml    10 × 10 ml

E) cutie de carton

1 × 10 ml    1 × 20 ml    1 × 50 ml    1 × 100 ml

5 × 20 ml

10 × 20 ml

Prospectul este în fiecare pachet.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

