

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo, 38 cm, zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanță activă:

Propoxur 98,7 mg/g

O zgardă cu lungimea de 38 cm (12,5 g) conține: propoxur 1,23 g

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Zgardă antiparazitară.

Zgardă din policlorură de vinil (PVC) de culoare maro.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Pisici și câini (sub 10 kg)

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru prevenirea și combaterea puricilor și căpușelor la câini și pisici.

4.3 Contraindicații

A nu se folosi la animale care constituie sursă de hrană.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Nu lăsați câinii cu această zgardă în apropierea copiilor sau a bebelușilor.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

A nu se folosi la câinii bolnavi sau în perioada de convalescență.

A nu se folosi la animalele care alăptează.

A nu se folosi la căței de până în 3 luni.

A nu se folosi la câinii cu leziuni ale pielii.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Evitați contactul direct cu pielea.

Purtați mănuși de protecție în timpul atașării zgărzii.



Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul atașării zgărzii.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

În primele zile de utilizare, animalele mai sensibile pot prezenta ușoară sensibilitate cutanată și prurit ușor.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație

Lactație

A nu se folosi la animalele aflate în perioada de lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu tratați animalul dumneavoastră cu alte insecticide în același timp cu folosirea zgărzii.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Bolfo zgardă (38cm) se utilizează pentru câini de până în 10 kg greutate vie și pisici.

Doar pentru uz extern!

Zgarda oferă o protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni, iar împotriva căpușelor pe o durată de 10 săptămâni. Zgarda Bolfo este eficientă împotriva puricilor și căpușelor numai dacă este folosită în mod continuu.

Puricii de pe câine sunt omorâți la câteva ore după atașarea zgărzii. Căpușele sunt omorâte în aproximativ o zi de la atașarea zgărzii. Căpușele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi îndepărtate foarte ușor. Pierderea efectului se poate verifica prin zgărirea zgărzii cu un obiect metalic. Dacă locul zgărit este alb, zgarda are încă efect. În caz contrar, trebuie utilizată o zgardă nouă.

Rareori se poate întâmpla să existe totuși căpușe pe animalul care poartă zgarda Bolfo. Aceste căpușe se ascund doar în blană și vor cădea de pe animal fără a absorbi sângele.

Sfaturi pentru o administrare corectă

Scoateți zgarda din învelișul protector și desfaceți-o. Puneți zgarda în jurul gâtului animalului. Dacă e corect pusă, între zgardă și gâtul animalului ar trebui să fie un spațiu în care să încapă două degete.

Zgarda devine eficientă la 24 ore de la punerea ei la gâtul animalului. Durata și nivelul de eficiență depind de grosimea și lungimea părului, de activitățile animalului și de nivelul infestării.

Este de preferat să spălați părul animalului, dacă nu este curat, înainte de punerea zgărzii.

Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot și pusă la loc imediat după uscarea părului.

Puricii pot fi gazde interimare pentru tenii, de aceea este bine să folosiți în paralel și medicamente endoparaziticide. De asemenea, mediul înconjurător poate găzdui purici, ouă sau larve de purici. Acestea vor evolua în timp în purici. De aceea, pentru un tratament eficient împotriva puricilor, este necesară stropirea cu insecticide adecvate a mediului înconjurător din imediata apropiere a câinelui dumneavoastră.



4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.

Dacă accidental părți din zgardă sunt înghițite, ar putea să apară salivări excesive, vomă, contracții ale pupilelor, diaree. În aceste cazuri consultați imediat medicul veterinar. Antidot: Atropină sulfat.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.



5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide pentru uz topic, inclusiv insecticide, carbamați, codul veterinar ATC: QP53AE02

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Insecticidele din grupa carbamaților prezintă o toxicitate moderată la mamifere, sunt metabolizate rapid și nu se acumulează în țesuturi.

Inhibarea colinesterazei, relativ de scurtă durată, este reversibilă.

5.2 Particularități farmacocinetice

Ingredientul activ este eliberat în mod continuu de către zgardă. Principalii metaboliți sunt O-hidroxifenil N-metilcarbammat și 2-izopropoxifenol; ultimul regăsindu-se în urină ca glucuronidă. Urina este principala cale de eliminare a acestui compus.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

N dibutil-adipat, propilenglicol dicaprilocatrat, ulei de soia epoxidat, acid stearic, amestec de pigmenți (amestec de oxizi de fier cu dioxid de titan), policlorură de vinil (PVC)

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

O zgardă cu dimensiunea de 38 cm este ambalată în folie de poliester/polietilenă, sigilată în vid și apoi introdusă într-o cutie de carton.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen Germania

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE



110184

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI


04.10.1999 / 08.08.2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

02.2012

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.



[Handwritten signature]

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton pentru zgardă cu dimensiunea de 38 cm aflată în folie de poliester/polietilenă

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo, 38 cm, zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică
Propoxur

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

O zgardă (12,5 g) conține:

Substanță activă:

Propoxur 1,23 g

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Zgardă antiparazitară

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

38 cm

5. SPECII ȚINTĂ

Pisici și câini (până în 10 kg)

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru prevenirea și combaterea puricilor și căpușelor la câini și pisici.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ


Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP: {lună/an}

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ



Citiți prospectul înainte de utilizare.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRIȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE


Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen Germania

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

110184

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot: {Număr}



INFORMATII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE FOLII

Bolfo, zgărdă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică

Pungă pentru o zgărdă

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo, zgărdă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică

Propoxur 1,23 g

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE



3. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

4. NUMĂRUL SERIEI

Lot{număr}

5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Romanian, including "SOCIETATEA ROMANA DE PRODUCEREA SI DISTRIBUTIA DE PRODUSE MEDICINALE VETERINARE" and "SRL".

PROSPECT

Bolfo, 38 cm, zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică

Bolfo, 70 cm, zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen
Germania

Producător pentru eliberarea seriei: KVP, Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Kiel, Germania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo, 38 cm, zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică

Bolfo, 70 cm, zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare

Propoxur

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Substanță activă:

Propoxur 98,7 mg/g

	Lungime	Greutate	Propoxur
Bolfo zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică	38 cm	12,5g	1,23 g
Bolfo zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare	70 cm	45 g	4,442 g

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru prevenirea și combaterea puricilor și căpușelor la pisici și câini de talie mică (Bolfo, 38 cm) sau la câini de talie mare (Bolfo, 70 cm).

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se folosi la animale care constituie sursă de hrană.

6. REACȚII ADVERSE

În primele zile de utilizare, animalele mai sensibile pot prezenta ușoară sensibilitate cutanată și prurit ușor.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Bolfo, 38 cm, zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică (până în 10 kg)

Bolfo, 70 cm, zgardă antiparazitara, pentru câini de talie mare (≥ 10 kg)

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bolfo zgardă (38cm) se utilizează pentru câini de până în 10 kg greutate vie și pisici.

Bolfo zgardă (70cm) se utilizează pentru câinii de peste 10 kg.

Doar pentru uz extern!

Zgarda oferă o protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni, iar împotriva căpușelor pe o durată de 10 săptămâni. Zgarda Bolfo este eficientă împotriva puricilor și căpușelor numai dacă este folosită în mod continuu.

Puricii de pe câine sunt omorâți la câteva ore după atașarea zgărzii. Căpușele sunt omorâte în aproximativ o zi de la atașarea zgărzii. Căpușele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi îndepărtate foarte ușor. Pierderea efectului se poate verifica prin zgărirea zgărzii cu un obiect metalic. Dacă locul zgăriat este alb, zgarda are încă efect. În caz contrar, trebuie utilizată o zgardă nouă.

Rareori se poate întâmpla să existe totuși căpușe pe animalul care poartă zgarda Bolfo. Aceste căpușe se ascund doar în blană și vor cădea de pe animal fără a absorbi sângele.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Scoateți zgarda din învelișul protector și desfaceți-o. Puneți zgarda în jurul gâtului animalului. Dacă e corect pusă, între zgardă și gâtul animalului ar trebui să fie un spațiu în care să încapă două degete.

Zgarda devine eficientă la 24 ore de la punerea ei la gâtul animalului. Durata și nivelul de eficiență depind de grosimea și lungimea părului, de activitățile animalului și de nivelul infestării.

Este de preferat să spălați părul animalului, dacă nu este curat, înainte de punerea zgărzii.

Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot și pusă la loc imediat după uscarea părului.

Puricii pot fi gazde interimare pentru tenii, de aceea este bine să folosiți în paralel și medicamente endoparaziticide. De asemenea, mediul înconjurător poate găzdui purici, ouă sau larve de purici. Acestea vor evolua în timp în purici. De aceea, pentru un tratament eficient împotriva puricilor, este necesară stropirea cu insecticide adecvate a mediului înconjurător din imediata apropiere a câinelui dumneavoastră.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se folosi după data expirării înscrisă pe cutia de carton după {EXP}.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu lăsați câinii cu această zgardă în apropierea copiilor sau a bebelușilor.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

A nu se folosi la câinii bolnavi sau în perioada de convalescență.

A nu se folosi la animalele care alăptează.

A nu se folosi la căței de până în 3 luni.
A nu se folosi la câinii cu leziuni ale pielii.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Evitați contactul direct cu pielea.
Purtați mănuși de protecție în timpul atașării zgărzii.
Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul atașării zgărzii.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Lactație

A nu se folosi la animalele aflate în perioada de lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu tratați animalul dumneavoastră cu alte insecticide în același timp cu folosirea zgărzii.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.
Dacă accidental părți din zgardă sunt înghițite, ar putea să apară salivări excesive, vomă, contracții ale pupilelor, diaree. În aceste cazuri consultați imediat medicul veterinar. Antidot: Atropină sulfat.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului

14. DATA ULTIMEI VERIFICARI A PROSPECTULUI

02.2012

15. ALTE INFORMAȚII

Ambalare:

O zgardă (cu dimensiunea de 38 cm sau 70 cm) este ambalată în folie de poliester/polietilenă, sigilată în vid și apoi introdusă într-o cutie de carton.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

S.C. Bayer SRL, Sos. Pipera nr. 42, sector 2, București, 020112, Telefon: +40 21 529 5900

