



ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo, 1,23 g/ zgardă medicamentată, pentru pisici și câini de talie mică (<10 kg)
Bolfo, 4,442 g/zgardă medicamentată, pentru câini de talie mare (≥ 10 kg)

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare zgardă conține:

Substanță activă:

Propoxur 98,7 mg/g

	Lungime	Greutate	Propoxur
Bolfo zgardă medicamentată, pentru pisici și câini de talie mică (<10 kg)	38 cm	12,5 g	1,23 g
Bolfo zgardă medicamentată, pentru câini de talie mare (≥ 10 kg)	70 cm	45 g	4,442 g

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
N dibutil-adipat
Propilenglicol dicaprilocat
Ulei de soia epoxidat
Acid stearic
Oxid de fier (E172)
Dioxid de titan (E171)
Policlorură de vinil (PVC)

Zgardă de culoare brună.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Câini, pisici.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Pentru prevenirea și tratamentul infestării cu purici și căpușe la pisici și câini. Pentru câini și pisici cu infestații mixte sau cu risc de infestații mixte cu purici și căpușe. Produsul medicinal veterinar este indicat când se utilizează împotriva puricilor și căpușelor în același timp.

Zgarda oferă o protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni, iar împotriva căpușelor pe o durată de 10 săptămâni.

3.3 Contraindicații

Nu se utilizează la căței sub vârsta de 3 luni.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.

3.4 Atenționări speciale

Trebuie să se ia în considerare posibilitatea ca și alte animale din aceeași gospodărie să fie o sursă de reinfestare cu muște, purici, căpușe și păduchi și acestea ar trebui tratate, dacă este necesar, cu un produs adecvat.

La fel ca puricii care sunt prezenți pe câine, mediul poate fi contaminat cu ouă de purici, larve sau pupe. Aceștia vor evolua în noi purici în timp. Prin urmare, este important pentru un control eficient al puricilor ca aceste etape intermediare din mediul câinelui să fie, de asemenea, combătute cu un insecticid adecvat aprobat pentru această utilizare.

Puricii pot fi gazde intermediare pentru tenii, prin urmare se recomandă utilizarea simultană a produselor medicinale veterinare endoparazitare. Prin urmare, este important pentru un control eficient al puricilor ca aceste stadii intermediare din mediul câinelui să fie combătute și cu un insecticid adecvat, aprobat pentru această utilizare.

Utilizarea acestui produs trebuie să țină cont de informațiile locale privind susceptibilitatea paraziților țintă, dacă sunt disponibile.

Puricii de pe câine sunt uciși la câteva ore după atașarea zgărzii. Căpușele care sug sânge sunt ucise în aproximativ o zi de la atașarea zgărzii. Căpușele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi îndepărtate foarte ușor.

Căpușele sunt de obicei ucise și cad de pe gazdă în termen de 72 ore de la infestare, fără a fi consumat sânge. Atașarea căpușelor izolate după tratament nu poate fi exclusă. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecțioase cauzate de căpușe nu poate fi complet exclusă în condiții nefavorabile.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Copiii trebuie să evite contactul cu animalele care poartă zgarda.

Depozitați produsul departe de alimente și furaje/hrană.

Copii nu se vor juca cu zgarda.

Zgarda nu trebuie înghițită, suptă sau mestecată de oameni, în special copii.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Nu se utilizează la animale cu obstrucție mecanică a aparatului digestiv sau urinar, astm bronșic sau alte afecțiuni pulmonare și cardiovasculare, deoarece carbamații pot declanșa contracția musculaturii netede.

Nu se utilizează la animale cu leziuni ale pielii.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Evitați contactul direct cu ochii și pielea.

Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul atașării zgărzii.

Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun după manipularea zgărzii.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă propoxur sau la orice excipient trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Acest produs conține un carbamat (propoxur). În caz de simptome toxice vă rugăm să cereți sfatul medicului.

Precauții pentru protecția mediului

Acest produs este foarte toxic pentru organisme acvatice, păsări și albine.

Acest produs poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.

Câinilor cu zgardă nu trebuie să li se permită să înoate în cursurile de apă care conțin organisme acvatice.

3.6 Evenimente adverse

Câini, pisici:

Foarte rare (<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate):	Eritem la locul de aplicare, pierderea părului la locul de aplicare, iritație la locul de aplicare, prurit la locul de aplicare Senzație de mâncărime locală¹, înroșirea locală a pielii¹ Vomă², diaree², salivație²
---	--

¹ după aplicarea zgărzii

² după expunerea la produs pe cale orală

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței produsului medicinal veterinar. Rapoartele se trimit de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului autorizației de comercializare, fie autorității naționale competente prin sistemul național de raportare. Consultați prospectul pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu a fost stabilită siguranța produsului medicinal veterinar în timpul gestației.

Substanța activă nu a demonstrat efecte teratogene, embriotoxice sau toxice pentru reproducție, astfel încât asemenea efecte nu sunt așteptate la animale gestante sau în lactație.

3.8 Interacțiunea cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

A nu se utiliza zgarda în același timp cu administrarea altor insecticide.

3.9 Căi de administrare și doze

Administrare spot-on.

Numai pentru uz extern

Se fixează o zgardă per animal, în jurul gâtului.

La pisicile și câinii de talie mică, cu greutatea corporală mai mică de 10 kg, se utilizează o zgardă medicamentată de 38 cm lungime.

La câinii de talie mare, cu greutatea corporală mai mare de 10 kg se utilizează o zgardă medicamentată de 70 cm lungime.

Dozarea insuficientă ar putea duce la o utilizare inefficientă și poate favoriza dezvoltarea rezistenței.

Pentru a asigura o doză corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai exact posibil.

Recomandări pentru o administrare corectă

Scoateți zgarda din învelișul protector și desfaceți-o.

Asigurați-vă că nu există resturi de conectori de plastic în interiorul zgărzii.

Reglați zgarda în jurul gâtului animalului fără a strânge prea strâns (ca un ghid, ar trebui să fie posibil să se introducă două degete între guler și gât).

Trageți excesul de zgardă prin buclă și tăiați orice lungime în exces mai mare de 2 cm. În special în cazul animalelor tinere potrivirea corectă a zgărzii se verifică în mod regulat și se ajustează.

Zgarda Bolfo este eficientă împotriva puricilor și căpușelor doar dacă se utilizează în mod continuu. Durata și nivelul de eficiență depind de grosimea și lungimea părului, de activitățile animalului și de nivelul infestării.

Este de preferat să spălați părul animalului, dacă nu este curat, înainte de aplicarea zgărzii.

Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot și pusă la loc imediat după uscarea părului.

3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.

În special dacă părți din zgardă sunt mestecate sau înghițite accidental, ar putea să apară simptomele intoxicației cu carbamați cum ar fi salivație, contracții ale pupilelor, vomă sau diaree. În cazul în care apar semne clinice de intoxicație cu carbamați tratamentul constă în măsuri simptomatice și administrarea intravenoasă de antidot: atropină sulfat.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioade de așteptare

Nu este cazul.

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QP53AE02

4.2 Farmacodinamie

Insecticidele din grupa carbamaților prezintă o toxicitate moderată la mamifere, sunt metabolizate rapid și nu se acumulează în țesuturi.

Inhibarea colinesterazei, relativ de scurtă durată, este reversibilă.

4.3 Farmacocinetică

Substanța activă este eliberată în mod continuu de către zgardă. Propoxurul nu este absorbit din piele. Principalii metaboliți sunt O-hidroxifenil N-metilcarbammat și 2-izopropoxifenol; ultimul regăsindu-se în urină ca glucuronidă. Urina este probabil principala cale de eliminare a acestui compus.

Proprietăți de mediu

Acest produs este extrem de toxic pentru organismele acvatice, păsări și albine.

Nu permiteți câinilor care poartă această zgardă să înoate în cursuri de apă care conțin organisme acvatice.

Acest produs poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Nu reutilizați ambalajul. Distrugeți sau eliminați ambalajele goale în conformitate cu cerințele locale.


5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

Nu se cunosc.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani.



5.3 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale pentru depozitare. Păstrați zgarda în ambalajul original până la utilizare.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Zgardă din policlorură de vinil, cu lungimea de 38 cm sau 70 cm, în folie de poliester/polietilenă, sigilată în vid, în cutie de carton.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Produsul medicinal veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece propoxurul poate fi periculos pentru pești și alte organisme acvatice.

Utilizați sistemele de returnare a oricărui produs medicinal veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite din acesta, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile produsului medicinal veterinar respectiv.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Elanco Animal Health GmbH

7. NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Bolfo, 1,23 g/ zgardă medicamentată, pentru pisici și câini de talie mică: 160279
Bolfo, 4,442 g/zgardă medicamentată, pentru câini de talie mare: 160280

8. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI

Data primei autorizări: 04.10.1999

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

07/2025

10. CLASIFICAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE

Produs medicinal veterinar care se eliberează fără prescripție.

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind Produsele (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

ANEXA III
ETICHETAREA ȘI PROSPECTUL

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo 1,23 g/ zgardă medicamentată

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare zgardă (12,5 g) conține:

Substanță activă:

Propoxur 1,23 g

3. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 zgardă (38 cm)

4. SPECII ȚINTĂ

Pisici și câini (< 10 kg)



5. INDICAȚII

Pentru prevenirea și tratamentul infestării cu purici și căpușe la pisici și câini.

Pentru câini și pisici cu infestații mixte sau cu risc de infestații mixte cu purici și căpușe. Produsul medicinal veterinar este indicat când se utilizează împotriva puricilor și căpușelor în același timp.

Zgarda oferă o protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni, iar împotriva căpușelor pe o durată de 10 săptămâni.

6. CĂI DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

Numai pentru uz extern.

7. PERIOADE DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

8. DATA EXPIRĂRII

Exp {lună/an}

După deschidere, a se utiliza imediat.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul originalul până la utilizare.

10. MENȚIUNEA „A SE CITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE”

A se citi prospectul înainte de utilizare.

11. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

12. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

13. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Elanco logo

14. NUMERELE AUTORIZAȚIILOR DE COMERCIALIZARE

160279

15. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

FOLIE DE POLIESTER/POLIETILENĂ

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo 1,23 g/ zgardă medicamentată

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare zgardă (12,5 g) conține:

Substanță activă:

Propoxur 1,23 g

3. SPECII ȚINTĂ

Pisici și câini (< 10 kg)



4. CĂI DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

5. PERIOADE DE AȘTEPTARE

Perioadele de așteptare:

6. DATA EXPIRĂRII

Exp. {ll/aaaa}

După deschidere, a se utiliza imediat.

7. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original până la utilizare.

8. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Elanco logo

9. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}





B. PROSPECTUL

PROSPECTUL

1. Denumirea produsului medicinal veterinar

Bolfo 1,23g/ zgardă medicamentată, pentru pisici și câini de talie mică (<10 kg)

Bolfo 4,442g/ zgardă medicamentată, pentru câini de talie mare (≥10 kg)

2. Compoziție

Fiecare zgardă conține:

Substanță activă:

Propoxur 98,7 mg/g

	Lungime	Greutate	Propoxur
Bolfo zgardă medicamentată, pentru pisici și câini de talie mică (<10 kg)	38 cm	12,5 g	1,23 g
Bolfo zgardă medicamentată, pentru câini de talie mare (≥10 kg)	70 cm	45 g	4,442 g

Zgardă de culoare brună.

3. Specii țintă

Câini, pisici.



4. Indicații de utilizare

Pentru prevenirea și tratamentul infestării cu purici și căpușe la pisici și câini de talie mică.

Pentru câini și pisici cu infestații mixte sau cu risc de infestații mixte cu purici și căpușe. Produsul medicinal veterinar este indicat când se utilizează împotriva puricilor și căpușelor în același timp.

Zgarda oferă o protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni, iar împotriva căpușelor pe o durată de 10 săptămâni.

5. Contraindicații

Nu se utilizează la căței sub vârsta de 3 luni.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Trebuie să se ia în considerare posibilitatea ca și alte animale din aceeași gospodărie să fie o sursă de reinfestare cu muște, purici, căpușe și păduchi și acestea ar trebui tratate, dacă este necesar, cu un produs adecvat.

La fel ca puricii care sunt prezenți pe câine, mediul poate fi contaminat cu ouă de purici, larve sau pupe. Aceștia vor evolua în noi purici în timp. Prin urmare, este important pentru un control eficient al puricilor ca aceste etape intermediare din mediul câinelui să fie, de asemenea, combătute cu un insecticid adecvat aprobat pentru această utilizare.

Puricii pot fi gazde intermediare pentru tenii, prin urmare se recomandă utilizarea simultană a produselor medicinale veterinare endoparazitare. Prin urmare, este important pentru un control eficient al puricilor ca aceste stadii intermediare din mediul câinelui să fie combătute și cu un insecticid adecvat, aprobat pentru această utilizare.

Utilizarea acestui produs trebuie să țină cont de informațiile locale privind susceptibilitatea paraziților țintă, dacă sunt disponibile.

Puricii de pe câine sunt uciși la câteva ore după atașarea zgărzii. Căpușele care sug sânge sunt ucise în aproximativ o zi de la atașarea zgărzii. Căpușele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi îndepărtate foarte ușor.

Căpușele sunt de obicei ucise și cad de pe gazdă în termen de 72 de ore de la infestare, fără a fi consumat sânge. Atașarea căpușelor izolate după tratament nu poate fi exclusă. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecțioase cauzate de căpușe nu poate fi complet exclusă în condiții nefavorabile.

Precauții speciale pentru utilizare

Copiii trebuie să evite contactul cu animalele care poartă zgarda.

Depozitați produsul departe de alimente și furaje/hrană.

Copii nu se vor juca cu zgarda.

Zgarda nu trebuie înghițită, suptă sau mestecată de oameni, în special copii.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Nu se utilizează la animale cu obstrucție mecanică a aparatului digestiv sau urinar, astm bronșic sau alte afecțiuni pulmonare și cardiovasculare, deoarece carbamații pot declanșa contracția musculaturii netede.

Nu se utilizează la animale cu leziuni ale pielii.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Evitați contactul direct cu ochii și pielea.

Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul atașării zgărzii.

Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun după manipularea zgărzii.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă propoxur sau la orice excipient trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Acest produs conține un carbamat (propoxur). În caz de simptome toxice vă rugăm să cereți sfatul medicului.

Precauții pentru protecția mediului

Acest produs este foarte toxic pentru organisme acvatice, păsări și albine.

Acest produs poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.

Câinilor cu zgardă nu trebuie să li se permită să înoate în cursurile de apă care conțin organisme acvatice.

Gestație și lactație:

Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită în timpul gestației.

Substanța activă nu a demonstrat efecte teratogene, embriotoxice sau toxice pentru reproducție, astfel încât asemenea efecte nu sunt așteptate la animale gestante sau în lactație.

Interacțiunea cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

A nu se utiliza zgarda în același timp cu administrarea altor insecticide.

Supradozaj:

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.

În special dacă părți din zgardă sunt mestecate sau înghițite accidental, ar putea să apară simptomele

intoxicației cu carbamați cum ar fi salivație, contracții ale pupilelor, vomă sau diaree. În cazul în care apar semne clinice de intoxicație cu carbamați tratamentul constă în măsuri simptomatice și administrarea intravenoasă de antidot: atropină sulfat.

7. Evenimente adverse

Câini, pisici:

Foarte rare (<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate):
Eritem la locul de aplicare, pierderea părului la locul de aplicare, iritație la locul de aplicare, prurit la locul de aplicare
Senzație de mâncărime locală ¹ , înroșirea locală a pielii ¹
Vomă ² , diaree ² , salivație ²

¹după aplicarea zgărzii

²după expunerea la produs pe cale orală

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați mai întâi medicul dumneavoastră veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul autorizației de comercializare utilizând datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: farmacovigilenta@ansvsa.ro; icbmrv@icbmrv.ro.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Administrare spot-on.

Numai pentru uz extern.

Se fixează o zgardă per animal, în jurul gâtului.

La pisicile și câinii de talie mică, cu greutatea corporală mai mică de 10 kg, se utilizează o zgardă medicamentată de 38 cm lungime.

La câinii de talie mare, cu greutatea corporală mai mare de 10 kg se utilizează o zgardă medicamentată de 70 cm lungime.

Dozarea insuficientă ar putea duce la o utilizare inefficientă și poate favoriza dezvoltarea rezistenței.

Pentru a asigura o doză corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai exact posibil.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Scoateți zgarda din învelișul protector și desfaceți-o.

Asigurați-vă că nu există resturi de conectori de plastic în interiorul zgărzii.

Reglați zgarda în jurul gâtului animalului fără a strânge prea strâns (ca un ghid, ar trebui să fie posibil să se introducă două degete între guler și gât).

Trageți excesul de zgardă prin buclă și tăiați orice lungime în exces mai mare de 2 cm. În special în cazul animalelor tinere potrivirea corectă a zgărzii se verifică în mod regulat și se ajustează.

Zgarda Bolfo este eficientă împotriva puricilor și căpușelor doar dacă se utilizează în mod continuu. Durata și nivelul de eficiență depind de grosimea și lungimea părului, de activitățile animalului și de nivelul infestării.

Este de preferat să spălați părul animalului, dacă nu este curat, înainte de aplicarea zgărzii.

Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot și pusă la loc imediat după uscarea părului.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. A se păstra în ambalajul original până la utilizare.

Nu utilizați acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe cutia de carton după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Produsul medicinal veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece propoxurul poate fi periculos pentru pești și alte organisme acvatice.

Utilizați sistemele de returnare a oricărui produs medicinal veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite din acesta, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea produselor medicinale veterinare

Produs medicinal veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele autorizațiilor de comercializare și dimensiunile de ambalaj

160279, Bolfo, 1,23 g/ zgardă medicamentată, pentru pisici și câini de talie mică (<10 kg)

160280, Bolfo, 4,442 g/zgardă medicamentată, pentru câini de talie mare (≥10 kg)

Zgardă din policlorură de vinil, cu lungimea de 38 cm sau 70 cm, în folie de poliester/polietilenă, sigilată în vid, în cutie de carton.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

07/2025

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind Produsele (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Date de contact

Deținătorul autorizației de comercializare și date de contact pentru raportarea evenimentelor adverse suspectate:

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germania

Tel: +40 376300400

PV.ROU@elancoah.com

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Kiel, Germania