

Versiunea 7.1, 10.2006

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

BRONCHI-SHIELD, liofilizat si solvent pentru suspensie pentru picaturi nazale pentru caini.
Duramune Bb vet (NO si SE)

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

O doză (1 ml) de vaccin conține:

1. Fractia liofilizata:

Substanta activa

Bordetella bronchiseptica, vie, tulipa 92B

2.1×10^6 la 5.5×10^8 UFC(*)

(*) UFC – Unitati formatoare de colonii.

Excipienti:

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1

2. Solvent:

Apă pentru injecții

1 ml

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Liofilizat si solvent pentru suspensie pentru picaturi nazale.
Culoarea uniformă, alb-gălbui..

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Caini.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Imunizarea activă a câinilor în varsta de cel puțin 8 săptămâni, pentru a reduce tusea cauzată de *Bordetella bronchiseptica*.

Durata imunității: 1 an.

Instalarea imunității: în 5 zile de la vaccinare

4.3 Contraindicații

Nu se vaccinează animalele bolnave.

Nu se vaccinează animalele ce sunt sub tratament cu antibacteriene sau imunosupresive.

A se vedea secțiunea 4. 6.

4.4 Atenționări speciale

Produsul conține bacterii vii și trebuie administrat numai pe cale intranasala. Administrarea parenterală poate determina abcese sau inflamații locale.

Dacă un antibiotic este folosit în decursul a 2 săptămâni de la vaccinare, vaccinarea trebuie repetată după terminarea tratamentului cu antibiotic.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale



Cainii vaccinati pot excreta tulpina vaccinala de *Bordetella bronchiseptica* pana la 7 saptamani post vaccinare.

In tot acest timp persoanele cu imunodepresie sunt sfatuite sa evite contactul cu cainii vaccinati. Precautii similare sunt aplicabile de asemenea la animalele nevaccinate sau animalele cu imunodepresie.

Vaccinul s-a dovedit sigur la porci. Pisicile si cainii nevaccinati, in contact cu cainii vaccinati, pot reaciona la tulpina vaccinala, prezantand semne clinice moderate cum ar fi stranut, surgeri oculare sau nazale. Alte animale, cum ar fi iepuri si alte rozatoare mici, nu au fost testate.

Pentru a evita raspandirea tulpinii vaccinale in clinica, trebuie luate masuri speciale

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Dezinfectati mainile si echipamentul dupa administrarea vaccinului.

În caz de auto injectare accidentală in perioada de reconstituire a produsului sau inhalarea acestuia aerosolizat, in timpul administrării în narile cainelui, solicitați imediat sfatul medicului și prezențați prospectul sau eticheta produsului.

Persoanele care adiminstreaza produsul la caini trebuie atentionate ca expunerea repetata la produs prin inhalarea acestuia, poate duce la reactii rare de hipersensibilitate.

Riscul ca persoanele cu imunitate deficitară, să dezvolte infecții cu *Bordetella bronchiseptica* este extrem de scazut, desi aceste indivizi trebuie atentionati ca, animalele vaccinate pot raspandi microorganismele pana la 7 saptamani dupa vaccinare. Persoanele imunosupresate sunt sfatuite sa evite contactul cu vaccinul si cainii vaccinati in timpul perioadei de raspindire.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Ocazional, poate apăre tuse tranzitorie (1-2 zile), în primele zile post vaccinare. Rar se pot observa secreții nazale sau oculare.

La animalele care prezintă semne mai grave, se recomandă tratamentul potrivit cu antibiotice. Totuși, medicii veterinari trebuie sa fie atenți deoarece tratamentul cu antibiotice administrat la mai puțin de 14 zile după vaccinare poate afecta eficacitatea.

Ocazional pot apărea reacții de hipersensibilitate. În caz de reacții anafilactice administrați adrenalină.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu se foloseste la animalele gestante si in lactatie datorită lipsei studiilor de susținere și posibilei răspândiri a tulpinii vaccinale.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu utilizați agenți imunosupresori în luna în care se efectuează vaccinarea.

Nu administrați antibiotice timp de 14 zile după vaccinare.


Nu există informații legate de siguranța și eficacitatea folosirii simultane a acestui vaccin cu oricare alt produs medicinal veterinar. De aceea, decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar, trebuie luată pe baza analizei fiecărui caz.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Vaccinul se administrează sub formă de picături nazale la câini cu vîrstă de cel puțin 8 săptămâni.

Reconstituiri aseptic fracția liofilizată cu solventul.

Agitați bine produsul, după reconstituire. Extrageți vaccinul reconstituit cu seringă din flacon, scoateți acul și înlocuiți-l cu aplicatorul. Vaccinul trebuie utilizat imediat.



Capul câinelui trebuie ținut cu nasul ridicat în sus și gura închisă, astfel încât acesta să fie nevoie să respire prin nări. Administrați produsul intranasal, picătură cu picătură.

Vaccinarea primară:

Vaccinați cu o doză de un ml pentru fiecare câine, începând cu vârsta de 8 săptămâni.

Administrați 0,5 ml de vaccin în fiecare nară. La animalele mai mari (> 15 kg), 1 ml poate fi administrat într-o singură nară.

Administrați o doză cu cel puțin 5 zile înainte de perioada anticipată de risc, de ex. cazarea în boxe.
A se vedea deasemenea și secțiunea 4.5 „Precauții speciale de utilizare”

Vaccinarea de rapel

Rapel anual cu o singură doză.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

În plus față de reacțiile listate în secțiunea 4.6 după administrarea unei supradoze de 10 ori mai mari decât doza normală, cățeii, pot strănută o dată sau de mai multe ori după vaccinare.

Proceduri de urgență: veДЕti secțiunea 4.6.

4.11 Timp de așteptare

Nu se aplică.

5. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE

Vaccin viu, stimulează imunitatea activă împotriva *Bordetella bronchiseptica*.

Grupa Farmacoterapeutică: Vaccinuri bacteriene vii.

Cod ATCvet: QI07AE01

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

1. Fracția liofilizată

Bacto-peptonă

Sucroză

Fosfat dipotasic

Fosfat dihidrogen potasiu

Hidroxid de potasiu

Gelatină 250A

Mediu Eagle HEPES

Acid clorhidric pentru ajustare pH

Hidroxid de sodiu pentru ajustare pH

2. Diluant

Apa pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilități

A nu se combina cu oricare alt produs medicinal, cu excepția diluantului furnizat pentru utilizarea cu produsul.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal asa cum este ambalat pentru vanzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după reconstituire conform indicațiilor: 8 ore.



6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Se păstrează și transportă refrigerat (+2°C și +8 °C) și protejat de lumină.
A nu se congela.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Fractie liofilizată:

Flacon: Flacon de sticlă tip I

Închidere: Dop de cauciuc bromobutilic sigilat cu capac de aluminiu

Diluant:

Flacon: Flacon de sticlă tip I

Închidere: Dop bromobutilic sigilat cu capac de aluminiu

Dimensiunea ambalajului:

Cutii cu 5 flacoane cu câte o doză de liofilizat, 5 flacoane cu câte o doză diluant și 5 canule pentru aplicare.
Cutii cu 10 flacoane cu câte o doză de liofilizat, 10 flacoane cu câte o doză de diluant și 10 canule pentru aplicare.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinarne neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Eliminați materialul nefolosit prin fierbere, incinerare sau imersie într-un dezinfecțant potrivit, aprobat pentru utilizare de către autoritățile competente.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

{Numărul Autorizației de Comercializare}


9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI


INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Se eliberează pe bază de rețetă farmaceutică veterinară.

Importul, vânzarea, eliberarea și / sau utilizarea BrochiShield este sau poate fi interzisă în anumite State Membre, pe întregul sau parte din teritoriul lor, în conformitate cu politicile naționale de sănătate animală. Orice persoană care intenționează să importe, să vândă, să furnizeze și / sau utilizeze BrochiShield trebuie să consulte Autoritatea Competentă a Statului Membru cu privire la politicile de vaccinare actuale, înainte de import, vânzare, eliberare și / sau utilizare.



A. ETICHETARE



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

5x1 doză

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

BRONCHI-SHIELD, liofilizat și solvent pentru suspensie pentru picături nazale pentru câini.

2. DECLARAAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

5 flacoane de *Bordetella bronchiseptica* vii, atenuate, tulpina 92B: 2.1×10^6 to 5.5×10^8 CFU pe doză
5 flacoane de diluant și 5 canule pentru aplicare

3. FORMA FARMACEUTICĂ

A se vedea punctul 1.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

5 x 1 doză

5. SPECII TINTĂ

A se vedea punctul 1.

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Citiți prospectul înainte de utilizare.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Suspensie pentru administrare intranasală.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TEMP DE AȘTEPTARE

Timp de așteptare: Nu este cazul

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

A nu se vaccina cătelele gestante sau în lactație.


10. DATA EXPIRĂRII

<EXP {lună/an}>

Perioada de valabilitate după reconstituire: 8 ore.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

Se păstrează și transportă la frigider (2°C - 8°C).



A nu se congela.
A se protaja de lumină.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Pentru eliminare: Citiți prospectul.

13. MENTIUNE „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”
Se elibereaza numai cu prescriptie medicala.

14. MENTIUNE „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS

<Serie> < Lot> < BN>{număr}



INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Flacon de sticlă tip I: liofilizat

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bronchi-Shield

Liofilizat

Caine

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Bordetela bronchiseptica, tulpina 92B, vie, atenuată

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 doză

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale intranasală

5. TEMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul

6. NUMĂRUL SERIEI

< Serie> < Lot> < BN>{număr}

7. DATA EXPIRĂRII


< EXP {lună/an}>

Se adminisreaza imediat dupa deschiderea flaconului.

8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONI
PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”

P-RF



INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Flacon de sticlă tip I: solvent

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bronchi-Shield

Solvent

Caine

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Apă pentru injecții

3. CONTINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 doză

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale întranazală

5. TEMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul

6. NUMĂRUL SERIEI

< Serie> < Lot> < BN>{număr}

7. DATA EXPIRĂRII

< EXP {lună/an}>

Se adminisreaza imediat dupa deschiderea flaconului.

**8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONI
PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

„Numai pentru uz veterinar”

P-RF



B. PROSPECT



PROSPECT

BRONCHI-SHIELD, liofilizat si solvent pentru suspensie pentru picaturi nazale pentru caini.
Duramune Bb vet (NO si SE)

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Numele și adresa detinatorului autorizatiei de comercializare:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia

Numele și adresa producătorului (producătorilor) responsabil (responsabili) pentru eliberarea seriilor de produs

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

BRONCHI-SHIELD, liofilizat si solvent pentru suspensie pentru picaturi nazale pentru caini.
Duramune Bb vet (NO si SE)

3. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

O doză (1 ml) de vaccin conține:

1. Fractia liofilizata:

Substanta activa

Bordetella bronchiseptica, vie, tulpina 92B 2.1×10^6 la 5.5×10^8 UFC(*)
(*) UFC – Unitati formatoare de colonii.

2. Solvent:

Apă pentru injecții

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Imunizarea activă a cainilor în varsta de cel puțin 8 săptămâni, pentru a reduce tusea cauzată de *Bordetella bronchiseptica*.

Durata imunității: 1 an.

Instalarea imunității: în 5 zile de la vaccinare

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se foloseste la animalele gestante și în lactație

Nu se vaccinează animalele bolnave.

Nu se vaccinează animalele ce sunt sub tratament cu antibacteriene sau imunosuprăsive.

6. REACȚII ADVERSE

Ocazional, poate apărea tuse tranzitorie (1-2 zile) post vaccinare. Rare se pot observa secreții nazale sau oculare.

La animalele care prezintă semne mai grave, poate fi indicat tratamentul potrivit cu antibiotice. Totuși, medicii veterini trebuie să fie atenți deoarece tratamentul cu antibiotice administrat la mai puțin de 14 zile după vaccinare poate afecta eficacitatea.

Ocazional pot apărea reacții de hipersensibilitate. În caz de reacții anafilactice administrați adrenalină.

Dacă observați orice reacție adversă sau alte efecte nementionate în acest prospect, va rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Vaccinul se administrează sub formă de picături nazale la câini cu vîrstă de cel puțin 8 săptămâni.

Vaccinarea primară:

Vaccinați cu o doză de un ml pentru un câine începând cu vîrstă de 8 săptămâni.

Administrați 0,5 ml de vaccin în fiecare nară. La animalele mai mari (> 15 kg), 1 ml poate fi administrat într-o singură nară.

Administrați o doză cu cel puțin 5 zile înainte de perioada anticipată de risc, de ex. cazarea în boxe.

Vaccinarea de rapel

Rapel anual cu o singură doză.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Reconstituiri aseptic fracția liofilizată cu solventul.

Agitați bine produsul, după reconstituire. Extrageți vaccinul reconstituit cu seringa din flacon, scoateți acul și înlocuiți-l cu aplicatorul. Vaccinul trebuie utilizat imediat.

Capul câinelui trebuie să fie întins cu nasul ridicat în sus și gura închisă, astfel încât acesta să fie nevoie să respire prin narile. Administrați produsul intranasal, picătură cu picătură.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider 2 °C - 8 °C.

A nu se congela.

A se feri de lumina.

Nu folosiți după data de expirare inscrisă pe eticheta.

Perioada de valabilitate după reconstituire conform indicațiilor: 8 ore.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Produsul conține bacterii vii și trebuie să fie administrat numai pe cale intranasală. Administrarea pe cale parenterală poate genera abcese și inflamații locale.

Nu se foloseste la animalele gestante și în lactație..

Nu administrați agenți immunosupresori, 1 lună de la vaccinarea cu produsul Bronchi-Shield .
Nu se administrează antibiotice, 14 zile de la vaccinare.

Nu există informații legate de siguranța și eficacitatea folosirii simultane a acestui vaccin cu oricare alt produs medicinal veterinar. De aceea, decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar, trebuie luată pe baza analizei fiecărui caz.

Nu se amestecă cu orice alte medicamentele de uz veterinar, cu excepția solventului livrat pentru utilizare cu produsul.

În plus față de reacțiile adverse menționate la punctul 6 din prospect ("reacții Adverse"), administrarea unei supradoze la cătei, , poate determina strănut o dată sau de mai multe ori după vaccinare.

Tratamentul de urgență: se regăseste la punctul 6 din prospectul însoțitor.

Precauții speciale pentru utilizare în animale

Cainii vaccinati pot excreta tulpina vaccinală de *Bordetella bronchiseptica* pana la 7 săptamani post vaccinare.

În tot acest timp persoanele cu imunodepresie sunt sfatuite să evite contactul cu cainii vaccinati. Precautii similare sunt aplicabile de asemenea la animalele nevaccinate sau animalele cu imunodepresie.

Vaccinul s-a dovedit sigur la porci. Pisicile și cainii nevaccinati, în contact cu cainii vaccinati, pot reacționa la tulpina vaccinală, prezintând semne clinice moderate cum ar fi stranut, surgeri oculare sau nazale. Alte animale, cum ar fi iepuri și alte rozatoare mici, nu au fost testate.

Pentru a evita răspandirea tulpinii vaccinale în clinica, trebuie luate măsuri speciale

În cazul în care se administrează antibiotice în termen de 2 săptămâni după vaccinare, vaccinarea trebuie repetată după finalizarea tratamentului cu antibiotice.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Dezinfectați mainile și echipamentul după administrarea vaccinului.

În caz de auto injectare accidentală în perioada de reconstituire a produsului sau inhalarea produsului aerosolizat, în timpul administrării în narile cainelui, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului.

Persoanele care administrează produsul la caini, trebuie atente la expunerea repetată la produs prin inhalarea acestuia, poate duce la reacții rare de hipersensibilitate.

Riscul ca persoanele cu imunitate deficitară, să dezvolte infecții cu *Bordetella bronchiseptica* este extrem de scăzut, deși acești indivizi trebuie atenționati că, animalele vaccinate pot răspândi microorganismele pana la 7 săptamani după vaccinare. Persoanele imunosuprăzute sunt sfatuite să evite contactul cu vaccinul și cainii vaccinati în timpul perioadei de răspindire.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Vaccin viu, stimulează imunitatea activă împotriva *Bordetella bronchiseptica*.

Grupa Farmacoterapeutică: Vaccinuri bacteriene vii.

Cod ATCvet: QI07AE01

Tipul și conținutul ambalajului -

Flacoane de sticlă tip I, cu 5 sau 10 x 1 ml (doză). Fiecare doză este o combinație dintre un flacon cu fracția de liofilizat și un flacon cu solvent și o canulă pentru aplicare. Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează pe bază de rețetă farmaceutică veterinară.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Zoetis România SRL

Willbrook Platinum Business & Convention Center
Șos. București Ploiești, nr. 172-176, Corp B, Etaj 5,
Sector 1, 013686, București
Tel: + 40 21 207 17 70
Fax: + 40 21 207 17 71

