



CEVAC® BROILER ND K

vaccin inactivat, sub formă de emulsie uleioasă, pentru imunizarea păsărilor contra maladii de Newcastle (ND)

COMPOZIȚIE

virusul bolii de Newcastle, tulpina LaSota min 50 PO₅₀
adjuvant uleios max. 0,064 g

Ouăle embrionate folosite la producția vaccinului provin din efective de păsări "specific pathogen free", (SPF).

INDICAȚII

CEVAC® BROILER ND K este recomandat atât pentru vaccinarea puilor de vârstă mică, respectiv cei de o zi, contra pseudopestei aviare, cât și pentru vaccinarea păsărilor în vârstă de peste 10 săptămâni.

CEVAC® BROILER ND K poate fi administrat singur sau concomitent cu un vaccin cu virus viu atenuat ND.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

CEVAC® BROILER ND K trebuie injectat subcutanat (sub pielea gâtului) sau intramuscular (în mușchii pieptului sau ai coapselor), în doză de - 0,1 ml/ pui;
- 0,25 ml/ pasăre adultă

Puii care vor deveni găini ouătoare sau părinți se pot revaccina la vârsta de 6-8 săptămâni.

PRECAUȚII GENERALE

O protecție satisfăcătoare poate fi dobândită numai pe efective sănătoase, bine dezvoltate.

Folosiți numai echipament de injectare steril.

Aduceți vaccinul la temperatura camerei (15-25°C) înainte de utilizare.

Verificați dacă seringă automată distribuie doza corectă la o apăsare, în cazul dozajului pentru puii de o zi - 0,1 ml.

Odată flaconul de vaccin deschis, trebuie folosit într-un interval de 24 de ore.

CONTRAINDICAȚII

Nu se cunosc

PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul

PĂSTRARE

Între 2°C și 8°C, ferit de lumină.

A nu se congela.

PREZENTARE

Flacoane de plastic de 50 ml, 100 ml, 500 ml

VALABILITATE

2 ani.

NUMAR AUTORIZAȚIE COMERCIALIZARE 153008 – 18.04.2003

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

PRODUCĂTOR

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5, HUNGARY

IMPORTATOR: CEVA SANTÉ ANIMALE ROMANIA SRL, str. Chindiei 5, sector 4, București, tel: 335 0060, fax: 335 0052