



CEVA SANTE ANIMALE

Ref. no. A14/7-IV/2000

CEVAC® ND-IB-EDS K

vaccin inactivat, în emulsie uleioasă, pentru imunizarea pasarilor împotriva bolii de Newcastle, bronșitei infecțioase și sindromului caderii ouatului

COMPOZITIE

virus al bolii de Newcastle, tulipina LaSota	min 50 PD ₅₀
virusul bronșitei infecțioase, tulipina Massachusetts 41.....	indus min 6 log ₂ HI
virusul sindromului caderii ouatului, tulipina B8/78	indus min 7 log ₂ HI
adjuvant uleios	max 0.255 g
mertiolat	max 45 µg
solutie PBS	ad 0.50 ml

INDICATII

Pentru vaccinarea pasarilor din fermele de reproducție, gainii ouatoare, imunizate anterior cu vaccinuri împotriva bronșitei infecțioase și bolii de Newcastle. Puii rezultati din parintii vaccinati vor avea un titru specific de anticorpi maternali fata de boala de Newcastle și bronșita infecțioasa.

CONTRAINDICATII

Nu se cunosc.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

CEVAC ND-IB-EDS K se administreaza la pulcute în varsta de 16-20 de saptamani cu 3-4 saptamani înainte de începerea ouatului. Vaccinul se injecteaza subcutanat (sub pielea gâtului) sau intramuscular (muschii pieptului sau coapsei) în doza de 0,5 ml pe pasare.

Efectul antigenic de lungă durată și răspunsul imun stabil pe toată perioada de ouat se dostrează adjuvantului uleios al vaccinului. Nivelul anticorpilor pe un efectiv corect vaccinat anterior arată o creștere semnificativă în primele 10-14 zile și atinge nivelul maxim la o lună după vaccinare.

EFFECTE NEDORITE

Vaccinarea nu produce reacții sistemică. Totuși, la locul de inoculare pot apărea inflamații de marimea unui bob de mazare care dispare în majoritatea cazurilor într-un interval de 2-3 săptămâni.

PRECAUTII SPECIALE

O protecție satisfăcătoare poate fi obținută numai în efective de pasari sănătoase. Folosiți instrumentar steril. Înțineți vaccinul la temperatură camerei (15 – 20 °C) cu 3-4 ore înainte de folosire. Agitați bine flacoanele înainte și în timpul folosirii. Verificați acuratețea indicațiilor siringilor pentru a obține un dozaj corect. Odată ce un flacon a fost deschis, conținutul acestuia trebuie folosit în decurs de 24 de ore. Flacoanele deschise de mai mult de 24 de ore trebuie distruse.

AVERTISMENTE

Nu amestecați vaccinul cu alte vaccinuri sau medicamente.

Dacă în mod accidental, operatorul se autoinjectează, acordati atenție medicală de urgență.

PERIOADA DE ASTEPTARE

4 săptămâni la locul injectării.

VALBILITATE

24 luni

PASTRARE

Între 2 – 8 °C, ferit de lumina.

PRESENTARE

Flacoane de 250, 500 ml

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

PRODUCATOR

CEVA PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD
Szallas u. 5, 1107 Budapest, Hungary

IMPORTATOR

CEVA Santé Animale Romania SRL



CEVA SANTE ANIMALE

Ref. no. A14/7-IV/2000

Str. Vespasian 59, sector 1,
Bucuresti 010922
tel: 212 2662

(

(