

REZUMATUL CARACTERISTICILR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Chanox Multi 50 mg/ml suspensie orală pentru porcei, viței și miei

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conține:

Substanță activă:

Toltrazuril 50 mg

Excipienți:

Benzoat de sodiu (E211) 2,1 mg

Propionat de sodiu (E281) 2,1 mg

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie orală.

Suspensie albă sau gălbuie

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Porcine (porcei), bovine (viței din fermele de lapte – vezi secțiunea 4.3) și ovine (miei).

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Porcei: Pentru prevenirea semnelor clinice ale coccidiozei la porceii nou născuți în fermele cu un istoric confirmat de coccidioză cauzată de *Cystoisospora suis*.

Viței: Pentru prevenirea semnelor clinice ale coccidiozei și reducerea eliminării coccidiilor la vițeii crescuți în stabulație pentru înlocuirea vacilor ce produc lapte pentru consum uman (vacii de lapte) în fermele cu un istoric confirmat de coccidioză cauzată de *Eimeria bovis* sau *Eimeria zuernii*.

Miei: Pentru prevenirea semnelor clinice ale coccidiozei și reducerea eliminării coccidiilor la miei crescuți în stabulație în fermele cu un istoric confirmat de coccidioză cauzată de *Eimeria crandallis* și *Eimeria ovinovalis*.

4.3 Contraindicații

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Din motive de mediu:

A nu se utiliza la viței care cântăresc mai mult de 80 kg greutate corporală.

A nu se utiliza în îngrășătorii la vițeii de carne.

Pentru mai multe detalii, vezi secțiunea 4.5 - Alte precauții sau secțiunea 5.3 - Proprietăți referitoare la mediul înconjurător.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Ca la toate produsele antiparazitare, utilizarea repetată și frecventă a antiprotozoarelor din aceeași clasă poate duce la dezvoltarea rezistenței.

Se recomandă tratarea tuturor animalelor dintr-o fermă.

Măsurile igienice pot reduce riscul coccidiozei. De aceea, se recomandă îmbunătățirea concomitentă a condițiilor igienice, în special în ceea ce privește reducerea umezelii și menținerea curățeniei.

Pentru obținerea unui beneficiu maxim, animalele trebuie tratate înainte de apariția semnelor clinice, de exemplu, în perioada prepatentă.

Pentru îmbunătățirea semnelor clinice cauzate de infecția cu coccidia, la animalele la care deja apare diaree, se recomandă adițional instaurarea unei terapii de susținere.

Tratamentul în timpul manifestării bolii are, la purcei, un efect terapeutic limitat, deoarece leziunile la nivelul intestinului subțire s-au instalat deja.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

i) Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu este cazul.

ii) Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la toltrazuril sau la oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Acest produs poate determina iritații la nivelul pielii și ochilor.

Evitați contactul produsului cu pielea și ochii.

În caz de expunere accidentală a pielii sau ochilor, spălați zona afectată cu apă din abundență.

Dacă iritația persistă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Nu mâncați, beți sau fumați în timpul utilizării produsului.

iii) Alte precauții

Metabolitul major al toltrazurilului, toltrazuril sulfona (ponazuril) s-a dovedit a fi atât persistent în sol (perioada de înjumătățire >1 an) cât și mobil și de a fi toxic pentru plante.


Din motive de mediu:

Viței: Pentru prevenirea oricărui efect advers asupra plantelor și a unei posibile contaminări a pânzei freactice, gunoiul de grajd provenit de la viței tratați nu trebuie împrăștiat pe sol fără o amestecare prealabilă cu alt gunoi de grajd provenit de la bovine netratate cu toltrazuril. Cantitatea de gunoi de grajd de la viței tratați trebuie diluată cu o cantitate de gunoi de grajd de la bovinele netratate de cel puțin 3 ori mai mare, înainte de împrăștierea pe sol.

Mieii ținuți pe întreaga durată de viață în cadrul unui sistem de creștere intensivă nu trebuie tratați după vârsta de 6 săptămâni sau dacă au o greutate mai mare de 20 de kg la momentul tratamentului. Gunoiul de la aceste animale poate fi aplicat pe aceeași suprafață la fiecare trei ani.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Nu se cunosc



4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu este cazul

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Toate speciile

Pentru utilizare orală.

Suspensia orală trebuie agitată înainte de utilizare.

Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil.

Pentru obținerea unui beneficiu maxim, animalele trebuie tratate înainte de apariția preconizată a semnelor clinice, de exemplu, în perioada prepatentă.

Purcei

Tratament individual al animalelor.

Fiecare purcel trebuie tratat între zilele 3 - 5 de viață cu o singură doză orală de 20 mg toltrazuril/ kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 0,4 ml suspensie orală/kg greutate corporală.

Datorită volumului mic necesar pentru tratamentul individual al purceilor, se recomandă utilizarea unui echipament care are o acuratețe a dozei de 0,1 ml.

Tratamentul în timpul manifestării bolii are, la purcei, un efect terapeutic limitat, deoarece leziunile la nivelul intestinului subțire s-au instalat deja.

Viței

Fiecare animal trebuie tratat cu o doză orală unică de 15 mg toltrazuril / kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 3,0 ml suspensie orală / 10 kg greutate corporală.

Dacă animalele sunt tratate mai degrabă colectiv decât individual, ar trebui înființate grupuri relativ omogene de aceeași rasă și de aceeași vârstă sau vârstă similară, iar dozarea trebuie făcută conform cu greutatea celui mai greu animal din grup.

Miei

Fiecare animal trebuie tratat cu o doză unică orală de 20 mg toltrazuril / kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 0,4 ml suspensie orală / kg greutate corporală. Dacă animalele sunt tratate mai degrabă colectiv decât individual, ar trebui înființate grupuri rezonabil omogene și dozarea trebuie făcută conform cu greutatea celui mai greu animal din grup.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu au fost raportate manifestări clinice la purcei și viței sănătoși după administrarea orală a unei doze de trei ori mai mare.

Nu au fost observate semne de supradozare la miei, în studiile referitoare la siguranță, cu o singură doză de trei ori mai mare decât doza terapeutică și cu o doză de două ori mai mare decât doza terapeutică, timp de două zile consecutiv.

4.11 Timp de așteptare

Purcei

Carne și organe: 77 zile

Viței

Carne și organe: 63 zile

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

Miei

Carne și organe: 42 zile

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.



5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmaceutică: Antiprotozoare: triazine; toltrazuril

Cod veterinar ATC: QP51AJ01

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Toltrazurilul este un derivat de triazinon. Acționează împotriva coccidiilor din genul *Cystoisospora* și *Eimeria*. Acționează împotriva tuturor stadiilor intracelulare de dezvoltare ale coccidiei, împotriva merozoizilor (multiplicare asexuată) și gametogoniilor (faza sexuată). Toate stadiile sunt distruse, astfel că modul de acțiune este coccidiocid.

5.2 Particularități farmacocinetice

Purcei

După administrarea orală, toltrazurilul este absorbit lent, cu o biodisponibilitate $\geq 70\%$. Principalul metabolit este toltrazuril sulfona. Eliminarea toltrazurilului este lentă cu un timp de eliminare prin înjumătățire de aproximativ 3 zile. Principala cale de excreție este prin fecale.

Viței

După administrarea orală la viței, toltrazurilul este absorbit lent. Concentrația plasmatică maximă ($C_{max} = 36,6$ mg/l) a fost observată după 24-48 de ore (media geometrică este de 33,9 ore) după administrarea orală. Eliminarea toltrazurilului este lentă cu un timp de eliminare prin înjumătățire de aproximativ 2,5 zile (64,2 ore). Principalul metabolit este toltrazuril sulfona. Principala cale de excreție este prin fecale.

Miei

După administrarea orală la mamifere, toltrazurilul este absorbit lent. Principalul metabolit este toltrazuril sulfona. Concentrația plasmatică maximă ($C_{max} = 62$ mg/l) a fost observată după 2 zile după administrarea orală. Eliminarea toltrazurilului este lentă cu un timp de eliminare prin înjumătățire de aproximativ 9 zile. Principala cale de excreție este prin fecale.

Proprietăți referitoare la mediul înconjurător

Metabolitul toltrazurilului, toltrazuril sulfona (ponazuril) s-a dovedit a fi atât persistent în sol (perioada de înjumătățire > 1 an) cât și mobil și are efecte adverse asupra creșterii și dezvoltării plantelor. Având în vedere proprietățile persistente ale ponazurilului, împrăștierea repetată a gunoiului de grajd provenit de la animale tratate poate duce la o acumulare în sol și prin urmare poate reprezenta un risc pentru plante. Acumularea în sol a ponazurilului împreună cu mobilitatea acestuia pot duce la un risc de contaminare a apelor subterane. Vezi secțiunile 4.3 și 4.5.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Benzoat de sodiu (E211)
Propionat de sodiu (E281)
Acid citric monohidrat (pentru ajustarea pH-ului)
Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)
Gumă xantan
Silicat de aluminiu magneziu
Laurilsulfat de sodiu
Propilen glicerol
Emulsie simeticona
Apă purificată.

6.2 Incompatibilități majore

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

6.3 Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru comercializare:
4 ani
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 1 an.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate, de 100 ml sau 250 ml, închise cu un capac înșurubat din polietilenă de înaltă densitate.

și

Flacoane flexi-pack din polietilenă de înaltă densitate, de 1 L și 5 L, închise cu un capac înșurubat din polietilenă de înaltă densitate.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea
Co. Galway
Irlanda

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/ REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

06.12.2017

10. DATA PRIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI



A. ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR/AMBALAJUL PRIMAR

{Cutie /Etichetă pentru flacon de 100 ml, 250 ml, 1L și 5 L}

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Chanox Multi 50 mg/ml suspensie orală pentru purcei, viței și miei
toltrazuril

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare ml conține 50 mg toltrazuril

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie orală

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 ml
250 ml
1 L
5 L

5. SPECII ȚINTĂ

Purcei, viței și miei.

6. INDICAȚII

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru utilizare orală.
Agitați bine înainte de utilizare.
Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Timp de așteptare

Purcei

Carne și organe: 77 zile

Viței

Carne și organe: 63 zile

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

Miel

Carne și organe: 42 zile

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După deschidere se va utiliza până la 1 an

După deschidere a se utiliza până la:

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: citiți prospectul produsului.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irlanda

Reprezentat:

Orion Pharma Romania srl

B-dul T. Vladimirescu nr 22,

Bucuresti, 050883, Romania

Tel: +40 31845 1646

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot

PROSPECT PENTRU

Chanox Multi 50 mg/ml suspensie orală pentru porci, viței și miei

**NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE
COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE,
RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT
DIFERITE**

Deținătorul autorizației de comercializare și a deținătorul autorizației de fabricare, responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea
Co. Galway
Irlanda

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Chanox Multi 50 mg/ml suspensie orală pentru porci, viței și miei
Toltrazuril

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Substanța activă:

Toltrazuril 50 mg/ml

Excipienți:

Benzoat de sodiu (E211) 2,1 mg/ml
Propionat de sodiu (E281) 2,1 mg/ml
Suspensie orală albă sau gălbuie.

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Porci: Pentru prevenirea semnelor clinice ale coccidiozei la porcii nou născuți în fermele cu un istoric confirmat de coccidioză cauzată de *Cystoisospora suis*.

Viței: Pentru prevenirea semnelor clinice ale coccidiozei și reducerea eliminării coccidiilor la vițeii crescuți în stabulație pentru înlocuirea vacilor ce produc lapte pentru consum uman (vacii de lapte) în fermele cu un istoric confirmat de coccidioză cauzată de *Eimeria bovis* sau *Eimeria zuernii*.

Miei: Pentru prevenirea semnelor clinice ale coccidiozei și reducerea eliminării coccidiilor la miei crescuți în stabulație în fermele cu un istoric confirmat de coccidioză cauzată de *Eimeria crandallis* și *Eimeria ovinovalis*.

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza în cazuri de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare din excipienți.
Din motive de mediu:

A nu se utiliza la vițeii care cântăresc mai mult de 80 kg greutate corporală.

A nu se utiliza în îngrășătorii la vițeii de carne.

Pentru mai multe detalii, vezi secțiunea Atenționare (atenționări) specială (speciale)

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar, alternativ, puteți raporta prin intermediul sistemului național de raportare {farmacovigilență@ansva.ro}.



7. SPECII ȚINTĂ

Porci (purcei), bovine (viței din fermele de lapte - vezi secțiunea 5) și ovine (miei).

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru utilizare orală.

Suspensia orală trebuie agitată înainte de utilizare.

Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil.

Pentru obținerea unui beneficiu maxim, animalele trebuie tratate înainte de apariția preconizată a semnelor clinice, de exemplu, în perioada prepatentă.

Purcei

Tratament individual al animalelor.

Fiecare purcel trebuie tratat între zilele 3 - 5 de viață cu o singură doză orală de 20 mg toltrazuril/kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 0,4 ml suspensie orală/kg greutate corporală.

Datorită volumului mic necesar pentru tratamentul individual al purceilor, se recomandă utilizarea unui echipament care are o acuratețe a dozei de 0,1 ml.

Tratamentul în timpul unui focar va avea o valoare limitată pentru purcelul individual din cauza leziunilor la nivelul intestinului subțire care au avut loc deja.

Viței

Fiecare animal trebuie tratat cu o doză unică orală de 15 mg toltrazuril/kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 3,0 ml suspensie orală / 10 kg greutate corporală.

Dacă animalele sunt tratate mai degrabă colectiv decât individual, ar trebui înființate grupuri relativ omogene de aceeași rasă și de aceeași vârstă sau vârstă similară, iar dozarea trebuie făcută conform cu greutatea celui mai greu animal din grup.

Miei

Fiecare animal trebuie tratat cu o doză unică orală de 20 mg toltrazuril / kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 0,4 ml suspensie orală / kg greutate corporală. Dacă animalele sunt tratate mai degrabă colectiv decât individual, ar trebui înființate grupuri rezonabil omogene și dozarea trebuie făcută conform cu greutatea celui mai greu animal din grup.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Agitați bine înainte de utilizare.

Pentru asigurarea administrării unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cu acuratețe.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Purcei

Carne și organe: 77 zile

Viței

Carne și organe: 63 zile

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

Miei

Carne și organe: 42 zile

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 1 an.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe cutie după EXP.

Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Ca la toate produsele antiparazitare, utilizarea repetată și frecventă a antiprotozoarelor din aceeași clasă poate duce la dezvoltarea rezistenței.

Se recomandă tratarea tuturor animalelor dintr-o fermă.

Măsurile igienice pot reduce riscul coccidiozei. De aceea, se recomandă îmbunătățirea concomitentă a condițiilor igienice, în special în ceea ce privește reducerea umezelii și menținerea curățeniei.

Pentru obținerea unui beneficiu maxim, animalele trebuie tratate înainte de apariția semnelor clinice, de exemplu, în perioada prepatentă.

Pentru îmbunătățirea semnelor clinice cauzate de infecția cu coccidia, la animalele la care deja apare diaree, se recomandă adițional instaurarea unei terapii de susținere.

Tratamentul în timpul manifestării bolii are, la purcei, un efect terapeutic limitat, deoarece leziunile la nivelul intestinului subțire s-au instalat deja.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la toltrazuril sau la oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Acest produs poate determina iritații la nivelul pielii și ochilor.

Evitați contactul produsului cu pielea și ochii.

În caz de expunere accidentală a pielii sau ochilor, spălați zona afectată cu apă din abundență.

Dacă iritația persistă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Nu mâncați, beți sau fumați în timpul utilizării produsului

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu este cazul.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot):

Nu au fost raportate manifestări clinice la porci și viței sănătoși după administrarea orală a unei doze de trei ori mai mare.

Nu au fost observate semne de supradozare la miei, în studiile referitoare la siguranța, cu o singură doză de trei ori mai mare decât doza terapeutică și cu o doză de două ori mai mare decât doza terapeutică, timp de două zile consecutive.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Alte precauții și atenționări legate de mediu

Metabolitul toltrazurilului, toltrazuril sulfona (ponazuril) s-a dovedit a fi atât persistent în sol (perioada de înjumătățire >1 an) cât și mobil și toxic pentru plante.

Din motive de mediu:

Viței: Pentru prevenirea oricărui efect advers asupra plantelor și a unei posibile contaminări a pânzei freatică, gunoiul de grajd provenit de la viței tratați nu trebuie împrăștiat pe sol fără o amestecare prealabilă cu alt gunoi de grajd provenit de la bovine netratate cu toltrazuril. Cantitatea de gunoi de grajd de la viței tratați trebuie diluată cu o cantitate de gunoi de grajd de la bovinele netratate de cel puțin 3 ori mai mare înainte de împrăștierea pe sol.

Miei ținută pe întreaga durată de viață în cadrul unui sistem de creștere intensivă nu trebuie tratați după vârsta de 6 săptămâni sau dacă au o greutate mai mare de 20 de kg la momentul tratamentului. Gunoiul de la aceste animale poate fi aplicat pe aceeași suprafață la fiecare trei ani

Având în vedere proprietățile persistente ale ponazurilului, împrăștierea repetată a gunoiului de grajd provenit de la animale tratate poate duce la o acumulare în sol și prin urmare poate reprezenta un risc pentru plante. Acumularea în sol a ponazurilului împreună cu mobilitatea acestuia pot duce la un risc de contaminare a apelor subterane. A se vedea, de asemenea, contraindicațiile.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiunea ambalajului: 100 ml, 250 ml, 1 litru, 5 litri.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Reprezentat:

Orion Pharma Romania srl
B-dul T. Vladimirescu nr 22,
Bucuresti, 050883, Romania
Tel: +40 31845 1646