

[Version 9.10/2021] corr. 11/2022



ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Dexafast 2 mg/ml soluție injectabilă pentru cai, bovine, porci, câini și pisici



2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conține:

Substanță activă:

Dexametazonă 2,0 mg
(ca fosfat sodic de dexametazonă)

Excipient:

Compoziția calitativă a excipientilor și a altor constituenți	Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a produsului medicinal veterinar
Alcool benzilic (E1519)	15,6 mg
Clorură de sodiu	
Citrat de sodiu dihidrat	
Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)	
Acid citric monohidrat (pentru ajustarea pH-ului)	
Apă pentru preparate injectabile	

Soluție injectabilă.

Soluție limpede, incoloră.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Cai, bovine, porci, câini și pisici.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Cai, bovine, porci, câini și pisici:

Tratamentul afecțiunilor inflamatorii sau alergice.

Bovine:

Inducerea parturiției.

Tratamentul cetozei primare (acetonemie).

Cai:

Tratamentul artritei, bursitei sau tenosinovitei.

3.3 Contraindicații

Exceptând situațiile de urgență, nu se utilizează la animale care suferă de diabet zaharat, insuficiență renală, insuficiență cardiacă, hiperadrenocorticism sau osteoporoză.

Nu se utilizează pentru infecții virale în timpul fazelor viremice sau în cazuri de infecții micotice sistemică.

Nu se utilizează la animale care suferă de ulcere gastrointestinale sau corneene sau de demodicoză.

Nu se administrează intraarticular în situațiile în care există semne de fracturi, infecții bacteriene ale articulațiilor și necroză osoasă aseptică.

Nu se utilizează în cazuri de hipersensibilitate la substanță activă, la corticosteroizi sau la oricare dintre excipienți.

Vezi și secțiunea 3.7.

3.4 Atenționări speciale

Nu există.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare în siguranță la speciile tintă:

Răspunsul la terapia pe termen lung trebuie monitorizat la intervale regulate de către un medic veterinar. S-a raportat că utilizarea corticosteroizilor la cai induce laminită. Prin urmare, caii tratați cu astfel de produse trebuie monitorizați frecvent în cursul perioadei de tratament.

Datorită proprietăților farmacologice ale substantei active, trebuie acordată atenție specială atunci când produsul este utilizat la animale cu sistem imunitar slăbit.

Cu excepția cazurilor de acetonemie și de inducere a parturiției, prin administrarea corticosteroizilor se urmărește inducerea unei ameliorări a semnelor clinice, mai degrabă decât vindecarea. Boala pre-existentă trebuie investigată în amănunt. După administrarea intraarticulară, articulația trebuie folosită cât mai puțin, timp de o lună și nu trebuie efectuate intervenții chirurgicale asupra articulației în decurs de opt săptămâni de la utilizarea acestei cai de administrare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administreză produsul medicinal veterinar la animale:

Trebuie acordată atenție pentru a evita auto-injectarea accidentală.

În caz de auto-injectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Produsul medicinal veterinar nu trebuie administrat de femei gravide. Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea, spălați temeinic zona cu apă curată.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanță activă sau la oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

3.6 Evenimente adverse

Cai, bovine, porci, câini și pisici:

Foarte rare (<1 animal / 10.000 animale tratate, inclusiv raportări izolate)	reacții de hipersensibilitate
Frecvență nedeterminată	Hiperadrenocorticism iatrogen (boala Cushing) ¹ , poliurie ² , polidipsie ² , polifagie ² , retenție de sodiu ³ , retenție de apă ³ , hipokaliemie ³ , calcinoză cutanată, vindecare cu întârziere a rănilor, rezistență slăbită la sau exacerbarea infecțiilor existente ⁴ , ulcerații gastrointestinale ⁵ , hepatomegalie ⁶ , modificări ale parametrilor biochimici și hematologici ai sângeului, hiperglicemie ⁷ , retenție placentară ⁸ , vițel cu viabilitate redusă ⁹ , pancreatită ¹⁰ , laminită, scădere producției de lapte

¹ Hiperadrenocorticism iatrogen (boala Cushing), care presupune modificarea semnificativă a metabolismului lipidic, glucidic, proteic și mineral, de exemplu, pot rezulta redistribuirea grăsimii corporale, slăbiciunea și emacierea musculară și osteoporoza.

² După administrarea sistemică și în special în fazele incipiente ale terapiei.

³ La utilizarea pe termen lung.

⁴ În prezența infecției bacteriene, este, de obicei, necesară protecție medicamentoasă antibacteriană, atunci când se utilizează steroizi. În prezența infecțiilor virale, steroizii pot agrava sau grăbi evoluția bolii.

⁵ Poate fi exacerbată de steroizi la pacienții cărora li se administrează medicamente antiinflamatoare nesteroidiene și la animalele cu traumatisme ale măduvei spinării.

⁶ Creșterea enzimelor hepaticе serice.

⁷ Tranzitorie.

⁸ Când se utilizează pentru inducerea parturiției la bovine, cu posibilă metrită și/sau subfertilitate ulterioară.

⁹ Când se utilizează pentru inducerea parturiției la bovine, în special în primele momente.

¹⁰ Risc crescut de pancreatită acută.

Corticosteroizii anti-inflamatorii, cum ar fi dexametazona, sunt cunoscuți pentru dezvoltarea unei game largi de efecte secundare. Deși dozele mari unice sunt în general bine tolerate, acestea pot induce efecte secundare severe în caz de utilizare pe termen lung și atunci când se administrează esteri care posedă o durată lungă de acțiune. Așadar, dozarea în cadrul utilizării pe termen mediu sau lung trebuie menținută, în general, la nivelul minim necesar pentru controlarea simptomelor.

În timpul terapiei, dozele eficace conduc la supresia axei hipotalamo-pituitara-adrenală. După încetarea tratamentului, pot apărea simptome de insuficiență adrenală care se extind spre atrofie adrenocorticală și, din acest motiv, animalul poate deveni incapabil să facă față în mod adecvat situațiilor stresante. Prin urmare, trebuie să se acorde atenție mijloacelor de reducere la minim a problemelor de insuficiență adrenală în urma întreruperii tratamentului (pentru discuții aprofundate, consultați textele standard).

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței produsului medicinal veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului autorizației de comercializare, fie autorității naționale competente prin sistemul național de raportare. Pentru datele de contact respective, vezi și ultimul punct din prospect.

3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Gestație:

În afară de utilizarea produsului pentru inducerea parturiției la bovine, nu se recomandă utilizarea corticosteroizilor pe parcursul perioadei de gestație.. Se cunoaște că administrarea în stadiile timpurii ale gestației a cauzat anomalii fetale la animalele de laborator. Administrarea în stadiul târziu al gestației poate cauza parturiție prematură sau avort.

Lactație: Utilizarea produsului la vacile aflate în perioada de lactație poate cauza o reducere a producției de lapte.

Vezi și secțiunea 3.6

3.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

Utilizarea concomitentă cu medicamente anti-inflamatorii nesteroidiene poate exacerba ulcerațiile tractului gastrointestinal.

Întrucât corticosteroizii pot reduce răspunsul imun la vaccinare, dexametazona nu trebuie utilizată în asociere cu vaccinuri sau în decurs de două săptămâni de la vaccinare.

Administrarea dexametazonei poate induce hipokalemie și, prin urmare, poate crește riscul de toxicitate ca urmare a glicoziidelor cardiace. Riscul de hipokalemie poate fi crescut dacă dexametazona se administrează în asociere cu diuretice de depletie potasică.

Utilizarea concomitentă de anticolinesterază poate duce la creșterea slăbiciunii musculare la pacienții cu miastenie gravă.

Glucocorticoizii antagonizează efectele insulinei.

Utilizarea concomitentă cu fenobarbital, fenitoină și rifampicină poate reduce efectele dexametazonei.

3.9 Căi de administrare și doze

Căi de administrare:

Cai: Injecție intravenoasă, intramusculară sau intra-articulară.

Bovine, porci, câini și pisici: Injecție intramusculară.

Utilizați tehnici aseptice normale.

Pentru a măsura volume mici de mai puțin de 1 ml de produs, se va utiliza o seringă gradată corespunzător pentru a asigura administrarea precisă a dozei corecte.

Pentru tratamentul afecțiunilor inflamatorii sau alergice: Sunt recomandate următoarele doze.

Specii	Dozare
Cai, bovine, porci	0,06 mg dexametazonă/kg greutate corporală echivalent cu 1,5 ml/50 kg
Câini, pisici	0,1 mg dexametazonă/kg greutate corporală echivalent cu 0,5 ml/10 kg

Pentru tratamentul cetozei primare la bovine (acetonemie): se recomandă 0,02 până la 0,04 mg dexametazonă/kg greutate corporală echivalând cu o doză de 5-10 ml produs per 500 kg g.c. administrată prin injecție intramusculară, în funcție de mărimea vacii și de durata simptomelor. Trebuie dat dovedă de prudență să nu se administreze o supradoza raselor de bovine din Insulele Canalului. Vor fi necesare doze mai mari (până la 0,06 mg dexametazonă/kg) dacă simptomele sunt prezente de mai mult timp sau dacă sunt tratate animale cu recidive.

Pentru inducerea parturiției - pentru a evita dimensiuni fetale excesive și edem mamari la bovine. O injecție unică intramusculară cu 0,04 mg dexametazonă/kg greutate corporală echivalând cu 10 ml produs per 500 kg g.c. după ziua 260 de gestație.

Parturiția se va produce, în mod normal, în decurs de 48-72 de ore.

Pentru tratamentul artritei, bursitei și tenosinovitei prin injecție intraarticulară la cai:

Doză de 1-5 ml produs.

Acste cantități nu sunt specifice și sunt menționate exclusiv cu titlu orientativ. Injecțiile în spațiile sau bursele articulare trebuie precedate de extragerea unui volum echivalent de lichid sinovial. Este esențială o asepsie strictă.

Capacul poate fi perforat în siguranță de până la 100 de ori.

Alegeți cea mai adecvată mărime a flaconului în funcție de speciile țintă de tratat.

Atunci când tratați grupuri de animale, utilizați un ac de aspirație pentru a evita desigilarea excesivă a dopului. Acul de aspirație trebuie îndepărtat după tratament.

3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

O supradoza poate induce somnolență și letargie la cai.

Vezi și secțiunea 3.6.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioade de așteptare

Carne și organe:

Bovine: 8 zile.

Porci: 2 zile.

Cai: 8 zile.

Lapte:

Bovine: 72 ore.

Cai: Nu este autorizată utilizarea la iepurile care produc lapte pentru consum uman

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet:

QH02AB02.

4.2 Farmacodinamie

Acest produs conține esterul fosfat de sodiu al dexametazoniei, un derivat fluorometilic al prednisolonului, care este un puternic glucocorticoid cu activitate mineralocorticoidă minimă. Dexametazona are o activitate anti-inflamatorie de zece până la douăzeci de ori mai mare decât a prednisolonului.

Corticosteroizii determină supresia răspunsului imunologic prin inhibarea dilatarii capilarelor, a migrării și funcționării leucocitelor și a fagocitozei. Glucocorticoizii au un efect asupra metabolismului prin creșterea gluconeogenezei.

4.3 Farmacocinetică

Acest produs conține esterul fosfat de sodiu al dexametazoniei. După administrarea extravasculară (intramusculară, subcutanată, intra-articulară), acest ester solubil al dexametazoniei este resorbit rapid de la locul injectării, după care are loc hidrolizarea imediată în compusul părinte, dexametazona. Absorbția dexametazoniei este rapidă.

Timpul până la atingerea concentrațiilor plasmatic maxime (C_{max}) de dexametazonă la bovine, cai, porci și câini este de 20 minute de la administrarea intramusculară. Biodisponibilitatea în urma administrării i.m. (comparativ cu administrarea i.v.) este ridicată la toate speciile. Timpul de înjumătățire prin eliminare în urma administrării intravenoase la cabaline este de 3,5 ore. În urma administrării intramusculare, timpul de înjumătățire aparent prin eliminare variază între 1 și 20 de ore, în funcție de specie.

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinar.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 4 ani. Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra flaconul în cutia de carton pentru a se proteja de lumină.

5.4 Natură și compozită ambalajului primar

Flacoane din sticlă incoloră (Tip I Ph. Eur.) cu capacitatea de 20 ml, 50 ml și 100 ml, închise cu dopuri de cauciuc bromobutilo și sigilate cu un capac din aluminiu.

Cutie de carton de 1 x 20 ml, 6 x 20 ml sau 12 x 20 ml

Cutie de carton de 1 x 50 ml, 6 x 50 ml sau 12 x 50 ml

Cutie de carton de 1 x 100 ml, 6 x 100 ml sau 12 x 100 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere. Utilizați sistemele de returnare a produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile produsului medicinal veterinar respectiv.

6. NUMELE DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

LIVISTO Int'l, S.L.

7. NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

190002

8. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI

Data primei autorizări: 08.01.2019

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

10. CLASIFICAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind produsele (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).




ANEXA III
ETCHETARE ȘI PROSPECT



A. ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

{Etichetă, flacon 100 ml}

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Dexafast 2 mg/ml soluție injectabilă pentru cai, bovine, porci, câini și pisici

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

1 ml conține:

Substanță activă:Dexametazonă 2,0 mg
(ca fosfat sodic de dexametazonă)**3. SPECII ȚINTĂ**

Cai, bovine, porci, câini, pisici

4. CĂI DE ADMINISTRARECai: IV, IM, IA
Bovine, porci, câini și pisici: IM**5. PERIOADE DE AȘTEPTARE**

Perioada de așteptare:

Carnă și organe:Bovine: 8 zile.
Porci: 2 zile.
Cai: 8 zile.**Lapte:**Bovine: 72 ore.
Cai: Nu este autorizată utilizarea la iepurile care produc lapte pentru consum uman**6. DATA EXPIRĂRII**

Exp. {ll/aaaa}

Termen de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile
După deschidere, se va utiliza până la.....**7. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra flaconul în cutia de carton pentru a se proteja de lumină.

8. NUMELE DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARELIVISTO Int'l, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 29

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Spania

(Numele deținătorului autorizației de comercializare poate fi înlocuit cu un logo.)

9. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

10. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 ml

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR

{Etichetă, 20 ml, 50 ml}

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Dexafast 2 mg/ml soluție injectabilă pentru cai, bovine, porci, câini și pisici
(Specia ţintă poate fi înlocuită cu o pictogramă.)

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

1 ml conține:

Substanță activă:

Dexametazonă 2,0 mg

3. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

4. DATA EXPIRĂRII

Exp {ll/aaaa}

Termen de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile
După deschidere, se va utiliza până la.....

5. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

20 ml

50 ml

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

{Cutie de carton}

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Dexafast 2 mg/ml soluție injectabilă pentru cai, bovine, porci, câini și pisici

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

1 ml conține:

Substanță activă:Dexametazonă 2,0 mg
(ca fosfat sodic de dexametazonă)**3. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**1 x 20 ml, 6 x 20 ml, 12 x 20 ml
1 x 50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml
1 x 100 ml, 6 x 100 ml, 12 x 100 ml**4. SPECII TINTĂ**

Cai, bovine, porci, câini, pisici

5. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Citiți prospectul înainte de utilizare.

6. CĂI DE ADMINISTRARECai: IV, IM, IA
Bovine, porci, câini și pisici: IM**7. PERIOADE DE AȘTEPTARE**

Perioade de așteptare:

Carne și organe:

Bovine: 8 zile.

Porci: 2 zile.

Cai: 8 zile.

Lapte:

Bovine: 72 ore.

Cai: Nu este autorizată utilizarea la iepiele care produc lapte pentru consum uman


8. DATA EXPIRĂRII

Exp. {ll/aaaa}

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra flaconul în cutia de carton pentru a se proteja de lumină.

**10. MENTIUNEA „A SE CITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE”**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

11. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

12. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

13. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

LIVISTO Int'l, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Spania
(Numele deținătorului autorizației de comercializare poate fi înlocuit cu un logo.)

14. NUMERELE AUTORIZAȚIILOR DE COMERCIALIZARE

190002

15. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}



B. PROSPECT

PROSPECT:

Dexafast 2 mg/ml soluție injectabilă pentru cai, bovine, porci, câini și pisici



1. Denumirea produsului medicinal veterinar

Dexafast 2 mg/ml soluție injectabilă pentru cai, bovine, porci, câini și pisici

2. Compoziție

1 ml conține:

Substanță activă:

Dexametazonă 2,0 mg
(ca fosfat sodic de dexametazonă)

Excipient:

Alcool benzilic (E1519) 15,6 mg

Soluție limpede, incoloră.

3. Specii țintă

Cai, bovine, porci, câini și pisici.

4. Indicații de utilizare

Cai, bovine, porci, câini și pisici:

Tratamentul afecțiunilor inflamatorii sau alergice.

Bovine:

Inducerea parturiției.

Tratamentul cetozei primare (acetonemie).

Cai:

Tratamentul artritei, bursitei sau tenosinovitei.

5. Contraindicații

Exceptând situațiile de urgență, nu se utilizează la animale care suferă de diabet zaharat, insuficiență renală, insuficiență cardiacă, hiperadrenocorticism sau osteoporoză.

Nu se utilizează pentru infecții virale în timpul fazelor viremice sau în cazuri de infecții micotice sistemică.

Nu se utilizează la animale care suferă de ulcere gastrointestinale sau corneene sau de demodicoză.

Nu se administrează intraarticular în situațiile în care există semne de fracturi, infecții bacteriene ale articulațiilor și necroză osoasă aseptică.

Nu se utilizează în cazuri de hipersensibilitate la substanța activă, la corticosteroizi sau la oricare dintre excipienți.

Vezi și secțiunea „Gestație și lactație”.

6. Atenționări speciale

Atentionari speciale pe care fiecare specie tintă:

Nu există.

Precautii speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile tintă:

Răspunsul la terapie pe termen lung trebuie monitorizat la intervale regulate de către un medic veterinar. S-a raportat că utilizarea corticosteroizilor la cai induce laminită. Prin urmare, caii tratați cu astfel de produse trebuie monitorizați frecvent în cursul perioadei de tratament.

Datorită proprietăților farmacologice ale substanței active, trebuie acordată atenție specială atunci când produsul este utilizat la animale cu sistem imunitar slăbit.

Cu excepția cazurilor de acetonemie și de inducere a parturiției, prin administrarea corticosteroizilor se urmărește inducerea unei ameliorări a semnelor clinice, mai degrabă decât vindecarea. Boala pre-existentă trebuie investigată în amănunt. După administrarea intra-articulară, articulația trebuie folosită cât mai puțin timp de o lună și nu trebuie efectuate intervenții chirurgicale asupra articulației în decurs de opt săptămâni de la utilizarea acestei căi de administrare.

Precautii speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Trebuie acordată atenție pentru a evita auto-injectarea accidentală.

În caz de auto-injectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Produsul medicinal veterinar nu trebuie administrat de femei gravide. Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea, spălați temeinic zona cu apă curată.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Gestație și lactație:

Gestatie

În afară de utilizarea Dexafast pentru inducerea parturiției la bovine, corticosteroizii nu sunt recomandați pentru utilizare pe parcursul perioadei de gestație. Se cunoaște că administrarea în stadiile timpurii ale gestației a cauzat anomalii fetale la animalele de laborator. Administrarea în stadiul târziu al gestației poate cauza parturiție prematură sau avort.

Lactatie

Utilizarea produsului la vacile aflate în perioada de lactație poate cauza o reducere a producției de lapte. Vezi și secțiunea „Evenimente adverse”.

Interacțiunea cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Utilizarea concomitentă cu medicamente anti-inflamatorii nesteroidiene poate exacerba ulcerațiile tractului gastrointestinal.

Întrucât corticosteroizii pot reduce răspunsul imun la vaccinare, dexametazona nu trebuie utilizată în asociere cu vaccinuri sau în decurs de două săptămâni de la vaccinare.

Administrarea dexametazonei poate induce hipokalemie și, prin urmare, poate crește riscul de toxicitate ca urmare a glicozidelor cardiaice. Riscul de hipokalemie poate fi crescut dacă dexametazona se administreză în asociere cu diuretice de depleție potasică.

Utilizarea concomitentă de anticolinesterază poate duce la creșterea slăbiciunii musculare la pacienții cu miastenie gravă.

Glucocorticoizii antagonizează efectele insulinei.

Utilizarea concomitentă cu fenobarbital, fenitoină și rifampicină poate reduce efectele dexametazonei.

Supradoxozare:

O supradoxozare poate induce somnolență și letargie la cai.

Vezi și secțiunea „Evenimente adverse”.

Incompatibilitati majore:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

7. Evenimente adverse

Cai, bovine, porci, câini și pisici:

Foarte rare (<1 animal / 10.000 animale tratate, inclusiv raportări izolate)

reacții de hipersensibilitate

Frecvență nedeterminată

Hiperadrenocorticism iatrogen (boala Cushing)¹, poliurie², polidipsie², polifagie², retenție de sodiu³, retenție de apă³, hipokaliemie³, calcinoză cutanată, vindecare cu întârziere a rănilor, rezistență slăbită la sau exacerbarea infecțiilor existente⁴, ulcerății gastrointestinale⁵, hepatomegalie⁶, modificări ale parametrilor biochimici și hematologici ai săngelui, hiperglicemie⁷, retenția placentară⁸, vițel cu viabilitate redusă⁹ pancreatită¹⁰, laminită, scăderea producției de lapte

¹ Hiperadrenocorticism iatrogen (boala Cushing), care presupune modificarea semnificativă a metabolismului lipidic, glucidic, proteic și mineral, de exemplu, pot rezulta redistribuirea grăsimii corporale, slăbiciunea și emacierea musculară și osteoporoza.

² După administrarea sistemică și în special în fazele incipiente ale terapiei.

³ La utilizarea pe termen lung.

⁴ În prezența infecției bacteriene, este, de obicei, necesară protecție medicamentoasă antibacteriană atunci când se utilizează steroizi. În prezența infecțiilor virale, steroizii pot agrava sau grăbi evoluția bolii.

⁵ Poate fi exacerbată de steroizi la pacienții cărora li se administrează medicamente antiinflamatoare nesteroidiene și la animalele cu traumatisme ale măduvei spinării.

⁶ Creșterea enzimelor hepaticе serice.

⁷ Tranzitorie.

⁸ Când se utilizează pentru inducerea parturiției la bovine, cu posibilă metrită și/sau subfertilitate ulterioară.

⁹ Când se utilizează pentru inducerea parturiției la bovine, în special în primele momente.

¹⁰ Risc crescut de pancreatită acută.

Corticosteroizii anti-inflamatorii, cum ar fi dexametazona, sunt cunoscuți pentru dezvoltarea unei game largi de efecte secundare. Deși dozele mari unice sunt în general bine tolerate, acestea pot induce efecte secundare severe în caz de utilizare pe termen lung și atunci când se administrează esteri care posedă o durată lungă de acțiune. Așadar, dozarea în cadrul utilizării pe termen mediu sau lung trebuie menținută, în general, la nivelul minim necesar pentru controlarea simptomelor.

În timpul terapiei, dozele eficace conduc la supresia axei hipotalamo-pituitara-adrenală. După încetarea tratamentului, pot apărea simptome de insuficiență adrenală care se extind spre atrofie adrenocorticală și, din acest motiv, animalul poate deveni incapabil să facă față în mod adecvat situațiilor stresante. Prin urmare, trebuie să se acorde atenție mijloacelor de reducere la minim a problemelor de insuficiență adrenală în urma întreruperii tratamentului (pentru discuții aprofundate, consultați textele standard).

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul autorizației de comercializare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare {farmacovigilenta@ansvs.ro ; icbmv@icbmv.ro}.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Căi de administrare:

Cai: Injecție intravenoasă, intramusculară sau intra-articulară.

Bovine, porci, câini și pisici: Injecție intramusculară.

Utilizați tehnici aseptice normale.

Pentru a măsura volume mici de mai puțin de 1 ml de produs, se va utiliza o seringă gradată corespunzător pentru a asigura administrarea precisă a dozei corecte.

Pentru tratamentul afecțiunilor inflamatorii sau alergice: Sunt recomandate următoarele doze.

Specii	Dozare
Cai, bovine, porci	0,06 mg dexametazonă/kg greutate corporală echivalent cu 1,5 ml/50 kg
Câini, pisici	0,1 mg dexametazonă/kg greutate corporală echivalent cu 0,5 ml/10 kg

Pentru tratamentul cetozei primare la bovine (acetonemie): se recomandă 0,02 până la 0,04 mg dexametazonă/kg de greutate corporală echivalând cu o doză de 5-10 ml produs per 500 kg g.c. administrată prin injecție intramusculară, în funcție de mărimea vacii și de durata simptomelor. Trebuie dat doavadă de prudență să nu se administreze o supradoza raselor de bovine din Insulele Canalului. Vor fi necesare doze mai mari (până la 0,06 mg dexametazonă/kg) dacă semnele sunt prezente de mai mult timp sau dacă sunt tratate animale cu recidive.

Pentru inducerea parturiției - pentru a evita dimensiuni fetale excesive și edem mamar la bovine. O injecție unică intramusculară cu 0,04 mg dexametazonă/kg greutate corporală echivalând cu 10 ml produs per 500 kg g.c. după ziua 260 de gestație.

Parturiția se va produce, în mod normal, în decurs de 48-72 de ore.

Pentru tratamentul artritei, bursitei și tenosinovitei prin injecție intra-articulară la cai:

Doză de 1-5 ml produs.

Aceste cantități nu sunt specifice și sunt menționate exclusiv cu titlu orientativ. Injecțiile în spațiile sau bursele articulare trebuie precedate de extragerea unui volum echivalent de lichid sinovial. Este esențială o asepsie strictă.

Capacul poate fi perforat în siguranță de până la 100 de ori.

Alegeți cea mai adecvată mărime a flaconului în funcție de specia și de tratat.

Atunci când tratați grupuri de animale, utilizați un ac de aspirație pentru a evita desigilarea excesivă a dopului. Acul de aspirație trebuie îndepărtat după tratament.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Nu se aplică.



10. Perioade de așteptare

Carne și organe:

Bovine: 8 zile.

Porci: 2 zile.

Cai: 8 zile.

Lapte:

Bovine: 72 ore.

Cai: Nu este autorizată utilizarea la iepene care produc lapte pentru consum uman

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra flaconul în cutia de carton pentru a se proteja de lumină.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a flaconului : 28 zile.

A nu se utilizează acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă. Data expirării se referă la ultima zi din acea luna.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a produselor medicinale veterinarne neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile.

13. Clasificarea produselor medicinale veterinarne

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele autorizațiilor de comercializare și dimensiunile ambalajelor

190002

Dimensiuni de ambalaj:

1 x 20 ml, 6 x 20 ml, 12 x 20 ml

1 x 50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml

1 x 100 ml, 6 x 100 ml, 12 x 100 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în baza de date a Uniunii privind produsele.

16. Date de contact

Detinătorul autorizat de comercializare:

LIVISTO Int'l S.L.
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Spania
Tel: +34 934 706 270

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germania	aniMedica Herstellungs GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germania
--	---

Industrial Veterinaria, S.A.
Esmeralda 19
Esplugues de Llobregat
08950 Barcelona

Distribuitor

SC Bistri-Vet SRL
Str. Libertății Nr. 13, Bistrița, Bistrița-Năsăud
420155-România

17. Alte informații

