

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI:

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR:

DIAZINOL, 60% m/v, concentrat emulsionabil pentru bovine, ovine, caprine și suine

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ:

100 ml concentrat emulsionabil conțin:

Substanță activă:

Diazinon..... 60 g

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ:

Concentrat emulsionabil.

Se prezintă sub formă de soluție galben-brună, care emulsionează ușor cu apa, la temperatura de 20°C în concentrație de 40 mg/l.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE:

4.1 Specii țintă:

- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Suine

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă:

Produsul, **DIAZINOL** – concentrat emulsionabil, se recomandă pentru prevenirea și tratamentul scabiei (sarcoptica, psoroptica, chorioptica, demodecica) și a ectoparazitismului produs de capuse, paduchi, purici, și alte insecte la bovine, ovine, caprine și suine.

4.3 Contraindicații:

Nu se efectuează tratament cu **DIAZINOL** la păsări și pisici.
Animalele nu se tratează cu **DIAZINOL** pe vreme umedă sau foarte caldă.

4.4 Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):

Nu se aplică tratamentul cu **DIAZINOL** la tineretul bovin sub 6 săptămâni și la purceii sugari.

Nu se îmbăiază oile în primele 14 zile după tundere, animalele debile și gestante, însetate, sau cu plăgi provocate de tuns și nevindecate.



4.5 Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Soluția de îmbăiere se utilizează doar în ziua preparării după care se golește baia și se spală bine. Nu se vor adăuga la soluția de îmbăiere, sulfat de cupru sau alți agenți de umectare.

A se spăla ugerul animalelor lactante după îmbăiere.

În cazul în care este necesar să se îmbăieze oile sau caprele gestante, acestea vor fi introduse cu grijă în baie și vor fi ținute sub observație.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Pe toata durata administrării tratamentului, persoanele care manipulează soluția de **DIAZINOL**, trebuie să poarte echipament de protecție (cizme de cauciuc, mănuși și șorț de cauciuc).

Păstrați produsul separat de alimente, băuturi sau de mâncarea pentru animale. Nu mâncați, nu consumați băuturi și nu fumați în timpul aplicării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului accidental al concentratului sau amestecului pentru pulverizare cu pielea spălați imediat zona cu săpun și multă apă, iar hainele de protecție se schimbă imediat. În cazul ingerării accidentale a produsului, consultați imediat medicul și arătați ambalajul.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

În timpul tratamentului cu **DIAZINOL** pot apărea ocazional iritații ale pielii, mâncărimi, pielea poate deveni uscată sau pot apărea crăpături ale pielii.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu au fost raportate efecte nedorite în urma tratamentului cu **DIAZINOL** aplicat animalelor gestante sau în lactație.


4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu se vor face simultan tratamente cu **diazinon** și **levamisol** și alți compuși organofosforici și nici în următoarele 14 zile de la aplicarea tratamentului.

Nu se asociază soluțiile pe bază de diazinon, cu substanțe incompatibile ca sulfatul de cupru și soluțiile acestuia, cu agenți oxidanți puternici sau cu acizi tari.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare:

Produsul se administrează numai extern, sub formă de tratamente locale, pulverizări sau îmbăieri. Durata și frecvența aplicării tratamentului depind de natura parazitului, condițiile climatice și gradul de infestare.



Tratamentul antiparazitar se repeta la un interval de 10 - 14 zile în funcție de specia parazitului și gradul de infestare.

Soluțiile se prepară și se utilizează în aceeași zi.

Bovine:

Pulverizare: 20 ml **DIAZINOL** /20 litri apă, diluție 1:1000, (600 ppm s.a.). Stropirea animalului se face pe toate părțile corpului.

Tratamente locale: 5 ml **DIAZINOL** /1 litru apă, diluție 1:200, (3000 ppm s.a.).

Ovine - caprine:

Îmbăiere: soluția inițială de umplere a bazinului – 420 ml **DIAZINOL** în 1000 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

Reumplerea (completarea) băii - 250 ml **DIAZINOL** în 200 litri apă, diluție 1:800 (750 ppm s.a.).

Tratament local: 5 ml **DIAZINOL** / 1litri apă, diluție 1:200 (3000 ppm s.a.).

Pulverizare: 20 ml **DIAZINOL** / 20 litri apă, diluție 1:1000 (600 ppm s.a.).

Pentru îmbăiere este necesar ca înălțimea soluției în baie să fie de 70 cm pentru miei și tineret și 100 cm pentru oile adulte. Este esențial să se mențină concentrația băii prin reumplere atunci când volumul scade cu 10 %.

Animalele trebuie să fie complet scufundate în baie cel puțin o dată.

Suine:

Pulverizare contra scabiei: 10 ml **DIAZINOL** /24 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

În cazul unei supradozări accidentale pot apărea iritații ale pielii, mâncărimi, stări de amețală, toropeală. În asemenea situații se recomandă scoaterea animalului la aer curat, spălarea pielii cu multă apă și săpun, iar în cazul în care simptomele persistă trebuie cerut sfatul medicului veterinar.

ANTIDOT: ATROPINA sau TOXOGONINA, administrate sub supraveghere medicală.

4.11 Timp de așteptare:

Carne și organe: Bovine, ovine, caprine, suine – 14 zile

Lapte: Bovine, ovine, caprine – 3 zile

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE:

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide pentru uz topic, inclusiv insecticide

Codul veterinar ATC: QP53AF03



5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Substanța activă, diazinonul, este un insecticid, compus de sinteză organofosforic, ce acționează prin contact și ingestie asupra paraziților externi prin blocarea acetilcolinesterazei. Diazinonul se leagă stabil de enzimă producând blocarea ireversibilă a acesteia iar mediatorul chimic acetilcolina rămânând nehidrolizată se acumulează și produce paralizia sistemului neuromuscular al parazitului.

5.2 Particularități farmacocinetice:

Datorita solubilității sale, Diazinonul se absoarbe bine prin piele. Se metabolizează rapid și se elimină preponderent prin urină. Cea mai mare parte din substanța mamă se regăsește în grăsime și în mușchi și ca reziduu minoritar în rinichi și ficat.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE:

6.1 Lista excipienților:

Dodecil benzensulfonat de calciu

Polietilenglicol 400

Xilen

6.2 Incompatibilități majore:

Substanța activă - diazinon este incompatibilă cu sulfatul de cupru și cu soluțiile acestuia, cu agenții oxidanți puternici și cu acizii tari.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 12 luni.

Perioada de valabilitate după diluare: 24 ore.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare:

A se păstra la o temperatura mai mică de 25°C.

A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original, bine închis.

A se proteja de lumina directă.

A se feri de surse de căldură.

A se păstra în loc uscat.



6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Fiole din sticlă tip II de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml și flacoane polietilenă de joasă densitate de 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml și 5000 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Ambalaj secundar:

Cutie de carton x 10 fiole x 1 ml

Cutie de carton x 10 fiole x 2 ml

Cutie de carton x 10 fiole x 5 ml

Cutie de carton x 10 fiole x 10 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, împreună cu ambalajul său trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Ambalajele golite nu se reutilizează.

Animalele vor fi ținute în adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecțiile colectate nu vor fi utilizate în fertilizarea solului.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE: PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI S.A.

Str. Principala, nr.944,
Filipeștii de Padure, jud. Prahova,
Romania

Tel: +4 021 220 69 20,

Fax: +4 021 220 69 15

E-mail: office@pasteur.ro

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:

110176

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/ REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI:

03.02.2006/05.08.2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI:

Ianuarie 2022

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE:

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.



Anexa nr. 3

ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Flacoane din polietilena de joasa densitate x 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml si 5000 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

DIAZINOL, 60 % m/v, concentrat emulsionabil pentru bovine, ovine, caprine și suine
Diazinon

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

100 ml concentrat emulsionabil conțin:

Substanța activă:

Diazinon.....60 g

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat emulsionabil.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml si 5000 ml.

5. SPECII ȚINTĂ

- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Suine

6. INDICAȚII

Produsul, **DIAZINOL** – concentrat emulsionabil antiparazitar de uz extern, se recomandă pentru prevenirea și tratamentul scabiei (sarcoptica, psoroptica, chorioptica, demodecica) și a ectoparazitismului produs de capuse, paduchi, purici, și alte insecte la bovine, ovine, caprine și suine.



7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează numai extern, sub formă de tratamente locale, pulverizări sau îmbăieri. Durata și frecvența aplicării tratamentului depind de natura parazitului, condițiile climatice și gradul de infestare.

Tratamentul antiparazitar se repeta la un interval de 10 - 14 zile în funcție de specia parazitului și gradul de infestare.

Soluțiile se prepară și se utilizează în aceeași zi.

Bovine:

Pulverizare: 20 ml **DIAZINOL** /20 litri apă, diluție 1:1000, (600 ppm s.a.). Stropirea animalului se face pe toate părțile corpului.

Tratamente locale: 5 ml **DIAZINOL** /1 litru apă, diluție 1:200, (3000 ppm s.a.).

Ovine - caprine:

Îmbăiere: soluția inițială de umplere a bazinei – 420 ml **DIAZINOL** în 1000 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

Reumplerea (completarea) băii - 250 ml **DIAZINOL** în 200 litri apă, diluție 1:800 (750 ppm s.a.).

Tratament local: 5 ml **DIAZINOL** / 1litri apă, diluție 1:200 (3000 ppm s.a.).

Pulverizare: 20 ml **DIAZINOL** / 20 litri apă, diluție 1:1000 (600 ppm s.a.).

Pentru îmbăiere este necesar ca înălțimea soluției în baie să fie de 70 cm pentru miei și tineret și 100 cm pentru oile adulte. Este esențial să se mențină concentrația băii prin reumplere atunci când volumul scade cu 10 %.

Animalele trebuie să fie complet scufundate în baie cel puțin o dată.

Suine:

Pulverizare contra scabiei: 10 ml **DIAZINOL** /24 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: Bovine, ovine, caprine, suine – 14 zile

Lapte: Bovine, ovine, caprine – 3 zile

9. ATENȚIONARE SPECIALĂ, DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Nu se aplică tratamentul cu **DIAZINOL** la păsări și pisici.

Animalele nu se tratează cu **DIAZINOL** pe vreme umedă sau foarte caldă.

Nu se aplică tratamentul cu **DIAZINOL** la tineretul bovin sub 6 săptămâni și la purceii sugari.

Nu se îmbăiază oile în primele 14 zile după tundere, animalele debile și gestante, însetate, sau cu plăgi provocate de tuns și nevindecate.



10. DATA EXPIRĂRII

Exp: lună/an

După deschidere/desigilare se va utiliza până la 12 luni.

După diluare, se va utiliza până la 24 ore.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis, o temperatura mai mică de 25°C, protejat de lumina directă, protejat de surse de căldură și ferit de îngheț.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Ambalajele golite nu se reutilizează.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI S.A.

Str. Principala, nr.944,

Filipeștii de Padure, jud. Prahova,

Romania

Tel: +4 021 220 69 20,

Fax: +4 021 220 69 15

E-mail: office@pasteur.ro




16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

110176

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot:



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton x 10 fiole x 1 ml
Cutie de carton x 10 fiole x 2 ml
Cutie de carton x 10 fiole x 5 ml
Cutie de carton x 10 fiole x 10 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

DIAZINOL , 60 % m/v, concentrat emulsionabil pentru bovine, ovine, caprine și suine
Diazinon

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

100 ml concentrat emulsionabil conțin:
DIAZINON.....60 g

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat emulsionabil

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI


Cutie de carton x 10 fiole x 1 ml
Cutie de carton x 10 fiole x 2 ml
Cutie de carton x 10 fiole x 5 ml
Cutie de carton x 10 fiole x 10 ml

5. SPECII ȚINTĂ

- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Suine

6. INDICAȚII

Produsul, **DIAZINOL** – concentrat emulsionabil antiparazitar de uz extern, se recomandă pentru prevenirea și tratamentul scabiei (sarcoptica, psoroptica, chorioptica, demodecica) și a ectoparazitismului produs de capuse, paduchi, purici, și alte insecte la bovine, ovine, caprine și suine.



7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează numai extern, sub formă de tratamente locale, pulverizări sau îmbăieri. Durata și frecvența aplicării tratamentului depind de natura parazitului, condițiile climatice și gradul de infestare.

Tratamentul antiparazitar se repeta la un interval de 10 - 14 zile în funcție de specia parazitului și gradul de infestare.

Soluțiile se prepară și se utilizează în aceeași zi.

Bovine:

Pulverizare: 20 ml DIAZINOL /20 litri apă, diluție 1:1000, (600 ppm s.a.). Stropirea animalului se face pe toate părțile corpului.

Tratamente locale: 5 ml DIAZINOL /1 litru apă, diluție 1:200, (3000 ppm s.a.).

Ovine - caprine:

Îmbăiere: soluția inițială de umplere a bazinei – 420 ml DIAZINOL în 1000 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

Reumplerea (completarea) băii - 250 ml DIAZINOL în 200 litri apă, diluție 1:800 (750 ppm s.a.).

Tratament local: 5 ml DIAZINOL / 1litri apă, diluție 1:200 (3000 ppm s.a.).

Pulverizare: 20 ml DIAZINOL / 20 litri apă, diluție 1:1000 (600 ppm s.a.).

Pentru îmbăiere este necesar ca înălțimea soluției în baie să fie de 70 cm pentru miei și tineret și 100 cm pentru oile adulte. Este esențial să se mențină concentrația băii prin reumplere atunci când volumul scade cu 10 %.

Animalele trebuie să fie complet scufundate în baie cel puțin o dată.

Suine:

Pulverizare contra scabiei: 10 ml DIAZINOL /24 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: Bovine, ovine, caprine, suine – 14 zile

Lapte: Bovine, ovine, caprine – 3 zile

9. ATENȚIONARE SPECIALĂ, DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Nu se aplică tratamentul cu DIAZINOL la păsări și pisici.

Animalele nu se tratează cu DIAZINOL pe vreme umedă sau foarte caldă.

Nu se aplică tratamentul cu DIAZINOL la tineretul bovin sub 6 săptămâni și la purceii sugari.

Nu se îmbăiază oile în primele 14 zile după tundere, animalele debile și gestante, însetate, sau cu plăgi provocate de tuns și nevindecate.



10. DATA EXPIRĂRII

Exp: lună/an

După deschidere/desigilare se va utiliza până la 12 luni.

După diluare, se va utiliza până la 24 ore.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis, o temperatura mai mică de 25°C, protejat de lumina directă, protejat de surse de căldură și ferit de îngheț.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Cititi prospectul produsului.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI S.A.

Str. Principala, nr.944,

Filipeștii de Padure, jud. Prahova,

Romania

Tel: +4 021 220 69 20,

Fax: +4 021 220 69 15


E-mail: office@pasteur.ro

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

110176

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot:



**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE
AMBALAJ PRIMAR**

Fiole din sticla de tip II x 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml și flacoane din polietilena de joasă densitate de 50 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

DIAZINOL 60% m/v, concentrat emulsionabil pentru bovine, ovine, caprine și suine
Diazinon

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

100 ml concentrat emulsionabil conține:
Diazinon.....60 g

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

Fiole x 1 ml, 2ml, 5 ml, 10 ml și flacoane x 50 ml.

4. CĂI DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

5. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: Bovine, ovine, caprine, suine – 14 zile

Lapte: Bovine, ovine, caprine – 3 zile

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot:

7. DATA EXPIRĂRII


Exp: lună/an

După deschidere/desigilare se va utiliza până la 12 luni.

După diluare, se va utiliza până la 24 ore

8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.



PROSPECT

DIAZINOL 60% m/v, concentrat emulsionabil pentru bovine, ovine, caprine și suine

1. NUMELE ȘI PRENUMELE DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE:

PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI S.A.

Str. Principala, nr.944,
Filipeștii de Padure, jud. Prahova,
Romania
Tel: +4 021 220 69 20,
Fax: +4 021 220 69 15
E-mail: office@pasteur.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

DIAZINOL 60% m/v, concentrat emulsionabil pentru bovine, ovine, caprine și suine

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

100 ml concentrat emulsionabil conține:

Substanța activă:

Diazinon.....60 g

4. INDICAȚII

Produsul, **DIAZINOL** – concentrat emulsionabil antiparazitar de uz extern, se recomandă pentru prevenirea și tratamentul scabiei (sarcoptica, psoroptica, chorioptica, demodecica) și a ectoparazitismului produs de capuse, paduchi, purici, și alte insecte la bovine, ovine, caprine și suine.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se aplică tratamentul cu **DIAZINOL** la păsări și pisici.

Animalele nu se tratează cu **DIAZINOL** pe vreme umedă sau foarte caldă.

6. REACȚII ADVERSE

În timpul tratamentului cu **DIAZINOL** pot apărea ocazional iritații ale pielii, mâncărimi, pielea poate deveni uscată sau pot apărea crăpături ale pielii.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

- Bovine
- Ovine



- Caprine
- Suine

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează numai extern, sub formă de tratamente locale, pulverizări sau îmbăieri. Durata și frecvența aplicării tratamentului depind de natura parazitului, condițiile climatice și gradul de infestare.

Tratamentul antiparazitar se repeta la un interval de 10 - 14 zile în funcție de specia parazitului și gradul de infestare.

Soluțiile se prepară și se utilizează în aceeași zi.

Bovine:

Pulverizare: 20 ml DIAZINOL /20 litri apă, diluție 1:1000, (600 ppm s.a.). Stropirea animalului se face pe toate părțile corpului.

Tratamente locale: 5 ml DIAZINOL /1 litru apă, diluție 1:200, (3000 ppm s.a.).

Ovine - caprine:

Îmbăiere: soluția inițială de umplere a bazinului – 420 ml DIAZINOL în 1000 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

Reumplerea (completarea) băii - 250 ml DIAZINOL în 200 litri apă, diluție 1:800 (750 ppm s.a.).

Tratament local: 5 ml DIAZINOL / 1litri apă, diluție 1:200 (3000 ppm s.a.).

Pulverizare: 20 ml DIAZINOL / 20 litri apă, diluție 1:1000 (600 ppm s.a.).

Pentru îmbăiere este necesar ca înălțimea soluției în baie să fie de 70 cm pentru miei și tineret și 100 cm pentru oile adulte. Este esențial să se mențină concentrația băii prin reumplere atunci când volumul scade cu 10 %.

Animalele trebuie să fie complet scufundate în baie cel puțin o dată.

Suine:

Pulverizare contra scabiei: 10 ml DIAZINOL /24 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se vor respecta concentrațiile de utilizare.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: Bovine, ovine, caprine, suine – 14 zile

Lapte: Bovine, ovine, caprine – 3 zile

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis, o temperatură mai mică de 25°C, protejat de lumina directă, protejat de surse de căldură și ferit de îngheț.

A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 12 luni.



Perioada de valabilitate după diluare: 24 ore.

12. ATENȚIONARE SPECIALĂ

Nu se aplică tratamentul cu **DIAZINOL** la tineretul bovin sub 6 săptămâni și la purceii sugari.

Nu se îmbăiază oile în primele 14 zile după tundere, animalele debile și gestante, însetate, sau cu plăgi provocate de tuns și nevindecate.

Soluția de îmbăiere se utilizează doar în ziua preparării, după care se golește baia și se spală bine. Nu se adaugă la baie sulfat de cupru sau alți agenți de umectare.

A se spăla ugerul animalelor lactante după îmbăiere.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

A se spăla mâinile și orice alte părți ale corpului care au intrat în contact cu produsul.

Substanța activă, diazinonul, este foarte toxică pentru organismele acvatice și pentru albine.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Ambalajele golite nu se reutilizează.

Animalele vor fi ținute în adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecțiile colectate nu vor fi utilizate în fertilizarea solului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Ianuarie 2022

15. ALTE INFORMAȚII

ANTIDOT: ATROPINA sau TOXOGONINA, administrate sub supraveghere medicală.

Prezentare:

Fiole din sticla tip II de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml și flacoane din polietilena de joasă densitate de 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml și 5000 ml.

Ambalaj secundar:

Cutie de carton x 10 fiole x 1 ml

Cutie de carton x 10 fiole x 2 ml

Cutie de carton x 10 fiole x 5 ml

Cutie de carton x 10 fiole x 10 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.



Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal, vă rugăm să contactați reprezentatul local al deținătorului autorizației de comercializare.

PASTEUR FILIALA FILIPESTI S.A.

Str. Principala, nr.944,
Filipestii de Padure, jud. Prahova,
Romania

Tel: +4 021 220 69 20,

Fax: +4 021 220 69 15

E-mail: office@pasteur.ro



