

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**  
Drontal Plus 35 kg comprimate, câine

**2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

**Substanțe active:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Un comprimat conține: |          |
| Febantel              | 525,0 mg |
| Pirantel embonat      | 504,0 mg |
| Praziquantel          | 175,0 mg |

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Comprimate

Comprimate ovale de culoare galbenă cu o linie mediană șanțată pe ambele fețe.

**4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**

**4.1 Specii țintă**

Câini.

**4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă**

Pentru tratamentul infestațiilor mixte determinate de nematode, cestode și *Giardia spp.*.

Viermi rotunzi:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Ascarizi         | Toxocara canis         |
| Viermi cu cârlig | Toxascaris leonina     |
| Vierme bici      | Uncinaria stenocephala |
|                  | Ancilstoma caninum     |
|                  | Trichuris vulpis       |

Tenii (viermi lati):

|                             |
|-----------------------------|
| Echinococcus granulosus     |
| Echinococcus multilocularis |
| Dipilidium caninum          |
| Taenia spp.                 |
| Multiceps multiceps         |
| Mesocestoides spp.          |

**4.3 Contraindicații**

Din cauza studiilor insuficiente efectuate pe femele gestante în prima parte a gestației, Drontal Plus 35kg comprimate va fi utilizat doar în ultima treime a gestației.

**4.4 Atenționări speciale**

Nu există.

**4.5 Precauții speciale pentru utilizare**

**Precauții speciale pentru utilizare la animale**

Pentru câini cu greutatea corporală sub 20 kg trebuie utilizate comprimate pentru câini mici.

**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Pentru o bună igienă, persoanele care administrează comprimatul direct câinelui sau o încorporează în hrana trebuie să se spele pe mâini după utilizare.



În cazul câinilor tratați în infestarea cu Giardia: a se curăța cu atenție și a se dezinfecța sau a se muta câinele care este în tratament, situație specifică în canis. Giardia poate infesta oamenii de aceea vă rugăm să solicitați sfatul medicului în cazul în care câinele dumneavoastră este infestat.

#### 4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Nu se cunosc.

#### 4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

vezi secțiunea 4.3, Contraindicații

#### 4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

A nu se utilizează împreună cu alte medicamente care au acțiune asupra sistemului colinergic (de exemplu levamisol). Acțiunea substanțelor cu activitate asupra acetil-colinesterazei (de exemplu compușii organosoforici) poate fi crescută când se combină cu acest produs. Activitatea specifică a piperazinei (paralizia neuromusculară a parazitului) poate inhiba eficacitatea pirantelului (acesta produce paralizia spastică a parazitului).

#### 4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Doza recomandată este de 15 mg febantel, 14,4 mg pirantel embonat și 5 mg praziquantel / kg greutate vie. Aceasta corespunde la 1 comprimat Drontal Plus 35kg comprimate pe 35 kg greutate vie.

Pentru administrare orală, comprimatele pot fi date în consum direct câinilor, de preferat ascunse într-o bucată de carne, carnă sau brânză. Nu sunt necesare măsuri dietetice (înfometare) înainte sau după tratament. Se recomandă ca tratamentul să se efectueze înainte de hrănire.

Administrarea dozei corecte este specificată în următorul tabel, ca un tratament cu o singură administrare orală.

| Câini*                   |   |
|--------------------------|---|
| Greutatea corporală.(Kg) | Număr de comprimate   |
| ≤ 20                     | Pentru câini mai mici se va utiliza comprimatul corespunzător |
| 20 -≤ 35                 | 1   |
| 35 -≤ 55                 | 1 1/2   |
| 55 -≤ 70                 | 2   |

\*Nu se va utiliza la câinii care au o greutate corporală mai mică de 20 kg

Durată tratamentului:

Infestarea cu nematode și cestode

Pentru deparazitări periodice ale câinilor adulți aceștia vor fi tratați la fiecare 3 luni. Pentru tratament de rutină o singură doză este recomandată.

Infestarea cu *Giardia spp.*

Tratați trei zile consecutiv.

#### 4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Doze de 10 (zece) ori mai mari decât doza recomandată de Drontal Plus 35kg comprimate au fost tolerate fără semne de toxicitate la câini și căței.

#### 4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

### 5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE



Grupa farmacoterapeutică: Antihelmintic, codul veterinar ATC: QP52AA51

## 5.1 Proprietăți farmacodinamice

Produsul conține substanțe antihelmintice active împotriva parazișilor gastrointestinali, viermi rotunzi și viermi lați.

Produsul conține trei substanțe active:

Febantel, un probenzimidazol.

Pirantel embonat (pamoat) un derivat de tetrahidropirimidină.

Praziquantel, un compus parțial hidrogenat de pirazinoisoquinolină.

În această combinație stabilă pirantel și febantel acționează asupra tuturor nematodelor (ascarizi, viermi cu cârlig și viermele bici) la câini. În particular spectrul de acțiune cuprinde: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* și *Trichuris vulpis*.

Această combinație de substanțe active are acțiune sinergică în cazul viermilor cu cârlig iar febantel este eficient împotriva *T. vulpis*.

Această combinație are de asemenea eficacitate asupra *Giardia spp.*

Febantel singur nu are activitate antihelmintică dar acționează ca probenzimidazol. Ca și la îți benzimidazoli Spectrul de activitate al praziquantelului cuprinde toate speciile de cestode importante la câini, în special *Taenia species*; *Multiceps multiceps* *Dipylidium caninum*; *Mesocestoides species*, *Echinococcus granulosus* și *Echinococcus multilocularis*. Praziquantel acționează împotriva ambelor forme: adulte și imature ale acestor paraziți.

Praziquantel este absorbit foarte repede prin suprafața corpului parazitului și este dispersat în corpul parazitului. Afectarea gravă a tegumentului parazitului este pusă în evidență foarte repede atât in vitro și in vivo, determinând micșorarea și paralizia parazitului. Aproape instantaneu există o contracție tetanică a musculaturii parazitului și o vascularizare rapidă a tegumentului sinciștal. Această contracție rapidă se explică prin schimbări ale fluxului de cationi bivalenți, în special de calciu.

Pirantelul acționează ca un colinergic agonist. Modul lui de acțiune este stimulat de receptorii colinergici nicotinici ai parazitului, inducând paralizia spastică a nematodelor și prin urmare eliminarea din sistemul gastrointestinal (GI).


În cazul mamiferelor molecula de febantel realizează închiderea inelului cu formare de fenbendazol și oxfendazol. Aceste entități chimice sunt cele care exercită efectul antihelmintic prin inhibarea polimerizării la nivelul tubulilor. În acest fel, este împiedicată formarea microtubulilor, ceea ce conduce la dezorganizarea structurilor vitale pentru funcționarea normală a helmintului (parazitului). Este afectată în special absorbția glucozei, ceea ce conduce la depletie în ATP celular. Parazitul moare din cauza epuizării rezervelor sale de energie, 2-3 zile mai târziu.


## 5.2 Particularități farmacocinetice

Concentrația plasmatică a celor trei produse a fost determinată după o singură administrare orală de Drontal Plus 35kg comprimate. Concentrațiile în plasmă găsite au fost pentru praziquantel: 14,1 – 1260,0 ng/ml, pirantel embonat: 29,6- 555,0 ng/ml, febantel: 11,3- 52,8 ng/ml.

Parametri:

|                              | Pirantel embonat | Praziquantel | Febantel         |
|------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| C <sub>Max</sub> (ng/ml)     | 395 ± 158        | 880 ± 345    | 28 ± 18          |
| T <sub>Max</sub> (h)         | 1,88 ± 1,44      | 1,00 ± 0,40  | 2,25 ± 1,5       |
| T <sub>1/2</sub> (h)         | 1,79 ± 0,46      | 2,45 ± 0,62  |                  |
| AUC <sub>tot</sub> (ng.h/ml) | 1424 ± 619       | 3505 ± 1665  | 0-24h: 121 ± 137 |





## 6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

### 6.1 Lista excipienților

Amidon de porumb  
Monohidrat de lactoză  
Celuloză microcristalină  
Povidonă  
Stearat de magneziu  
Lauril sulfat de sodiu  
Bioxid de siliciu coloidal anhidru  
Aromă artificială de vacă, iradiată

### 6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

### 6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

### 6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

### 6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Blister din PVC termolipit cu folie de aluminiu, conține 2 și 10 comprimate.  
Cutie de carton care conține 1, 2, 5, 10 bliste.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

### 6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

## 7. DETINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Bayer Animal Health GmbH  
D-51368 Leverkusen, Germania

## 8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

070325

## 9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

30 Octombrie 2007

## 10. DATA REVIZUIIRII TEXTULUI

## INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.



**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ  
PRIMAR**

Cutie de carton (pentru blister care conține 2 comprimate)

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Drontal Plus 35 kg, comprimate, câini

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)**

Un comprimat conține:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Febantel          | 525,0 mg |
| Pirantel embonate | 504,0 mg |
| Praziquantel      | 175,0 mg |

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

2 comprimate

**4. CALE DE ADMINISTRARE**

Administrare orală

**5. TIMP DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

**6. NUMĂRUL SERIEI**

Lot: {număr}

**7. DATA EXPIRĂRII**

EXP: {lună/an}

**8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.

**9. ALTE INFORMAȚII**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Producător:

KVP, Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Kiel, Germania



**INFORMATII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII**


Blister



**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Drontal Plus 35 kg, comprimate, câini

**2. NUMELE DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**



**3. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

**4. NUMĂRUL SERIEI**

Lot: {număr}

**5. ALTE INFORMATII**

1 = 35 kg



**PROSPECT**

Drontal Plus 35kg, comprimate, câini

**1. DE NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Detinătorul autorizației de comercializare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania

Producător pentru eliberarea seriei: KVP, Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Kiel, Germania

## 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Drontal Plus 35kg, comprimate, câini

Febantel, pirantel embonat, praziquantel

## 3. DECLARAȚIA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)

Un comprimat conține:

|                  |          |
|------------------|----------|
| Febantel         | 525,0 mg |
| Pirantel embonat | 504,0 mg |
| Praziquantel     | 175,0 mg |

## 4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru tratamentul infestațiilor mixte determinate de nematode, cestode și *Giardia spp.*.

Viermi rotunzi:

Ascarizi Toxocara canis

Viermi cu cărlig Toxascaris leonina

Vierme bici Uncinaria stenocephala

Viermi lati Ancilstoma caninum

Vierme bici Trichuris vulpis

Viermi lati Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis

Dipilidium caninum

Taenia spp.

Multiceps multiceps

Mesocestoides spp.

## 5. CONTRAINDICAȚII

Drontal Plus 35kg comprimate va fi utilizat doar în ultima treime a gestației.

## 6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

## 7. SPECII ȚINTĂ

Câini

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doza recomandată este de 15 mg febantel, 14,4 mg pirantel embonat și 5 mg praziquantel / kg greutate vie. Aceasta corespunde la 1 comprimat Drontal Plus 35 kg pe 35 kg greutate vie.



Administrarea dozei corecte este specificată în următorul tabel, ca un tratament cu o singură administrare orală.

| Câini*                   |   |
|--------------------------|---|
| Greutatea corporală.(Kg) | Număr de comprimate   |
| ≤ 20                     | Pentru câini mai mici se va utiliza comprimatul corespunzător |
| 20 -≤ 35                 | 1   |
| > 35 -≤ 55               | 1 1/2   |
| > 55 -≤ 70               | 2   |

\*Nu se va utiliza la câinii care au o greutate corporală mai mică de 20 kg

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru administrare orală, comprimatele pot fi date în consum direct câinilor. Nu sunt necesare măsuri dietetice (infometare) înainte sau după tratament. Se recomandă ca tratamentul să se efectueze înainte de hrănire.

Durată tratamentului:

Infestarea cu nematode și cestode

Pentru deparazitări periodice ale câinilor adulți aceștia vor fi tratați la fiecare 3 luni. Pentru tratament de rutină o singură doză este recomandată.

Infestarea cu *Giardia spp.*

Tratați trei zile consecutiv.

## 10. TEMPORALITATEA TRATAMENTULUI

Nu este cazul.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe cutie.

## 12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

**Precauții speciale pentru utilizare la animale**

Pentru câini cu greutatea corporală sub 20 kg trebuie utilizate comprimate pentru câini mici.

**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Pentru o bună igienă, persoanele care administrează comprimatul direct câinelui sau o încorporează în hrană, trebuie să se spele pe mâini după utilizare.

În cazul câinilor tratați în infestarea cu Giardia: a se curăță cu atenție și a se dezinfecța sau a se muta câinele care este în tratament, situație specifică în canise.

Giardia poate infesta oamenii de aceea vă rugăm să solicitați sfatul medicului în cazul în care câinele dumneavoastră este infestat.

## 13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR,

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## 14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL



## **15. ALTE INFORMAȚII**

### **Natura și compoziția ambalajului primar**

Blister din PVC termolipit cu folie de aluminiu, conține 2 și 10 comprimate.

Cutie de carton care conține 1, 2, 5, 10 blistere.

Nu există cantități de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare:

ROMÂNIA - S.C. Bayer SRL, Sos. Pipera nr. 42, sector 2, București, 020112, Telefon: +40 21 529 5900

