



EURICAN DHPPI2 - LR

Vaccin liofilizat si suspensie pentru suspensie injectabila

CAINI

Compozitie calitativa si cantitativa:

Vaccin liofilizat :

- Virusul atenuat al jigodiei, min.....10^{4.0}CCID50
- Adenovirusul canin atenuat (CAV2), min.....10^{2.5} CCID50
- Parvovirusul canin atenuat, min.....10^{4.9} CCID50
- Virusul atenuat al Parainfluenzei de tip 2, min.....10^{4.7} CCID50
- Excipient, qs.....1 doza

Suspensie:

- *Leptospira canicola* inactivata.....☐ q.s pentru activitate, in concordanta cu
- *Leptospira icterohaemorrhagiae* inactivata...☐ monografia 447 a Farmacopeei Europene
- Glicoproteine rabice min.....1 UI
- Aluminiu (sub forma de hidroxid).....0,6 mg
- Excipient q.s.....1 doza de 1 ml

Indicatii:

La caine:

Imunizarea activa impotriva jigodiei, a adenovirozelor, parvovirozelor, afectiunilor respiratorii cu virusul parainfluenzei de tip 2, leptospirozelor produse de *Leptospira canicola* si *Leptospira icterohaemorrhagiae* si rabiei.

Administrare si dozare:

Se injecteaza subcutanat 1 ml de vaccin in conformitate cu urmatorul program de vaccinare:

- Primovaccinare: o injectie cu Eurican DHPPI2 - LR din a 12-a saptamana de viata, la 3-5 saptamani inainte sau dupa Eurican DHPPI2 - L.
- Rapeluri: anuale

Precautii speciale de folosire:

- Vaccinul se va folosi imediat dupa reconstituirea vaccinului liofilizat cu solventul.
- Se vor vaccina doar animalele sanatoase, corect vermifugate cu cel putin 10 zile inaintea vaccinarii.
- Se vor aplica doar proceduri aseptice.
- Se va folosi doar echipament steril si antiseptic si / sau liber de dezinfectanti.
- Se recomanda sa nu supuneti cainii la eforturi fizice iesite din comun pâna nu capata imunitate deplina.

Efecte secundare:

- Vaccinarea poate genera o reactie locala tranzitorie precum si hipertermie.
- In mod exceptional, vaccinarea poate induce o stare de hipersensibilitate. In acest caz se recomanda un tratament simptomatic.
- Prezenta hidroxidului de aluminiu poate sa antreneze aparitia unui nodul tranzitoriu de mici dimensiuni la locul injectarii.

Supradozare (simptome, masuri de urgenta, antidot):

Injectarea unei supradoze de vaccin poate induce o depresie post-vaccinala precum si o reactie locala tranzitorie.

Proprietati imunologice:

Vaccin viu impotriva jigodiei, adenovirozelor, parvovirozei si infectiilor respiratorii cu virusul parainfluenzei de tip 2 a cainelui si impotriva leptospirozelor - *LEPTOSPIRA CANICOLA* si *LEPTOSPIRA ICTERHAEMORRAGIAE* si rabiei - inactivate.

Dupa administrare, vaccinul induce o stare imunitara impotriva jigodiei, adenovirozelor (CAV 1 si 2), parvovirozei, afectiunilor respiratorii cu virusul parainfluenzei de tip 2, leptospirozelor provocate de *Leptospira canicola* si *Leptospira icterohaemorrhagiae* si rabiei cainelui, demonstrate prin proba virulenta si prin prezenta anticorpilor.

Utilizare pe perioada gestatiei si alaptarii:

Studiile disponibile nu indica efecte nedorite pentru femelele gestante.

Interactiuni:

Nu este disponibila nici o informatie cu privire la siguranta si eficacitate in cazul folosirii concomitente a acestui vaccin cu alte vaccinuri.

Incompatibilitati:

A nu se folosi in amestec cu alte produse.

Precautii speciale, in caz de eliminare a resturilor de produs neutilizat sau a deseurilor:

Inainte de a fi eliminate, flacoanele goale sau care contin resturi de produs vor fi dezinfectate. Toate flacoanele goale vor fi eliminate in acod cu practicile locale de eliminare a deseurilor.

Depozitare:

Se va pastra la frigider, la temperaturi cuprinse intre +2°C si +8°C, ferit de lumina.

Vaccinul va fi folosit imediat dupa reconstituire.

Mod de prezentare: Flacon x 1 doza + diluant(componenta leptospirica si rabica)

Valabilitate: 24 de luni

Numai pentru uz veterinar .

PRODUCATOR : Merial SAS

Rue Bourgelat 17 , 69002 Lyon - Franta

IMPORTATOR EXCLUSIV : INTERSERVICES SRL

Str. Mr. Av. Stefan Sanatescu nr. 41 , Sector 1 – Bucuresti

Insoțiti orice reclamatie cu numarul seriei inscris pe eticheta produsului.