

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Euthanimal 40%, 400 mg/ml soluție injectabilă

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conține

Substanța activă:

pentobarbital de sodiu 400 mg (echivalent cu 365 mg pentobarbital)

Conservant:

Alcool benzilic (E 1519) 20,0 mg

Etanol 80,0 mg

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

Soluție limpede de culoare roșie

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Porcine, caprine, ovine, bovine, cabaline, pisici și câini

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă:

Pentru eutanasiere.

4.3 Contraindicații

Nu folosiți acest medicament pentru anestezie.

Carcasele și produsele comestibile provenite de la animalele injectate cu acest produs nu pot intra în lanțul alimentar, iar alte animale nu pot mânca (părți din) aceste carcace (vezi secțiunea 4.11)

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Injectarea intravenoasă de pentobarbital are capacitatea de a produce excitație prin inducție la mai multe specii de animale și trebuie aplicată o sedare adecvată dacă se consideră necesar de către medicul veterinar. Trebuie luate măsuri de precauție pentru evitarea administrării perivasculare (de exemplu prin utilizarea unui cateter intravenos).

Verificați în mod regulat, până la aproximativ 10 minute după administrare, dacă revin semnele vitale (respirație, puls, reflex cornean). În studiile clinice, s-a stabilit că acest lucru ar putea să intervină. Dacă semnele vitale revin, este recomandat să se repete administrarea folosind o cantitate de jumătate până la o doză întreagă din doza prescrisă.

Evitați utilizarea la animale cu greutate mai mică de 20 kg datorită concentrației ridicate a produsului și riscului crescut de apariție a durerii și iritației la administrarea perivasculară.

Pentru a reduce riscul de excitație prin inducție, eutanasierea trebuie să aibă loc într-o zonă liniștită.

În special la cabaline și bovine, medicul veterinar ar trebui să ia în considerare administrarea prealabilă a unui sedativ adecvat pentru a produce sedarea profundă înainte de eutanasiere și se recomandă să fie disponibilă o metodă alternativă de eutanasiere în cazul în care devine necesară.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu există.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Pentobarbitalul este un hipnotic și un sedativ puternic, prin urmare este potențial toxic la om. Poate fi absorbit sistemic prin piele și prin înghițire. Trebuie avută grijă specială să se evite ingestia și auto-injectarea accidentală

Absorbția sistemică (incluzând absorbția prin piele și ochi) a pentobarbitalului cauzează sedare, inducerea somnului și depresie respiratorie. În plus, acest produs poate fi iritant pentru ochi și poate provoca iritarea pielii, precum și reacții de hipersensibilitate (datorită prezenței pentobarbitalului și a alcoolului benzilic). Efectele embriotoxice nu pot fi excluse.

Evitați contactul direct cu pielea și ochii, inclusiv contactul mâini-ochi.

Evitați auto-injectarea accidentală sau injectarea accidentală a unei alte persoane atunci când administrați produsul.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la pentobarbital trebuie să evite contactul cu acest produs medicinal veterinar

Manipulați produsul cu cea mai mare grijă, mai ales personalul de sex feminin cu potențial fertil. Purtați mănuși de protecție. Acest medicament trebuie administrat numai de către medicii veterinari și trebuie utilizat numai în prezența unui alt profesionist, care poate ajuta în cazul unei expuneri accidentale. Instruiți cadrele profesionale, dacă nu au pregătire medicală, asupra riscurilor acestui produs.

În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, trebuie să clătiți imediat cu apă din abundență. În cazul auto-injecției accidentale sau dacă există cantități semnificative de produs pe piele sau în ochi, trebuie consultat medicul și trebuie să i se arate prospectul sau eticheta. În caz de ingerare accidentală, spălați gura și consultați medicul imediat. Dar NU CONDUCEȚI VEHICULE deoarece poate apărea sedarea.

În urma administrării produsului, animalul se va prăbuși în mai puțin de 10 secunde. Prin urmare, când animalul stă în picioare în timpul administrării, persoana care administrează produsul medicinal veterinar și persoanele din jur trebuie să păstreze distanța pentru a nu fi prinse sub animal

Acest produs este inflamabil, țineți-l la distanță de surse de aprindere. Nu fumați.

Informații destinate numai personalului medical în caz de expunere:

Măsurile de urgență trebuie să vizeze menținerea funcției respiratorii și cardiace. În cazuri de intoxicare gravă, trebuie luate măsuri de eliminare a barbituricelor.

Concentrația de pentobarbital din produs este suficientă pentru ca injectarea accidentală sau ingestia unei cantități chiar de 1 ml la omul adult poate avea efecte grave asupra SNC. O doză de sodiu pentobarbital de 1 g (echivalentul a 2,5 ml de produs) a fost raportată ca fiind fatală la om. Este necesar tratament de susținere cu măsuri adecvate de terapie intensivă și menținerea respirației.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Moartea poate fi amânată în cazul în care injecția este administrată perivascular sau în organe/țesuturi cu o capacitate redusă de absorbție. Barbituricele pot fi iritante atunci când sunt administrate perivascular.

Frecvente:

- Țipete
- Spasme musculare

Rare:

- Excitație
- Mișcări ale membrelor
- Defecație și scurgeri de urină
- Tulburări respiratorii (la bovine), în special din cauza subdozării
-

Foarte rare:

- Convulsii
- Con tracție a diafragmei
- Vărsături
- Una sau mai multe respirații cu icnit apar după stopul cardiac

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu sunt disponibile informații specifice. Utilizarea acestui produs la animalele gestante este lăsată la aprecierea medicului veterinar.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

Medicamentele cu efect deprimant asupra SNC (narcotice, fenotiazine, antihistaminice, etc) pot crește efectul pentobarbitalului.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, pisici și câini:
100 mg/kg (corespunzând la 0,25 ml/kg) prin injecție intravenoasă rapidă. Pentru animale mai mari, se recomandă utilizarea unui cateter intravenos pre-inserat

Dacă stopul cardiac nu intervine după 2 minute, trebuie administrată o a doua doză, preferabil prin injecție intravenoasă rapidă sau, dacă această cale de administrare nu este fezabilă, prin injecție intracardiacă; injecția intracardiacă poate fi administrată doar după o sedare sau anestezie profundă prealabilă.

Întrucât flaconul nu poate fi perforat de mai mult de 20 de ori, utilizatorul trebuie să aleagă cea mai potrivită dimensiune de flacon.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

În caz de administrare accidentală la un animal care nu fusese prezentat pentru eutanasiere, măsurile cum ar fi respirația artificială, administrarea de oxigen și utilizarea analepticilor sunt adecvate.

Din punct de vedere al eficacității acestui medicament, nu se recomandă o doză dublă, întrucât aceasta nu conduce la o eutanasiere mai rapidă sau mai eficientă.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul

Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se asigura că toate carcassele și părțile comestibile ale animalelor injectate cu acest produs nu pătrund în lanțul alimentar și nu sunt utilizate pentru consum uman. Alte animale nu pot consuma sub nicio formă (părți din) aceste carcasse, deoarece astfel ar avea loc expunerea la o doză letală de pentobarbital.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Barbiturice pentru eutanasiere.

Codul veterinar ATC: QN51AA01.

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Pentobarbital este un sedativ și hipnotic cu acțiune de scurtă durată. Acesta provoacă depresia sistemului nervos central, deoarece pentobarbitalul modulează receptorul GABA, prin care imită activitatea acidului gamma-aminobutiric.

Barbituricele produc în special supresia sistemului activator reticular (SAR) de la nivelul creierului, care asigură în mod normal starea de alertă. Efectul imediat este pierderea conștienței urmată de anestezie profundă, urmată de depresia rapidă a centrului respirator, la rate ridicate. Respirația se oprește și este urmată imediat de stop cardiac și moarte rapidă.

5.2 Particularități farmacocinetice

În urma administrării intravenoase are loc distribuția rapidă în tesuturi.

Eliminarea pentobarbitalului are loc în principal în ficat prin metabolizare, în special prin intermediul sistemului citocromului P₄₅₀, precum și prin excreție renală și redistribuire. La porcine, redistribuirea în țesutul adipos conduce la concentrații plasmatice reduse și un efect prelungit.

Barbituricele se pot difuza prin placentă în țesuturile fetale, iar urme de barbiturice pot fi prezente în laptele matern.

6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Etanol 96%

Propilenglicol

Alcool benzilic (E1519)

Ponceau 4R (E124)

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.

6.4. Precauții speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Cutie de carton cu un flacon de sticlă de tip II de 100 ml, sigilat cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu.

Cutie de polistiren cu 12 flacoane de sticlă de tip II de 100 ml, sigilate cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu.

Cutie de carton cu un flacon de sticlă de tip II de 250 ml, sigilat cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu.

Cutie de polistiren cu 6 flacoane de sticlă de tip II de 250 ml, sigilate cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Acest produs medicinal este periculos pentru oameni și animale. Eliminați orice produs neutilizat și recipientele goale în conformitate cu instrucțiunile autorităților locale de reglementare în domeniul deșeurilor

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Alfasan Nederland BV

Kuipersweg 9, Woerden
Olanda
Tel: 0348 - 416945
Fax: 0348 – 423577
E-mail: alfasan@wxs.nl

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/ REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

10 DATA REVIZUIRII TEXTULUI

August 2015

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Produs medicinal pentru uz exclusiv de către un medic veterinar. Nu se vinde către public.
Administrarea și custodia produsului medicinal trebuie realizate exclusiv de către medicul veterinar.
Se eliberează numai pe baza de rețetă veterinară.

ANEXA III

ETCHETARE ŞI PROSPECT

A. ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

{Cutie de carton}{N1} / Ambalaj din polistiren }

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Euthanimal 40%, 400 mg/ml soluție injectabilă
{Pentobarbital de sodiu}

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Fiecare ml conține

Substanța activă:

pentobarbital de sodiu 400 mg (echivalent cu 365 mg pentobarbital).

Conservant:

Alcool benzilic (E 1519) 20,0 mg

Etanol 80,0 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 flacon a 100 ml

1 flacon a 250 ml

12 flacoane a 100 ml

6 flacoane a 250 ml

5. SPECII ȚINTĂ

Porcine, caprine, ovine, bovine, cabaline, pisici și câini

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru eutanasiere

7. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, pisici și câini:

100 mg / kg (corespunzând la 0,25 ml/kg) prin injectare intravenoasă rapidă.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

Citiți prospectul înainte de utilizare

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Nu folosiți acest medicament pentru anestezie.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Injecția accidentală este periculoasă.

10. DATA EXPIRĂRII ,

EXP {lună/an}

După desigilare, se va utiliza în termen de 28 de zile.

11. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Acest produs medicinal este periculos pentru oameni și animale. Eliminați orice produs neutilizat și recipientele goale în conformitate cu instrucțiunile autorităților locale de reglementare în domeniul deșeurilor

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar.

Produs medicinal pentru uz exclusiv de către un medic veterinar. Nu se vinde către public. Administrarea și custodia produsului medicinal trebuie realizate exclusiv de către medicul veterinar.

Se eliberează numai pe baza de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR”

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Alfasan Nederland BV

Kuipersweg 9, Woerden
Olanda
Tel: 0348 - 416945
Fax: 0348 – 423577
E-mail: alfasan@wxs.nl

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie:

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

{Flacon de sticlă}

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Euthanimal 40%, 400 mg/ml soluție injectabilă
{Pentobarbital de sodiu}

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Fiecare ml conține

Substanța activă:

pentobarbital de sodiu 400 mg (echivalent cu 365 mg pentobarbital).

Conservant:

Alcool benzilic (E 1519) 20,0 mg

Etanol 80,0 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 ml

250 ml

5. SPECII ȚINTĂ

Porcine, caprine, ovine, bovine, cabaline, pisici și câini

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru eutanasiere

7. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Bovine, cabalină, porcine, caprine, ovine, pisici și câini:

100 mg / kg (corespunzând la 0,25 ml/kg) prin injectare intravenoasă rapidă.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

Citiți prospectul înainte de utilizare

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Nu folosiți acest medicament pentru anestezie.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Injecția accidentală este periculoasă.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După desigilare, se va utiliza în termen de 28 de zile.

După desigilare, se va utiliza până la __ . __ . ____

11. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Acest produs medicinal este periculos pentru oameni și animale. Eliminați orice produs neutilizat și recipientele goale în conformitate cu instrucțiunile autorităților locale de reglementare în domeniul deșeurilor

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar.

Produs medicinal pentru uz exclusiv de către un medic veterinar. Nu se vinde către public.

Administrarea și custodia produsului medicinal trebuie realizate exclusiv de către medicul veterinar.

Se eliberează numai pe baza de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPILOR”

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9, Woerden
Olanda
Tel: 0348 - 416945
Fax: 0348 – 423577
E-mail: alfasan@wxs.nl

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie:

B. PROSPECT

PROSPECT PENTRU:
Euthanimal 40%, 400 mg/ml soluție injectabilă

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9, Woerden
Olanda
Tel: 0348 - 416945
Fax: 0348 – 423577
E-mail: alfasan@wxs.nl

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Euthanimal 40%, 400 mg/ml soluție injectabilă
Pentobarbital de sodiu.

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Fiecare ml conține:

Substanța activă:

pentobarbital de sodiu 400 mg (echivalent cu 365 mg pentobarbital)

Conservanți:

Alcool benzilic (E 1519) 20,0 mg
Etanol 80,0 mg

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru eutanasiere

5. CONTRAINDICAȚII

Nu folosiți acest medicament pentru anestezie.

Carcasele și produsele comestibile provenite de la animalele injectate cu acest produs nu pot intra în lanțul alimentar, iar alte animale nu pot mânca (părți din) aceste carcase (vezi secțiunea 10)

6. REACȚII ADVERSE

Moartea poate fi amânată în cazul în care injecția este administrată perivascular sau în organe/țesuturi cu o capacitate redusă de absorbție. Barbituricele pot fi iritante atunci când sunt administrate perivascular.

Frecvente:

- Țipete
- Spasme musculare,

Rare:

- Excitație
- Mișcări ale membrelor

- Defecație și scurgeri de urină
- Tulburări respiratorii (la bovine), în special din cauza subdozării.

Foarte rare:

- Convulsii
- Contractie a diafragmei
- Vărsături
- Una sau mai multe respirații cu icnit apar după stopul cardiac

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Porcine, caprine, ovine, bovine, cabaline, pisici și câini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, pisici și câini:

100 mg/kg (corespunzând la 0,25 ml/kg) prin injecție intravenoasă rapidă. Pentru animale mai mari, se recomandă utilizarea unui cateter intravenos pre-inserat.

Dacă stopul cardiac nu intervine după 2 minute, trebuie administrată o a doua doză, preferabil prin injecție intravenoasă rapidă sau, dacă această cale de administrare nu este fezabilă, prin injecție intracardiacă; injecția intracardiacă poate fi administrată doar după o sedare sau anestezie profundă prealabilă.

Evitați utilizarea la animale cu greutate mai mică de 20 kg datorită concentrației ridicate a produsului și riscului crescut de apariție a durerii și iritației la administrarea perivasculară.

La cabaline și bovine, administrarea anterioară a unui sedativ adecvat ar putea fi utilizată pentru a induce sedarea înainte de eutanasiere.

Întrucât flaconul nu poate fi perforat de mai mult de 20 de ori, utilizatorul trebuie să aleagă cea mai potrivită dimensiune de flacon.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Injecția intravenoasă de pentobarbital are capacitatea de a produce excitație prin inducție la mai multe specii de animale și trebuie aplicată o sedare adecvată dacă se consideră necesar de către medicul veterinar. Trebuie luate măsuri de precauție pentru evitarea administrării perivascularare (de exemplu prin utilizarea unui cateter intravenos).

Pentru a reduce riscul de excitație prin inducție, eutanasierea trebuie să aibă loc într-o zonă liniștită.

În special la cabaline și bovine, medicul veterinar ar trebui să ia în considerare administrarea prealabilă a unui sedativ adecvat pentru a produce sedarea profundă înainte de eutanasiere și se recomandă să fie disponibilă o metodă alternativă de eutanasiere în cazul în care devine necesară.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se asigura că toate carcasele și părțile comestibile ale animalelor injectate cu acest produs nu pătrund în lanțul alimentar și nu sunt utilizate pentru consum uman. Alte animale nu pot consuma sub nicio formă (părți din) aceste carcase, deoarece astfel ar avea loc expunerea la o doză letală de pentobarbital.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PĂSTRARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor

Acest produs medicinal nu necesită condiții speciale de păstrare A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe etichetă după „exp”.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a recipientului: 28 de zile.

Atunci când fiola este abordată pentru prima dată, data la care produsul rămas în recipient trebuie aruncat trebuie completată în spațiul prevăzut pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Verificați în mod regulat, până la aproximativ 10 minute după administrare, dacă revin semnele vitale (respirație, puls, reflex cornean). În studiile clinice, s-a stabilit că acest lucru ar putea să intervină. Dacă semnele vitale revin, este recomandat să se repete administrarea folosind o cantitate de jumătate până la o doză întreagă din doza prescrisă.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Produs medicinal pentru uz exclusiv de către un medic veterinar. Nu se vinde către public.
Administrarea și custodia produsului medicinal trebuie realizate exclusiv de către medicul veterinar.

Pentobarbitalul este un hipnotic și un sedativ puternic, prin urmare este potențial toxic la om. Poate fi absorbit sistemic prin piele și prin înghițire. Trebuie avută grijă specială să se evite ingestia și auto-injecția accidentală

Absorbția sistemică (incluzând absorbția prin piele și ochi) a pentobarbitalului cauzează sedare, inducerea somnului și depresie respiratorie. În plus, acest produs poate fi iritant pentru ochi și poate provoca iritarea pielii, precum și reacții de hipersensibilitate (datorită prezenței pentobarbitalului și a alcoolului benzilic). Efectele embriotoxice nu pot fi excluse.

Evitați contactul direct cu pielea și ochii, inclusiv contactul mâini-ochi.

Evitați auto-injecția accidentală sau injecția accidentală a unei alte persoane atunci când administrați produsul.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la pentobarbital trebuie să evite contactul cu acest produs medicinal veterinar

Manipulați produsul cu cea mai mare grijă, mai ales personalul de sex feminin cu potențial fertil. Purtați mănuși de protecție. Acest medicament trebuie administrat numai de către medicii veterinari și trebuie utilizat numai în prezența unui alt profesionist, care poate ajuta în cazul unei expuneri accidentale. Instruiți cadrele profesionale, dacă nu au pregătire medicală, asupra riscurilor acestui produs.

În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, trebuie să clătiți imediat cu apă din abundență. În cazul auto-injecției accidentale sau dacă există cantități semnificative de produs pe piele sau în ochi, trebuie consultat medicul și trebuie să i se arate prospectul sau eticheta. În caz de ingerare accidentală, spălați gura și consultați medicul imediat. Dar NU CONDUCEȚI VEHICULE deoarece poate apărea sedarea.

În urma administrării produsului, animalul se va prăbuși în mai puțin de 10 secunde. Prin urmare, când animalul stă în picioare în timpul administrării, persoana care administrează produsul medicinal veterinar și persoanele din jur trebuie să păstreze distanța pentru a nu fi prinse sub animal

Acest produs este inflamabil, țineți-l la distanță de surse de aprindere. Nu fumați.

Informații destinate numai personalului medical în caz de expunere:

Măsurile de urgență trebuie să vizeze menținerea funcției respiratorii și cardiace. În cazuri de intoxicare gravă, trebuie luate măsuri de eliminare a barbituricelor.

Concentrația de pentobarbital din produs este suficientă pentru ca injectarea accidentală sau ingestia unei cantități chiar de 1 ml la omul adult poate avea efecte grave asupra SNC. O doză de sodiu pentobarbital de 1 g (echivalentul a 2,5 ml de produs) a fost raportată ca fiind fatală la om. Este necesar tratament de susținere cu măsuri adecvate de terapie intensivă și menținerea respirației.

Gestatie:

Nu sunt disponibile informații specifice privind animalele gestante. Utilizarea acestui produs la animalele gestante este lăsată la aprecierea medicului veterinar.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Medicamentele cu efect deprimant asupra SNC (narcotice, fenotiazine, antihistaminice, etc) pot crește efectul pentobarbitalului.

Din punct de vedere al eficacității acestui medicament, nu se recomandă o doză dublă, întrucât aceasta nu conduce la o eutanasiere mai rapidă sau mai eficientă.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot):

În caz de administrare accidentală la un animal care nu fusese prezentat pentru eutanasiere, măsurile cum ar fi respirația artificială, administrarea de oxigen și utilizarea analepticelor sunt adecvate.

Incompatibilitati:

În absența studiilor de incompatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Acest produs medicinal este periculos pentru oameni și animale. Eliminați orice produs neutilizat și recipientele goale în conformitate cu instrucțiunile autorităților locale de reglementare în domeniul deșeurilor

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

August 2015

15. ALTE INFORMAȚII

Cutie de carton cu un flacon de sticlă de tip II de 100 ml, sigilat cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu.

Cutie de polistiren cu 12 flacoane de sticlă de tip II de 100 ml, sigilate cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu.

Cutie de carton cu un flacon de sticlă de tip II de 250 ml, sigilat cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu.

Cutie de polistiren cu 6 flacoane de sticlă de tip II de 250 ml, sigilate cu dop din cauciuc bromobutilic și capac din aluminiu.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.