




ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ex spot 65% soluție spot on pentru câini

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml soluție conține:

Substanță activă:

Permetrin 65% w/w (0,731 g/ml)

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spot on

Soluție clară, colorată de la galben la cafeniu deschis pentru aplicare locală.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Câini

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru combaterea (prevenire/îndepărtare și tratament) puricilor, căpușelor și păduchilor la câini.

În plus, ex spot este eficient în tratamentul și prevenirea dermatitei alergice produse de purici.

În combaterea (efect de anti-hranire și eliminare) mustelor de nisip (*Phlebotomus perniciosus*).

4.3 Contraindicații

A nu se utiliza la pisici. A nu se utiliza la câini cu vârsta mai mică de 3 luni. Se exclude de la tratament câinii cu leziuni cutanate, în special în zona dorsală.

A nu se trata animalele bolnave sau în coalescență.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

În anumite cazuri, aplicarea prin apăsare puternică asociată cu leziuni ale pielii poate duce la apariția de reacții inflamatorii locale. Dacă acestea persistă, se recomandă spălarea câinelui cu un șampon.

Periculos pentru pești și crustacee. Acvariile și bazinele pentru pești nu se vor pune în contact cu

Ex spot.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

A se evita contactul produsului cu pielea. A se purta mănuși. După utilizare se recomandă spălarea mâinilor. Dacă în mod accidental Exspot ajunge la nivel ocular, se recomandă spălarea abundentă cu apă. Când se folosește Ex spot, nu se mănâncă, bea sau fumează.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

La locul aplicării poate să apară prurit. Ocazional, la locul aplicării poate să apară alopecie sau formate de vezicule. În anumite cazuri, în urma aplicării prin apăsare puternică asociată cu leziuni ale pielii poate duce la apariția de reacții inflamatorii locale.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație

Ex spot 1 ml poate fi folosit în timpul gestației și lactației.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Pentru aplicare locală. La câinii cu greutate de până la 15kg — 1 ml între omoplați.

La câinii cu greutatea peste 15 kg se aplică 1 ml între omoplați și 1 ml la baza cozii. Se dă blana la o parte se se aplica cantitatea recomandată direct pe piele între omoplați, respectiv la baza cozii. După tratament, 24 de ore trebuie evitată udarea câinelui. Câinii care au fost udați frecvent sau plouați de mai multe ori, trebuie tratați încă o dată. Tratamentul se poate repeta după 7 zile. O singură aplicare elimină puricii, căpușele, țânțarii, râia și păduchii și oferă protecție împotriva reinfestării până la 4 săptămâni împotriva puricilor și căpușelor. Pentru a evita reinfestarea cu purici și căpușe, se va trata adăpostul animalelor și în imediată apropiere a acestora cu substanțe corespunzătoare.

Un singur tratament are efect anti-hrănire timp de 3-4 săptămâni și eliminare timp de până la 2 săptămâni împotriva mustelor de nisip, *Phlebotomus perniciosus*.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Exspot nu poate fi folosit în nici un caz la pisici. Pisicile nu au glucoroniltransferaza, în cazul Permetrinei din Ex spot aceasta nu este metabolizată și poate da intoxicații manifestate prin ataxie și puternice crampe musculare.

Prima măsură este spălarea cu șampon.

Funcțiile vitale trebuie stabilizate, de exemplu prin administrare de electroliți. Atropina nu este antidot, aceasta poate determina simptome precum hipersalivație. Când apar crampe musculare, este indicat să se administreze intravenos derivați benzodiazepinici.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Antiparazitare. Piretroid împotriva ectoparaziților pentru uz local
Codul veterinar ATC: QP53AC04

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Permetrina este un piretroid sintetic, care derivă din grupul Piretrinelor naturale din structura plantelor. Efectul insecticid al Piretrinei naturale și al Piretroidul sintetic se manifestă prin contactul rapid care determină la ectoparaziți, în special artropodelor, un pronunțat efect distructibil pe o perioadă limitată. Oricum, pentru obținerea acestui lucru este nevoie de o perioadă de inducere corespunzătoare și de distribuție pe toată suprafața corpului.

În plus față de efectele asupra ectoparaziților, Piretroidul are și un efect respingător prin mecanismul neurotoxic. Efectul asupra parazitului se realizează prin deschiderea canalelor de sodiu de-a lungul

neuronilor parazitului; începând cu o fază de excitare, apoi paralizie și necoordonare, sfârșind cu moartea după o perioadă lungă. Piretroidul sintetic deține un avantaj față de Piretrina naturală: pe lângă efectul respingător are efect de distrugere a paraziților mai pronunțat și de lungă durată. Ex spot 1 ml conține Permetrin (amestec în proporție de 40:60 izomeri cis și trans) 65%. După aplicarea dozei prescrise în funcție de mărimea câinelui, se distribuie în 24 de ore pe toată suprafața pielii.

Ex spot 1 ml se aplică pe pielea dintre omoplați. Efectul repulsiv se bazează pe excitarea nervoasă la nivelul receptorilor de la membrele ectoparaziților, îndepărtându-i de zonele cu concentrații mărite. Astfel căpușele și puricii nu devin vizibili pe piele, înainte ca ei să moară. Este indicat a se informa deținătorii de animale de proprietățile produsului Ex spot.

Epiderma integră a câinilor, respectiv blana se regenerează constant, de aceea corneoziten este ciclic eliminat din acestea. Din această cauză, Ex spot trebuie aplicat la fiecare 4 săptămâni pentru a avea efect asupra puricilor și căpușelor. Pentru a evita reinfestarea, mediul în care trăiește animalul trebuie dezinfectat.

Ploaia și baia reduc eficacitatea produsului Ex spot 1 ml. Când se fac băi frecvente, durata eficacității produsului se reduce la 17 zile. Câinii tratați cu Ex spot nu trebuie spălați cu șampon. Reaplicarea produsului este posibilă după 7 zile.

5.2 Particularități farmacocinetice

Permetrin este rapid metabolizat de către mamifere și aproape toată doza este excretată ca metaboliți în urină și fecale. Excreția izomerilor trans este mai rapidă decât a izomerilor cis datorită susceptibilității scăzute și întârziate la hidrolizarea enzimatică a legăturilor esterilor. Aceasta este explicația toxicității permetrinei care conține diferite cantități de izomeri cis și trans.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Propilen glicol metil eter

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 48 luni

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.

A se ține separat de mâncare și băuturi.

A nu se lăsa la îndemana copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Cutie de carton care conține aplicatoare spot-on cu 1 ml. Pipetele sunt formate din blister filmat (polipropilen/ciclic-olefin-copolimer/polipropilena) și capac acoperit cu folie (aluminu/polipropilena co-extrudat) furnizat în pungi de aluminu.

1 bliste x 6 pipete x 1 mL.

1 cutie x 12 blistere x 6 pipete x 1 ml

6.6

Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse



Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

050400

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

10.06.2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Octombrie 2012

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul




ANEXA III
ETCHETARE ȘI PROSPECT





A. ETICHETARE



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton x 12 blistere

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ex spot 65% soluție spot on pentru câini

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 ml conține:

Permetrin 731 mg

Propilen glicol metil eter

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spot on

Soluție clară, colorată de la galben la cafeniu deschis pentru aplicare locală.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

12 blistere x 6 pipete x 1 ml

5. SPECII ȚINTĂ

Câine

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru combaterea (prevenire/îndepărtare și tratament) puricilor, căpușelor și păduchilor la câini.

În plus, ex spot este eficient în tratamentul și prevenirea dermatitei alergice produse de purici.

În combaterea (efect de anti-hranire și eliminare) mustelor de nisip (*Phlebotomus perniciosus*).

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de folosire.

Se aplică doar pe piele.

La câinii cu greutate de până la 15kg— 1 ml între omoplați.

La cainii cu greutate de peste 15kg— 1 ml între omoplați și 1 ml la baza cozii.

Acest tratament unic protejează pentru o perioadă de patru săptămâni. Pentru a evita reinfestarea cu purici și capușe, se va trata adăpostul animalelor și în imediata apropiere a acestora cu insecticide corespunzătoare.

Se da blana la o parte se se aplica cantitatea recomandată direct pe piele între omoplați, respectiv la baza cozii. Asigurați-vă că o zi după tratament câinele este ținut în loc uscat și ferit de ploaie și apă.


Dacă aceștia au fost udați sau plouați, tratamentul se poate repeta după 7 zile.

Un singur tratament are efect anti-hranire timp de 3-4 săptămâni și eliminare timp de până la 2 săptămâni împotriva mustelor de nisip, *Phlebotomus perniciosus*.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ



Periculos pentru pesti si crustacee. Acvariile si bazinele pentru pesti nu se vor pune in contact cu Ex spot.

Ex spot nu poate fi folosit în nici un caz la pisici. Pisicile nu pot metaboliza permetrina. Aceasta poate prezenta semne de toxicitate, cu spasme musculare severe și ataxie. Dacă Ex spot a fost folosit local la pisici, prima măsură luată este spălarea cu șampon sau săpun lichid. Pacientul trebuie dus de urgență la medicul veterinar.

La locul aplicării poate să apară prurit. Ocazional, la locul de aplicare, poate să apară alopecie sau formare de vezicule. În anumiți cazuri pot apărea îngroșarea pielii și reacții inflamatorii locale. Dacă se observă alte reacții adverse în afara de cele prezentate aici, se va anunța medicul veterinar sau farmacistul.

A se evita contactul produsului cu pielea. Folosiți mănuși.

Dupa utilizare se recomanda spalarea mainilor. Dacă în mod accidental, Ex spot ajunge la nivel ocular, se recomandă spălarea abundentă cu apă.

A nu se mânca, bea și fuma când se folosește produsul.

În unele cazuri, expunerea excesivă poate determina modificări și inflamații ale pielii. În aceste cazuri, se recomandă spălarea câinelui cu șampon.

10. DATA EXPIRĂRII

<EXP {lună/an}>

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se ține separat de mâncare și băuturi.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda


16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

050400



17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Blistere x 6 pipete

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ex spot 65% soluție spot on pentru câini

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 ml conține:
Permetrin 731 mg
Propilen glicol metil eter

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spot on
Soluție clară, colorată de la galben la cafeniu deschis pentru aplicare locală.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

6 pipete x 1 ml

5. SPECII ȚINTĂ

Câine

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru combaterea (prevenire/îndepărtare și tratament) puricilor, căpușelor și păduchilor la câini.
În plus, ex spot este eficient în tratamentul și prevenirea dermatitei alergice produse de purici.
În combaterea (efect de anti-hranire și eliminare) mustelilor de nisip (*Phlebotomus perniciosus*).

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de folosire.
Se aplică doar pe piele.
La câinii cu greutate de până la 15kg— 1 ml între omoplați.
La câinii cu greutate de peste 15kg— 1 ml între omoplați și 1 ml la baza cozii.
Acest tratament unic protejează pentru o perioadă de patru săptămâni. Pentru a evita reinfestarea cu purici și căpușe, se va trata adăpostul animalelor și în imediată apropiere a acestora cu insecticide corespunzătoare.
Se da blana la o parte se se aplica cantitatea recomandată direct pe piele între omoplați, respectiv la baza cozii. Asigurați-vă că o zi după tratament câinele este ținut în loc uscat și ferit de ploaie și apă.
Dacă aceștia au fost udați sau plouați, tratamentul se poate repeta după 7 zile.
Un singur tratament are efect anti-hranire timp de 3-4 săptămâni și eliminare timp de până la 2 săptămâni împotriva mustelilor de nisip, *Phlebotomus perniciosus*.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Periculos pentru pesti si crustacee. Acvariile si bazinele pentru pesti nu se vor pune in contact cu Ex spot.

Ex spot nu poate fi folosit în nici un caz la pisici. Pisicile nu pot metaboliza permetrina. Aceasta poate prezenta semne de toxicitate, cu spasme musculare severe și ataxie. Dacă Ex spot a fost folosit local la pisici, prima măsură luată este spălarea cu șampon sau săpun lichid. Pacientul trebuie dus de urgență la medicul veterinar.

La locul aplicării poate să apară prurit. Ocazional, la locul de aplicare, poate să apară alopecie sau formare de vezicule. În anumite cazuri pot apărea îngroșarea pielii și reacții inflamatorii locale. Dacă se observa alte reacții adverse în afara de cele prezentate aici, se va anunța medicul veterinar sau farmacistul.

A se evita contactul produsului cu pielea. Folosiți mănuși.

Dupa utilizare se recomanda spalarea mainilor. Dacă în mod accidental, Ex spot ajunge la nivel ocular, se recomandă spălarea abundentă cu apă.

A nu se mânca, bea și fuma când se folosește produsul.

În unele cazuri, expunerea excesivă poate determina modificări și inflamații ale pielii. În aceste cazuri, se recomandă spălarea câinelui cu șampon.

10. DATA EXPIRĂRII

<EXP {lună/an}>

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se ține separat de mâncare și băuturi.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Olanda

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

050400

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS



Lot

Anexa nr. 4



B.PROSPECT



PROSPECT
Ex spot 65% soluție spot on pentru câini

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:

S-P Veterinary Ltd / Schering-Plough
Breakspear Road South, Harefield,
Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS,
Marea Britanie

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ex spot 65% soluție spot on pentru câini

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml conține:

Permetrin 731 mg
Propilen glicol metil eter

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru combaterea (prevenire/îndepărtare și tratament) puricilor, căpușelor și păduchilor la câini.
În plus, ex spot este eficient în tratamentul și prevenirea dermatitei alergice produse de purici.
În combaterea (efect de anti-hranire și eliminare) mustelor de nisip (*Phlebotomus perniciosus*).

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la pisici. A nu se utiliza la câini cu vârsta mai mică de 3 luni. Se exclude de la tratament câinii cu leziuni cutanate, în special în zona dorsală.
A nu se trata animalele bolnave sau în coalescență.

6. REACȚII ADVERSE

La locul aplicării poate să apară prurit. Ocazional, la locul aplicării poate să apară alopecie sau formare de vezicule. În anumite cazuri, în urma aplicării prin apăsare puternică asociată cu leziuni ale pielii poate duce la apariția de reacții inflamatorii locale.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru aplicare locală. La câinii cu greutate de până la 15kg— 1 ml între omoplați.
La câinii cu greutatea peste 15 kg se aplică 1 ml între omoplați și 1 ml la baza cozii.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se dă blana la o parte se se aplica cantitatea recomandată direct pe piele între omoplați, respectiv la baza cozii. După tratament, 24 de ore trebuie evitată udarea câinelui. Câinii care au fost udați frecvent sau plouați de mai multe ori, trebuie tratați încă o dată. Tratamentul se poate repeta după 7 zile. O singură aplicare elimină puricii, căpușele, țânțarii, râia și păduchii și oferă protecție împotriva reinfestării până la 4 săptămâni împotriva puricilor și căpușelor. Pentru a evita reinfestarea cu purici și căpușe, se va trata adăpostul animalelor și în imediată apropiere a acestora cu substanțe corespunzătoare.

Un singur tratament are efect anti-hrănire timp de 3-4 săptămâni și eliminare timp de până la 2 săptămâni împotriva mustelilor de nisip, *Phlebotomus perniciosus*.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.

A se ține separat de mâncare și băuturi.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 48 luni

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

A se evita contactul produsului cu pielea. A se purta mănuși. După utilizare se recomandă spălarea mâinilor. Dacă în mod accidental Exspot ajunge la nivel ocular, se recomandă spălarea abundentă cu apă. Când se folosește Ex spot, nu se mănâncă, bea sau fumează.

În anumite cazuri, aplicarea prin apăsare puternică asociată cu leziuni ale pielii poate duce la apariția de reacții inflamatorii locale. Dacă acestea persistă, se recomandă spălarea câinelui cu un șampon.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

05.2009

15. ALTE INFORMAȚII

Cutie de carton care conține aplicatoare spot-on cu 1 ml. Pipetele sunt formate din blister filmat (polipropilen/ciclic-olefin-copolimer/polipropilena) și capac acoperit cu folie (aluminiiu/polipropilena co-extrudat) furnizat în pungi de aluminiiu.

1 blister x 6 pipete x 1 ml

1 cutie x 12 blistere x 6 pipete x 1 ml

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

