

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Expronil Soluție Spot-on pentru pisici 50 mg

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

O doză (pipetă) de 0,5 ml conține:

Substanță activă:

Fipronil 50 mg

Excipienți:

Butilhidroxianisol E320 0.1 mg

Butilhidroxitoluen E321 0.05 mg

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot-on, limpede, de culoarea chihlimbarului pal.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare

Tratamentul infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp*).

Produsul are eficiență insecticidă persistentă timp de până la 5 săptămâni împotriva puricilor (*Ctenocephalides spp*).

Produsul nu a demonstrat un efect acaricid imediat împotriva căpușelor, dar a demonstrat efect acaricid persistent de până la 2 săptămâni împotriva *Ixodes ricinus* și de o săptămână împotriva *Dermacentor reticulatus* și *Rhipicephalus sanguineus*. Dacă, la momentul aplicării, sunt prezente căpușe din aceste specii, se poate ca nu toate căpușele să fie ucise în primele 48 de ore, dar ele pot fi ucise într-o săptămână.

Produsul poate fi folosit ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsă de purici (DAP), unde aceasta a fost diagnosticată în prealabil de medicul veterinar.

4.3 Contraindicații

În absența datelor de specialitate, produsul nu trebuie folosit la pisici mai mici de 2 luni sau care cântăresc mai puțin de 1 kg.

A nu se utiliza la animale bolnave (boli sistemice, febră) sau în convalescență.

A nu se utiliza la iepuri, deoarece poate produce reacții adverse și chiar moartea animalului.

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

4.4 Atenționări speciale

Puricii de pe animale, adesea infestază coșul animalului, patul sau zonele normale de odihnă, cum ar fi covoarele sau canapelele, acestea trebuie tratate, în cazul infestațiilor masive și la începutul măsurilor de control, cu un insecticid potrivit și aspirate în mod regulat.

Produsul nu previne atașarea capuselor de animale. Dacă animalul a mai fost tratat înainte de expunerea la capuse, acestea vor fi ucise în primele 24-48 de ore după atașare. Aceasta va apare în mod obișnuit înainte de a se hrăni capusele, minimalizând, dar nu excluzând riscul transmiterii de boli. Odată moarte, de cele mai multe ori, capusele vor cădea de pe animal, iar capusele rămase pot fi scoase cu ușurință.

Evitați înotul / îmbăierile frecvente sau șamponarea animalului, deoarece menținerea eficienței produsului în aceste cazuri nu a fost testată.

Pentru controlul problemelor datorate puricilor în adăposturile cu mai multe specii de animale, toți câinii și toate pisicile din adăpost trebuie tratate cu insecticidul potrivit.

Când se folosește ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsă de purici (DAP), se recomandă aplicare lunară la pacienții cu alergii și la ceilalți câini și pisici din adăpost.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Evitați contactul cu ochii animalului. În caz de contact accidental cu ochii, imediat clătiți foarte bine ochii cu apă.

A nu se aplica pe răni sau piele afectată.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Acest produs poate cauza iritații ale membranelor mucoase și ale ochilor. De aceea trebuie evitat contactul între produs și gură sau ochi.

În caz de contact accidental cu ochii, imediat clătiți foarte bine ochii cu apă. Dacă iritațiile oculare persistă solicitați sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului.

Evitați contactul conținutului cu pielea. Dacă acesta apare, spălați mâinile cu apă și săpun. Spălați mâinile după utilizare.

Animalele sau operatorii cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau excipienți (vezi secțiunea 6.1), trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Animalele tratate nu trebuie manipulate până la uscarea locului aplicației și copii trebuie ținuti departe de animale până când locul aplicației este uscat. De aceea este recomandat ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, dar trebuie tratate seara devreme și nu trebuie permis animalelor tratate recent să doarmă cu stăpânii, în special copiii.

Alte precauții

Suportul alcoolic poate avea efecte adverse pe mobila sau alte suprafețe vopsite, lustruite.

Produsul este inflamabil. A se ține la distanță de caldură, scântei, flacără deschisă sau alte surse de aprindere. Nu fumați, beți sau consumați alimente pe durata aplicării.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Dacă animalul linge locul de aplicare, o scurtă perioadă de hipersalivație poate fi observată datorită în principal naturii ingredientelor.

Între reacțiile adverse suspecte, extrem de rare, după utilizare s-au raportat la locul aplicației, reacții cutanate tranzitorii (descuamare, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit sau alopecie generală. În mod excepțional s-au observat după utilizare, hipersalivație, simptome neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, simptome nervoase) sau vomă.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Studiile de laborator cu fipronil nu au evidențiat efecte teratogene sau embriotoxice. Studiile cu acest produs nu au fost efectuate la pisici gestante sau lactante. Utilizați în perioada de gestație sau lactație numai în concordanță cu sfatul veterinar profesional și cu evaluarea beneficiu/risc.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Calea de administrare și dozaj:

Numai pentru utilizare externă.

Administrați prin aplicare locală (spot on) pe piele, o pipetă de 0,5 ml per animal.

Metoda de administrare:

Scoateți pipeta din blister. Țineți pipeta cu vârful în sus. Loviți ușor partea îngustă a pipetei pentru a fi siguri că soluția este în corpul principal al pipetei. Răsuciți și trageți capacul pipetei pentru a permite eliminarea conținutului.

Depărtați blana animalului până când se vede pielea. Așezați vârful pipetei pe pielea goală și apăsați delicat pipeta pentru a goli conținutul în două puncte de-a lungul spatelui pisicii, preferabil la baza capului și la 2-3 cm mai în spate, golind aproximativ jumătate din volum în fiecare punct. Presați pipeta de câteva ori pentru a vă asigura că dozarea este completă.

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat pe o suprafață unde animalul nu se poate linge și ca animalele nu se pot linge între ele după tratament.

Trebuie avut grijă pentru a evita umectarea excesivă a părului cu produs întrucât aceasta va cauza aspectul lipicios al părului la locul tratamentului. Oricum, dacă aceasta apare, va dispărea în 24 de ore de la aplicare. De asemenea, până la 48 de ore de la aplicare, se pot observa formarea de cruste și depozite cristaline pe păr, la locul aplicării.

Schema de tratament:

Pentru controlul optim al infestațiilor cu purici și/sau căpușe, programul de tratament poate fi bazat pe situația epidemiologică locală.

În absența studiilor de siguranță, intervalul minim de tratament este de 4 săptămâni.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu s-au observat efecte adverse în studiile de siguranță la speciile țintă la pisici și pisicuțe în vârstă de cel puțin 2 luni sau mai bătrâne în greutate de circa 1 kg, tratate timp de 3 luni consecutive, cu o cantitate de 5 ori doza recomandată.

Riscul apariției efectelor adverse poate crește oarecum prin supradozare.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grup farmacoterapeutic: Alte ectoparazitare pentru uz topic.
ATC Vet Code QP 53AX15

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Fipronil este un insecticid și acaricid aparținând familiei fenil-pirazol. Actionează prin inhibarea complexului GABA (neurotransmitatorul acid gamma amino butiric), prin legarea la canalele clorurice, blocând astfel transferurile pre și post sinaptice ale ionilor de clor dincolo de membrane celulare. În principal cele cu situs de legare pentru neurotransmitatorul acid gamma amino butiric (GABA). Astfel, rezulta o activitate necontrolată a sistemului nervos și moartea insectelor sau acarienilor. Puricii vor fi uciși în 48 de ore după contactul cu fipronil, oricum în situația în care căpușele din speciile *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* sau *Rhipicephalus sanguineus* sunt prezente, se poate ca nu toate căpușele să fie ucise în primele 48 de ore.

5.2 Particularități farmacocinetice

Absorbția:

Absorbția fipronil la nivelul pielii este neglijabilă.

Distribuirea:

După aplicarea topică, produsul se răspândește pornind din locul aplicării pe toată suprafața pielii în 24-48 de ore.

Biotransformare:

Fipronil este metabolizat în principal în derivat său sulfonic care posedă, de asemenea, proprietăți insecticide și acaricide.

Eliminare:

Concentrația de fipronil din păr va scăde în timp.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Butilhidroxianisol E320
Butilhidroxitoluen E321
Benzil alcool
Dietilen glicol monoetil eter

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

A se depozita la loc uscat.

A se depozita în ambalajul original.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Pipete din polipropilenă, albe opace, roz translucid sau verde translucid, ce conțin un volum extractibil de 0,5 ml, ambalat într-un blister PVC sigilat la cald sigilat cu folie de aluminiu și plasat în cutie de carton.

Ambalaj de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 60, 90 sau 150 pipete.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

Fipronil poate genera efecte adverse la organismele acvatice. Nu contaminați iazuri, canale sau șanțuri cu produs sau ambalaj golit.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway,
Irlanda.

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

120106

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

23.03.2012

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Noiembrie 2016

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.



ANEXA III
ETICHETARE ȘI PROSPECT

A. ETICHETARE

PARTICULARITĂȚI CE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton

Expronil Soluție Spot-on pentru pisici 50 mg

1. NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Expronil Soluție Spot-on pentru pisici 50 mg

2. DECLARAREA SUBSTANTELOR ACTIVE SI A ALTOR SUBSTANTE

O doză (pipetă) de 0,50 ml conține:

Substanță activă:

Fipronil 50 mg

Excipienți:

Butilhidroxianisol E320 0.1 mg

Butilhidroxitoluen E321 0.05 mg

3. FORMĂ FARMACEUTICĂ

Soluție spot-on.

4. FORMA DE PREZENTARE

1 x 0.5 ml
2 x 0.5 ml
3 x 0.5 ml
4 x 0.5 ml
6 x 0.5 ml
8 x 0.5 ml
9 x 0.5 ml
10 x 0.5 ml
12 x 0.5 ml
15 x 0.5 ml
18 x 0.5 ml
20 x 0.5 ml
21 x 0.5 ml
24 x 0.5 ml
30 x 0.5 ml
60 x 0.5 ml
90 x 0.5 ml
150 x 0.5 ml

5. SPECII ȚINTĂ

Pisici.

6. INDICAȚIE(I)

Tratamentul infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*). Protejează împotriva puricilor timp de 5 săptămâni. Protejează timp de 2 săptămâni împotriva căpușelor *Ixodes ricinus* și timp de o săptămână împotriva *Dermacentor reticulatus* și *Rhipicephalus sanguineus*. Ajutor în tratamentul contra dermatitei alergice produsă de purici (DAP).

7. METODA ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Utilizare locală, spot on.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**9. PRECAUȚII SPECIALE, DACĂ ESTE NECESAR****10. DATA EXPIRĂRII**

EXP{lună/an}
Eliminați orice pipete începute.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se depozita la temperaturi de peste 25°C.
A se pastra la loc uscat.
A se depozita în ambalajul original.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI RĂMAS NEUTILIZAT SAU REZIDUURI, DACĂ SUNT

Eliminarea: cititi prospectul produsului.

13. MENȚIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII ȘI RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar.

14. MENȚIUNEA “ A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway,
Irlanda

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

120106

17. NUMĂRUL LOTULUI

Lot{număr}

MINIMUM DE PARTICULARITĂȚI CE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Pipetă de 0,5 ml

1. NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Expronil Soluție Spot-on pentru pisici 50 mg

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ ACTIVĂ (E)

Fipronil

3. CONȚINUT PE GREUTATE, PE VOLUM SAU PE NUMĂR DE DOZE

0,5 ml

4. CALEA DE ADMINISTRARE

Spot-on.

5. PERIOADA DE AȘTEPTARE

6. NUMĂRUL LOTULUI

Lot {număr}

7. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8. MENȚIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Am. A. u. 4



B. PROSPECT

PROSPECT

Expronil Soluție Spot-on pentru pisici 50 mg
Fipronil

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE RESPONSABIL CU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACA SUNT DIFERITE

Detinatorul autorizatiei de comercializare::

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway.
Irlanda

2. NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Expronil Soluție Spot-on pentru pisici 50 mg
Fipronil

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Soluție spot-on, de culoarea chihlimbarului pal
O doză (pipetă) de 0,5 ml conține:

Substanță activă:

Fipronil 50 mg

Excipienți:

Butilhidroxianisol E320 0.1 mg

Butilhidroxitoluen E321 0.05 mg

4. INDICAȚII

Tratamentul infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp*).

Produsul are eficiență insecticidă persistentă timp de până la 5 săptămâni împotriva puricilor *Ctenocephalides spp*.

Produsul nu a demonstrat un efect acaricid imediat împotriva căpușelor, dar a demonstrat efect acaricid persistent de până la 2 săptămâni împotriva *Ixodes ricinus* și de o săptămână împotriva *Dermacentor reticulatus* și *Rhipicephalus sanguineus*. Dacă, la momentul aplicării, sunt prezente căpușe din aceste specii, se poate ca nu toate căpușele să fie ucise în primele 48 de ore, dar ele pot fi ucise într-o săptămână.

Produsul poate fi folosit ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsă de purici (DAP), unde aceasta a fost diagnosticată în prealabil de medicul veterinar.

5. CONTRAINDICAȚII

În absența datelor de specialitate, produsul nu trebuie folosit la pisici mai mici de 2 luni sau care cântăresc mai puțin de 1 kg.

A nu se utiliza la animale bolnave (boli sistemice, febră) sau în convalescență.

A nu se utiliza la iepuri, deoarece poate produce reacții adverse și chiar moartea animalului.

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

Dacă animalul linge locul de aplicare, o scurtă perioadă de hipersalivație, poate fi observată datorită în principal naturii ingredientelor.

Între reacțiile adverse suspecte, extrem de rare, după utilizare s-au raportat la locul aplicației, reacții cutanate tranzitorii (descuamare, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit sau alopecie generală. În mod excepțional s-au observat după utilizare, hipersalivație, simptome neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, simptome nervoase) sau vomă.

Dacă observați alte efecte grave sau alte efecte nemenționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Pisici.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE(CĂI) ȘI METODĂ DE ADMINISTRARE

Calea de administrare și dozaj:

Numai pentru utilizare externă.

Administrați prin aplicare locală (spot on) pe piele, o pipetă de 0,5 ml per animal.

Metoda de administrare:

Scoateți pipeta din blister. Țineți pipeta cu vârful în sus. Loviți ușor partea îngustă a pipetei pentru a fi siguri că soluția este în corpul principal al pipetei. Răsuciți și trageți capacul pipetei pentru a permite eliminarea conținutului.

Depărtați blana animalului până când se vede pielea. Așezați vârful pipetei pe pielea goală și apăsați delicat pipeta pentru a goli conținutul în două puncte de-a lungul spatelui pisicii, preferabil la baza capului și la 2-3 cm mai în spate, golind aproximativ jumătate din volum în fiecare punct. Presați pipeta de câteva ori pentru a vă asigura ca dozarea este completă.

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat pe o suprafață unde animalul nu se poate linge și ca animalele nu se pot linge între ele după tratament.

Trebuie avut grijă pentru a evita umectarea excesivă a părului cu produs întrucât aceasta va cauza aspectul lipicios al părului la locul tratamentului. Oricum, dacă aceasta apare, va dispărea în 24 de ore de la aplicare. De asemenea, până la 48 de ore de la aplicare, se pot observa scalare și depozite cristaline pe păr, la locul aplicării.

Schema de tratament:

Pentru controlul optim al infestațiilor cu purici și/sau căpușe, programul de tratament poate fi bazat pe situația epidemiologică locală.

În absența studiilor de siguranță, intervalul minim de tratament este de 4 săptămâni.

9. PRECAUȚII PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Eliminați orice pipete începute.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu se aplică.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
- A nu se depozita la temperaturi de peste 25°C.
- A se pastra la loc uscat.
- A se depozita în ambalajul original.
- A nu se utiliza după expirarea datei marcată pe etichetă.

12. PRECAUȚII SPECIALE

Produsul nu previne atașarea capuselor de animale. Dacă animalul a mai fost tratat înainte de expunerea la capuse, acestea vor fi ucise în primele 24-48 de ore după atașare. Aceasta va apare în mod obișnuit înainte de a se hrăni capusele, minimalizând, dar nu excluzând riscul transmiterii de boli. Odată moarte, de cele mai multe ori, capusele vor cădea de pe animal, iar capusele rămase pot fi scoase cu ușurință.

Puricii de pe animale, adesea infestază coșul animalului, patul sau zonele normale de odihnă, cum ar fi covoarele sau canapelele, ce trebuie tratate, în cazul infestațiilor masive și la începutul măsurilor de control, cu un insecticid potrivit și aspirate în mod regulat.

Evitați înotul / îmbăierile frecvente sau șamponarea animalului, deoarece menținerea eficienței produsului în aceste cazuri nu a fost testată.

Pentru controlul problemelor datorate puricilor în adăposturile cu mai multe specii de animale, toți câinii și toate pisicile din adăpost trebuie tratate cu insecticidul potrivit.

Când se folosește ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice produsă de purici (DAP), se recomandă aplicare lunară la pacienții cu alergii și la ceilalți câini și pisici din adăpost.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Înainte de tratament, animalele trebuie cântărite cu acuratețe pentru asigurarea că se aplică dimensiunea corectă de pipetă.

Evitați contactul cu ochii animalului. În caz de contact accidental cu ochii, imediat clătiți foarte bine ochii cu apă.

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat pe o suprafață unde animalul nu se poate linge și ca animalele nu se pot linge între ele după tratament.

A nu se aplica pe răni sau piele afectată.

Utilizați în perioada de gestație sau lactație numai în concordanță cu sfatul veterinar profesional și cu evaluarea beneficiu/risc.

Nu sunt incompatibilități cunoscute.

Riscul apariției efectelor adverse poate crește în cazul supradozării.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Acest produs poate cauza iritații ale membranelor mucoase și ale ochilor. De aceea trebuie evitat contactul între produs și gură sau ochi.

În caz de contact accidental cu ochii, imediat clătiți foarte bine ochii cu apă. Dacă iritațiile oculare persistă solicitați sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului.

Evitați contactul conținutului cu pielea. Dacă acesta apare, spălați mâinile cu apă și săpun. Spălați mâinile după utilizare.

Animalele sau operatorii cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau excipienți (vezi secțiunea 6.1), trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Animalele tratate nu trebuie manipulate până la uscarea locului aplicației și copii trebuie ținute departe de animale până când locul aplicației este uscat. De aceea este recomandat ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, dar trebuie tratate seara devreme și nu trebuie permis animalelor tratate recent să doarmă cu stăpânii, în special copiii. Dacă produsul este înghitit accidental contactați imediat medicul și prezentați prospectul.

Nu fumați, beți sau mâncați în timpul aplicării.

Numai pentru uz veterinar.

Alte precauții

Produsul este inflamabil. Țineți-l departe de surse de căldură, scantei, flăcări sau alte surse de foc.

Produsul poate afecta vopseaua, lacul sau alte suprafețe ale mobilei.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI RĂMAS NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Fipronil poate genera efecte adverse la organisme acvatice. Nu contaminați iazuri, canale sau șanțuri cu produs sau ambalaj golit.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

Noiembrie 2016

15. ALTE INFORMAȚII

Ambalaj de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 60, 90 sau 150 pipete.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Pfizer Romania SRL
Willbrook Platinum Business & Convention Center
Sos. București Ploiești, nr. 172-176, Corp B, etaj 5, sector 1,
013686, București
Tel: +40212072800
Fax: +40212072803