

[Version 8.1, 01/2017]

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Felimazole 2.5 mg comprimate filmate pentru pisici

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 comprimat conține:

Substanță activă:

Tiamazol	2.5 mg
----------	--------

Excipienți:

Dioxid de titan (E171)	1,12 mg
Eritrozină (E127)	0,01 mg
Parahidroxibenzoat de metil de sodiu (E219)	0,0034 mg

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate.

Comprimatele biconvexe acoperite cu zahăr roz, cu diametrul de 5,5 mm.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru stabilizarea hipertiroidiei la pisici înainte de tiroidectomie chirurgicală.

Pentru tratamentul de lungă durată al hipertiroidiei la feline.

4.3 Contraindicații

Nu se utilizează la pisici care suferă de boli sistémice cum ar fi boala hepatică primară sau diabetul zaharat.

Nu se utilizează la pisici care prezintă semne de boală autoimună.

Nu se utilizează la animale cu tulburări ale celulelor albe din sânge, cum ar fi neutropenia și limfopenia.

Nu se utilizează la animale cu tulburări plachetare și coagulopatii (în special trombocitopenie).

Nu se utilizează la pisici cu hipersensibilitate la tiamazol sau la excipientul polietilenglicol.

Nu se utilizează la femele gestante sau în lactație.

Vă rugăm consultați secțiunea 4.7.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Dacă sunt necesare mai mult de 10 mg pe zi, animalele trebuie monitorizate cu atenție.

Utilizarea produsului la pisici cu disfuncție renală trebuie supusă atenției la risc: evaluarea beneficiului de către medic. Datorită efectului pe care tiamazolul îl poate avea asupra reducerii vitezei de filtrare glomerulară, efectul terapiei asupra funcției renale trebuie monitorizat îndeaproape, deoarece poate să apară deteriorarea unei afecțiuni latente.

Hematologia trebuie monitorizată datorită riscului de leucopenie sau anemie hemolitică.

De la orice animal la care apare brusc o stare de rău în timpul tratamentului, în special dacă acestea sunt febrile, trebuie să se ia o probă de sânge pentru hematologie și biochimie de rutină. Animalele care prezintă neutropenie (număr de neutrofile $<2,5 \times 10^9/l$) trebuie tratate profilactic cu antibacteriene cu efect bactericid și terapie de susținere.

Deoarece tiamazolul poate provoca hemoconcentrație, pisicile trebuie să aibă tot timpul acces la apă potabilă.

Consultați secțiunea 4.9 pentru instrucțiuni de monitorizare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Spălați mâinile după utilizare.

În caz de ingestie accidentală, solicitați sfatul medicului imediat și arătați prospectul produsului sau eticheta.

Tiamazolul poate cauza vărsături, suferință epigastrică, céfalee, febră, artralgie, prurit și pancitopenie. Tratamentul este simptomatic.

Spălați mâinile cu săpun și apă după manipularea așternutului folosit de animalele tratate.

Nu mâncați, nu beți sau fumați în timpul manipulării comprimatului sau a așternutului utilizat.

Nu manipulați acest produs dacă sunteți alergic la produse antitiroïdiene. Dacă se dezvoltă simptome alergice, cum ar fi erupții cutanate, umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultăți de respirație, trebuie să urmați imediat îngrijire medicală și să prezentați medicului prospectul sau eticheta.

Nu se sparg sau nu se zdrobesc comprimatele.

Deoarece tiamazolul este suspectat ca terogen uman, femeile de vîrstă fertilă și femeile gravide trebuie să poarte mănuși atunci când manipulează așternutul pisicilor tratate.

Femeile gravide trebuie să poarte mănuși atunci când manipulează produsul.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Au fost raportate reacții adverse după controlul pe termen lung al hipertiroidismului. În multe cazuri, semnele pot fi ușoare și tranzitorii și nu reprezintă un motiv pentru intreruperea tratamentului.

Cele mai serioase efecte sunt în principal reversibile atunci când medicația este oprită.

Reacțiile adverse sunt mai puțin frecvente. Cele mai obișnuite efecte secundare clinice care sunt raportate includ vărsături, inapetență/anorexie, letargie, prurit sever și excoriații ale capului și gâtului, predispoziție la sângerare și icter asociat cu hepatopatie, și anomalii hematologice (eozinofilie, limfocitoză, neutropenie, limfopenie, ușoară leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie sau anemie hemolitică). Aceste efecte secundare se rezolvă în 7-45 zile după intreruperea terapiei cu tiamazol. Efectele secundare imunologice posibile includ anemie, cu efecte secundare rare care include trombocitopenie și anticorpi anti-nucleari în ser, și, foarte rar, limfadenopatie. Tratamentul trebuie opus imediat și considerată o terapie alternativă după o perioadă adecvată de recuperare.

După tratament pe termen lung cu tiamazol la rozătoare, s-a demonstrat că apare un risc crescut de neoplazie în glanda tiroidă, dar nu este disponibilă nici o dovdă la pisici.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Studiile de laborator la șobolani și șoareci au evidențiat efecte teratogene și embriotoxice ale tiamazolului. Siguranța produsului nu a fost evaluată la pisici gestante sau care alăptează. Nu se utilizează la femeile gestante sau în lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Tratamentul concomitant cu fenobarbital poate reduce eficacitatea clinică a tiamazolului.

Tiamazolul este cunoscut că reduce oxidarea hepatică a benzimidazolului pentru helminti și poate duce la creștere în concentrațiile lor plasmaticе când este dat concomitant.

Tiamazolul este imunomodulator, prin urmare, acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se au în vedere programele de vaccinare.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Numai pentru administrare orală.

Pentru stabilizarea hipertiroidismului la feline înainte de tiroidectomie chirurgicală și pentru tratamentul pe termen lung al hipertiroidismului la feline, doza inițială recomandată este de 5 mg pe zi. Ori de câte ori este posibil, doza zilnică totală trebuie divizată în două și administrată dimineață și seara. Comprimatele nu trebuie divizate.

Dacă, din motive de conformitate, este de preferat administrarea o dată pe zi a unui comprimat de 5 mg, atunci acest lucru este acceptabil, deși comprimantul de 2,5 mg administrat de două ori pe zi poate fi mai eficient pe termen scurt. Comprimantul de 5 mg este de asemenea adecvat pentru pisici necesitând proporții mai mari ale dozei.

Hematologia, biochimia și concentratia totala a T₄ din ser trebuie să fie evaluate înainte de inițierea tratamentului și după 3 săptămâni, 6 săptămâni, 10 săptămâni, 20 săptămâni, și după aceea la fiecare 3 luni. La fiecare dintre intervalele de monitorizare recomandate, doza trebuie stabilită în funcție de T₄ total și de răspunsul clinic la tratament. Ajustările dozei trebuie efectuate în trepte de 2,5 mg și scopul ar trebui să fie atingerea celei mai scăzute cantități de dozare.

Dacă sunt necesare mai mult de 10 mg pe zi, animalele trebuie monitorizate cu atenție.

Doza administrată nu trebuie să depășească 20 mg/zi.

Pentru tratament pe termen lung al hipertiroidiei, animalul trebuie să fie tratat toată viața.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

În studiile de toleranță la pisicile tinere sănătoase, au apărut următoarele simptome clinice asociate dozei, întâlnite la doze de până la 30 mg/animal/zi: anorexie, vărsături, letargie, prurit și anomalii hematologice și biochimice cum ar fi neutropenie, limfopenie, nivele serice scăzute ale potasiului și fosforului, nivele crescute ale magneziului și creatininei și apariția de anticorpi anti-nucleari. La o doză de 30 mg/zi unele pisici au prezentat simptome de anemie hemolitică și deteriorare clinică severă. Unele dintre aceste semne pot apărea, de asemenea, și la pisicile tratate cu doze de până la 20 mg pe zi.

Dozele crescute la pisici cu hipertiroidie pot avea ca rezultat simptome de hipotiroidie. Acest lucru este totuși improbabil, deoarece hipotiroidismul este de obicei corectat prin mecanisme de feedback negativ. Vă rugăm consultați secțiunea 4.6 Reacții adverse.

Dacă apare simptome de supradozare, se oprește tratamentul și se acordă asistență simptomatică și de susținere.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Preparate antitiroide: derivați de imidazol cu conținut de sulf.

Codul veterinar ATC: QH03BB02

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Tiamazolul acționează prin blocarea biosintezei hormonului tiroid in vivo. Acțiunea principală este de inhibare a legării iodurii la enzima tiroid peroxidază, prevenind astfel iodarea catalizată a tiroglobulinei și sinteza de T₃ și T₄.

5.2 Particularități farmacocinetice

După administrare orală la pisici sănătoase, tiamazolul este absorbit rapid și complet, cu o biodisponibilitate de >75%. Cu toate acestea, există o variație considerabilă între animale. Eliminarea medicamentului din plasmă, la pisică, este rapidă, cu un timp de înjumătărire de 3,5-4,0 ore. Nivelele plasmaticice maxime apar la aproximativ 1-2 ore după dozare. Cmax este de aproximativ 0,8 µg/ml. La şobolani s-a arătat că tiamazolul se leagă slab la proteinele plasmaticice (5%); 40% s-a legat la celulele roșii din sânge. Metabolismul tiamazolului la pisici nu a fost investigat, totuși, la şobolani, tiamazolul este metabolizat rapid în glanda tiroidă. Aproximativ 64% din doza administrată este eliminată în urină și numai 7,8% este excretată în fecale. Acest lucru este în contrast cu omul la care ficitul este important pentru degradarea metabolică a compusului. Timpul de rezidență al medicamentului în glanda tiroidă se presupune a fi mai lung decât în plasmă. De la om și şobolani se știe că medicamentul poate traversa placenta și se concentrează în glanda tiroidă fetală. Există, de asemenea, o viteză ridicată de transfer în laptele matern.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

Nucleul comprimatului:

Lactoză monohidrat

Povidonă

Glicolat de amidon sodiu

Stearat de magneziu

Inveliș:

Sucroză

Povidonă K30

Eritrozină

Macrogol 4000

Talc purificat

Ceară albă de albine

Ceară de carnauba

Şerlac

Dioxid de titan (E171)

Parahidroxibenzoat de metil de sodiu (E219)

6.2 Incompatibilități majore

Nu este cazul.

6.3 Perioadă de valabilitate

Flacon pentru comprimate: Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Blister: Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

Flacon pentru comprimate: A se păstra ambalajul bine închis pentru a se proteja de umiditate. A se păstra recipientul în ambalajul exterior.

Blister: Blisterele se păstrează în cutie de carton.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon pentru comprimate : Flacon de polipropilenă albă, cu capac alb din polietilenă de joasă densitate, care conține 100 de comprimate.

Blister: PVC/A clar transparent – blister de aluminiu. Blister benzi care conțin 25 de comprimate. Fiecare cutie din carton conține 4 blistere cu benzi.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinarne neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Dechra Limited
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2RW
Regatul Unit

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

180035

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

22.02.2018

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iulie 2018

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

ANEXA III

ETCHETARE ȘI PROSPECT

Annex A n. 3



A. ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE DIN CARTON PENTRU FLACON****1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Felimazole 2.5 mg
Comprimate filmate pentru pisici
Tiamazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

1 comprimat conține:
Substanță activă:
Tiamazol (metimazol) 2.5 mg
Excipienți:
Dioxid de titan (E171)
Eritrozină (E127)
Parahidroxibenzoat de metil de sodiu (E219)

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 comprimate.

5. SPECII ȚINTĂ

Pisici.

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru stabilizarea hipertiroidiei la pisici înainte de tiroidectomie chirurgicală.
Pentru tratamentul de lungă durată al hipertiroidiei la feline.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.
Numai pentru administrare orală.

8. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE**9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Avertizări pentru utilizator Femeile de vârstă fertilă și femeile însărcinate trebuie să poarte mănuși atunci când manipulează produsul sau așternutul pisicilor tratate. Pentru avertizări complete ale utilizatorului, vă rugăm citiți prospectul.

**10. DATA EXPIRĂRII**

EXP: {lună/an}

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

A se păstra ambalajul bine închis pentru a se proteja de lumină umiditate.

A se păstra recipientul în ambalajul exterior.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONE PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Dechra Limited
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2RW
Regatul Unit

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

180035

17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot: {număr}

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DIN CARTON PENTRU BLISTER

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Felimazole 2.5 mg
Comprimate filmate pentru pisici
Tiamazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

1 comprimat conține:
Substanță activă:
Tiamazol (metimazol) 2.5 mg
Excipienti:
Dioxid de titan (E171)
Eritrozină (E127)
Parahidroxibenzoat de metil de sodiu (E219)

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 comprimate.

5. SPECII ȚINTĂ

Pisici.

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru stabilizarea hipertiroidiei la pisici înainte de tiroidectomie chirurgicală.
Pentru tratamentul de lungă durată al hipertiroidiei la felină.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.
Numai pentru administrare orală.

8. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Avertizări pentru utilizator Femeile de vîrstă fertilă și femeile însărcinate trebuie să poarte mănuși atunci când manipulează produsul sau așternutul pisicilor tratate. Pentru avertizări complete ale utilizatorului, vă rugăm citiți prospectul.

**10. DATA EXPIRĂRII**

EXP: {lună/an}

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.
Blisterele se păstrează în cutie de carton.

**12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE
SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII
PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

„Numai pentru uz veterinar”
Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Dechra Limited
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2RW
Regatul Unit

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

180035

17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot: {număr}

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR

ETICHETA

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Felimazole 2.5 mg comprimate filmate pentru pisici
Tiamazol

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

I comprimat conține:

Substanță activă: Tiamazol (metimazol) 2.5 mg

Excipienți:

Dioxid de titan (E171); Eritrozină (E127); Parahidroxibenzoat de metil de sodiu (E219)

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

100 comprimate.

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Numai pentru administrare orală.

5. TEMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot: {număr}

7. DATA EXPIRĂRII

EXP: {lună/an}

8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

ALTE INFORMAȚII

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

[Deținătorul autorizației de comercializare] Dechra Limited, Regatul Unit

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII

BLISTER

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Felimazole 2.5 mg
Comprimate filmate pentru pisici
Tiamazol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Dechra Limited, Regatul Unit

3. DATA EXPIRĂRII

EXP: {lună/an}

4. NUMĂRUL SERIEI

Lot: {număr}

5. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

B.PROSPECT

PROSPECT

Felimazole 2.5 mg comprimate filmate pentru pisici

1. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Dechra Limited
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2RW
Regatul Unit

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Dales Pharmaceuticals Limited
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2RW
Regatul Unit

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Felimazole 2.5 mg comprimate filmate pentru pisici
Tiamazol (metimazol)

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDENȚI)

1 comprimat conține:
Substanță activă: Tiamazol (metimazol) 2.5 mg
Excipienți: Dioxid de titan (E171); Eritrozină (E127); Parahidroxibenzoat de metil de sodiu (E219)

Comprimatele biconvexe acoperite cu zahăr roz, cu diametrul de 5,5 mm.

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru stabilizarea hipertiroidiei la pisici înainte de tiroidectomie chirurgicală.
Pentru tratamentul de lungă durată al hipertiroidiei la feline.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la pisici care suferă de boli sistémice cum ar fi boala hepatică primară sau diabetul zaharat.
Nu se utilizează la pisici care prezintă semne de boală autoimună.
Nu se utilizează la animale cu tulburări ale celulelor albe din sânge, cum ar fi neutropenia și limfopenia.
Nu se utilizează la animale cu tulburări plachetare și coagulopatii (în special trombocitopenie).
Nu se utilizează la pisici cu hipersensibilitate la tiamazol sau la excipientul polietilenglicol.
Nu se utilizează la femele gestante sau în lactație.
Vă rugăm consultați atenționări speciale.

6. REACȚII ADVERSE

Au fost raportate reacții adverse după controlul pe termen lung al hipertiroidismului. În multe cazuri, semnele pot fi ușoare și tranzitorii și nu reprezintă un motiv pentru intreruperea tratamentului.

Cele mai serioase efecte sunt în principal reversibile atunci când medicația este oprită.

Reacțiile adverse sunt mai puțin frecvente. Cele mai obișnuite efecte secundare clinice care sunt raportate includ vârsături, inapetență/anorexie, letargie, prurit sever și excoriații ale capului și gâtului, predispoziție la săngerare și icter asociat cu hepatopatie, și anomalii hematologice (eozinofilie, limfocitoză, neutropenie, limfopenie, ușoară leucopenie, agranulocitoză, trombocitopenie sau anemie hemolitică). Aceste efecte secundare se rezolvă în 7-45 zile după intreruperea terapiei cu tiamazol. Efectele secundare imunologice posibile includ anemie, cu efecte secundare rare care include trombocitopenie și anticorpi anti-nucleari în ser, și, foarte rar, limfadenopatie. Tratamentul trebuie oprit imediat și considerată o terapie alternativă după o perioadă adecvată de recuperare.

După tratament pe termen lung cu tiamazol la rozătoare, s-a demonstrat că apare un risc crescut de neoplazie în glanda tiroidă, dar nu este disponibilă nici o dovdă la pisici.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII TINTĂ

Pisici.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Numai pentru administrare orală.

Pentru stabilizarea hipertiroidismului la felină înainte de tiroidectomie chirurgicală și pentru tratamentul pe termen lung al hipertiroidismului la felină, doza inițială recomandată este de 5 mg pe zi. Ori de câte ori este posibil, doza zilnică totală trebuie divizată în două și administrată dimineață și seara. Comprimatele nu trebuie divizate.

Dacă, din motive de conformitate, este de preferat administrarea o dată pe zi a unui comprimat de 5 mg, atunci acest lucru este acceptabil, deși comprimatul de 2,5 mg administrat de două ori pe zi poate fi mai eficient pe termen scurt. Comprimatul de 5 mg este de asemenea adecvat pentru pisici necesitând proporții mai mari ale dozei.

Hematologia, biochimia și concentrația totală a T₄ în ser trebuie să fie evaluate înainte de inițierea tratamentului și după 3 săptămâni, 6 săptămâni, 10 săptămâni, 20 săptămâni, și după aceea la fiecare 3 luni. La fiecare dintre intervalele de monitorizare recomandate, doza trebuie stabilită în funcție de T₄ total și de răspunsul clinic la tratament. Ajustările dozei trebuie efectuate în trepte de 2,5 mg și scopul ar trebui să fie atingerea celei mai scăzute cantități de dozare.

Dacă sunt necesare mai mult de 10 mg pe zi, animalele trebuie monitorizate cu atenție.

Doza administrată nu trebuie să depășească 20 mg/zi.

Pentru tratament pe termen lung al hipertiroidiei animalul trebuie să fie tratat toată viața.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Urmați instrucțiunile de dozare și calendarul vizitelor de urmărire recomandate de medicul veterinar.

10. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

A nu se utilizează acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă și cutie după EXP.

Flacon pentru comprimate: A se păstra ambalajul bine închis pentru a se proteja de umiditate. A se păstra recipientul în ambalajul exterior.

Blisterele: Blisterele se păstrează în cutie de carton.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precautii speciale pentru utilizare la animale:

Dacă sunt necesare mai mult de 10 mg pe zi, animalele trebuie monitorizate cu atenție.

Utilizarea produsului la pisici cu disfuncție renală trebuie supusă atenției la risc: evaluarea beneficiului de către medic. Datorită efectului pe care tiamazolul îl poate avea asupra reducerii vitezei de filtrare glomerulară, efectul terapiei asupra funcției renale trebuie monitorizat îndeaproape, deoarece poate să apară deteriorarea unei afecțiuni latente.

Hematologia trebuie monitorizată datorită riscului de leucopenie sau anemie hemolitică.

De la orice animal la care apare brusc o stare de rău în timpul tratamentului, în special dacă acestea sunt febrile, trebuie să se ia o probă de sânge pentru hematologie și biochimie de rutină.

Animalele care prezintă neutropenie (număr de neutrofile $<2,5 \times 10^9/l$) trebuie tratate profilactic cu antibacteriene cu efect bactericid și terapie de susținere.

Deoarece tiamazolul poate provoca hemoconcentrație, pisicile trebuie să aibă tot timpul acces la apă potabilă.

Precautii speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Spălați mâinile după utilizare.

În caz de ingestie accidentală, solicitați sfatul medicului imediat și arătați prospectul produsului sau eticheta.

Tiamazolul poate cauza vărsături, suferință epigastrică, céfalee, febră, artralgie, prurit și pancitopenie. Tratamentul este simptomatic.

Spălați mâinile cu săpun și apă după manipularea așternutului folosit de animalele tratate.

Nu mâncați, nu beți sau fumați în timpul manipulării comprimatului sau a așternutului utilizat.

Nu manipulați acest produs dacă sunteți alergic la produse antitiroïdiene. Dacă se dezvoltă simptome alergice, cum ar fi erupții cutanate, umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultăți de respirație, trebuie să urmați imediat îngrijire medicală și să prezentați medicului prospectul sau eticheta.

Nu se sparg sau nu se zdrobesc comprimatele.

Deoarece tiamazolul este suspectat ca teratogen uman, femeile de vîrstă fertilă și femeile gravide trebuie să poarte mănuși atunci când manipulează așternutul pisicilor tratate.

Femeile gravide trebuie să poarte mănuși atunci când manipulează produsul.

Gestătie și lactație:

Studiile de laborator la şobolani și şoareci au evidențiat efecte teratogene și embriotoxic ale tiamazolului. Siguranța produsului nu a fost evaluată la pisici gestante sau care alăptează. Nu se utilizează la femeile gestante sau în lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Tratamentul concomitant cu fenobarbital poate reduce eficacitatea clinică a tiamazolului.

Tiamazolul este cunoscut că reduce oxidarea hepatică a benzimidazolului pentru helminti și poate duce la creștere în concentrațiile lor plasmatici când este dat concomitant.

Tiamazolul este imunomodulator, prin urmare, acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se au în vedere programele de vaccinare.

Supradoxozare (simptome, proceduri de urgență, antidot):

În studiile de toleranță la pisicile tinere sănătoase, au apărut următoarele simptome clinice asociate dozei întâlnite la doze de până la 30 mg/animal/zi: anorexie, vărsături, letargie, prurit și anomalii hematologice și biochimice cum ar fi neutropenie, limfopenie, nivele serice scăzute ale potasiului și fosforului, nivele crescute ale magneziului și creatininei și apariția de anticorpi anti-nucleari. La o doză de 30 mg/zi unele pisici au prezentat simptome de anemie hemolitică și deteriorare clinică

severă. Unele dintre aceste simptome pot să apară, de asemenea, și la pisicile tratate cu doze de până la 20 mg pe zi.

Dozele crescute la pisici cu hipertiroïdie pot avea ca rezultat semne de hipotiroïdie. Acest lucru este totuși improbabil, deoarece hipotiroïdismul este de obicei corectat prin mecanisme de feedback negativ. Vă rugăm consultați secțiunea 4.6 Reacții adverse.

Dacă apar semne de supradoxozare, se oprește tratamentul și se acordă asistență simptomatică și de susținere.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Iulie 2018

15. ALTE INFORMAȚII

„Numai pentru uz veterinar”

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

Flacon cu 100 comprimate.

Blister cu 100 comprimate.

Nu toate dimensiunile de ambalaj sunt comercializate.