

## 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

FIPREX 75, 52,5 mg / pipetă, soluție spot on pentru pisici

## 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

O pipetă de 0,7 ml conține:

### Substanță activă:

Fipronil 52,5 mg / pipetă

### Excipienti:

Butilhidroxitoluen (E320)	2,1 mg
Butilhidroxianisol (E321)	2,1 mg

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

## 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot-on.

Soluție lșimpede de culoare galben deschis până la maro.

## 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

### 4.1 Specii țintă

Pisici.

### 4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

La pisici în tratamentul infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*), păduchi hematofagi (*Linognathus spp.*) și păduchi malofagi (*Trichodectes spp.*). Produsul manifestă un efect letal imediat împotriva puricilor; căpușele mor în 24-48 ore. Produsul conferă protecție împotriva reinfestării repetitive cu căpușe la pisici, timp de o lună de zile.

Fiprex poate fi utilizat auxiliar în tratamentul dermatitei alergice la purici.

### 4.3 Contraindicații

Nu se utilizează la puții de pisică cu vârstă sub 8 săptămâni și / sau care cântăresc mai puțin de 2 kg.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la compușii fenilpirazolului.

Nu se utilizează la animale bolnave sau în perioada de convalescență.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienti.

### 4.4 Atenționări speciale

Nu spălați animalele cu 2 zile înainte și 2 zile după aplicarea produsului.

Protejați ochii animalului de contactul direct cu produsul.

Nu permiteți ca animalele să se lingă pe blană după aplicarea produsului.

Toate pisicile din gospodărie vor fi tratate simultan.

### 4.5 Precauții speciale pentru utilizare

#### Precauții speciale pentru utilizare la animale



În cazul contactului produsului cu ochii – clătiți ochii cu multă apă.  
A nu se utiliza pe pielea lezionată.

#### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

La manipularea produsului purtați mănuși din cauciuc.

În cursul aplicării produsului a nu se consuma alimente, lichide sau fuma.

Spălați-vă pe mâini după aplicare.

Aerisiți camera unde s-a manipulat produsul.

Nu atingeți animalele până când produsul nu se usucă complet.

În cazul ingerării accidentale a produsului solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

#### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

Rareori, pot apărea efecte ca, decolorarea blănii, cădere locală a părului, congestie, prurit, aspect onctuos sau păr încâlcit.

În cazul în care animalul va linge zona unde s-a aplicat produsul, pot apărea simptome ca hipersalivăție, vomă și simptome nervoase (hipersensibilitate, defecare). Efectele adverse de obicei scad în intensitate după 24 ore.

În cazul apariției unor efecte adverse după aplicarea produsului sau observarea altor simptome nemenționate în acest prospect (inclusiv simptome apărute la oameni după contactul cu produsul medicinal), solicitați imediat sfatul medicului veterinar sau deținătorului autorizației de comercializare (prin distribuitorul din România).

#### **4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație**

Produsul poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

#### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Nu se cunosc.

#### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Produsul este destinat pentru uz extern și se aplică direct pe pielea animalului în zona cefei sau dorsal în zona omoplașilor.

O pipetă de 0,7 ml conține 52,5 fipronil pe pisică.

Deschideți pipeta îndepărând capacul acesteia. Se face o cărare în blana din zona omoplașilor și se aplică capătul pipetei direct pe suprafața pielii apoi se apasă pentru a se elibera conținutul.

#### **4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**


Riscul apariției unor efecte adverse (vezi punctul 4.6) poate crește în cazul supradozării produsului.

#### **4.11 Timp de așteptare**

Nu este cazul.

### **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

Grupa farmacoterapeutică; alte ectoparazitare pentru uz topic



Codul veterinar ATC: QP53AX15

### 5.1 Proprietăți farmacodinamice

Fipronilul, substanța activă a produsului, aparține blocantelor de canale de clor la nevertebrate, ele fiind reglate de GABA (acid gama-aminobutiric – unul dintre principalii neurotransmițatori inhibitori din sistemul nervos central). Datorita activității fipronilului apare inhibarea debitului ionilor de clor prin canalele de clor. Blocarea proceselor de inhibiție duce la provocarea unei excitări necontrolate determinând moartea insectelor și căpușelor.

### 5.2 Particularități farmacocinetice

Fipronilul este o substanță hidrofobă, care se dizolvă în stratul lipidic acoperind suprafața pielii. Prin deplasarea în stratul lipidic, fipronilul este distribuit în mod egal pe toata suprafața pielii, pătrunde în glandele sebacee de unde este eliberat treptat spre suprafața pielii.

### Proprietăți referitoare la mediul înconjurător

Fipronilul are efecte toxice asupra organismelor acvatice și albinelor, poate cauza schimbări de durată în mediul înconjurător.

## 6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

### 6.1 Lista excipientilor

Butilhidroxitoluen  
Butilhidroxianisol  
Izopropanol  
Povidonă  
Dieten glicol monoetyl eter

### 6.2 Incompatibilități majore

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

### 6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

### 6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.  
A se păstra în ambalajul original.  
A se păstra pipeta în cutia de carton.  
A se proteja de lumină.  
A se păstra în loc uscat.  
A se proteja de lumină solară directă.

### 6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Pipetă din polietilenă (LDPE 80% și HDPE 20%) x 0,7 ml, cu canulă din HDPE detașabilă în capăt.  
Cutie de carton cu 1, 3, și 12 pipete.



## **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinarne neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Produsul Fiprex 75 pentru pisici nu trebuie să ajungă în cursuri de apă deoarece este periculos pentru pești și alte organisme acvatice.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

Fipronilul are efecte toxice asupra organismelor acvatice și albinelor, poate cauza schimbări de durată în mediul înconjurător – poluarea lacurilor mici, cursul apelor, canalelor, trebuie evitată.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Multi-Trade Company VET - AGRO Sp. z o.o.

Gliniana 32, 20-616 Lublin, Polonia

Telefon + 48 81 445 23 00, fax + 48 81 445 23 20

## **8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

## **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**


Data primei autorizații: 05.07.2012

Data ultimei reînnoiri:

## **10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

## **INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE**

Nu este cazul.



**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie de carton pentru 1 pipetă x 0,7 ml, 3 pipete x 0,7 ml, 12 pipete x 0,7 ml****1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

FIPREX 75, 52,5 mg/pipetă, soluție spot on pentru pisici  
Fipronil

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE**

Fipronil 52,5 mg/pipetă

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Soluție spot-on.

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

1 pipetă x 0,7 ml  
3 pipete x 0,7 ml  
12 pipete x 0,7 ml

**5. SPECII ȚINTĂ**

Pisici.

**6. INDICAȚIE (INDICAȚII)**

La pisici în tratamentul infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*), păduchi hematofagi (*Linognathus spp.*) și păduchi malofagi (*Trichodectes spp.*). Produsul manifestă un efect letal imediat împotriva puricilor; căpușele mor în 24-48 ore. Produsul conferă protecție împotriva reinfestării repetitive cu căpușe la pisici, timp de o lună de zile.

Fiprex poate fi utilizat auxiliar în tratamentul dermatitei alergice la purici.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

**8. TEMP DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

**9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

La manipularea produsului purtați mănuși din cauciuc.

În cursul aplicării produsului a nu se consumă alimente, lichide sau sumă.



Spălați-vă pe mâini după aplicare.  
Aerisiți camera unde s-a manipulat produsul.  
Nu atingeți animalele până când produsul nu se usucă complet.

#### 10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

#### 11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.  
A se păstra în ambalajul original.  
A se păstra pipeta în cutia de carton.

#### 12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Evitați ca produsul Fiprex 75 pentru pisici să ajungă în cursuri de apă deoarece este periculos pentru pești și alte organisme acvatice.  
Fipronilul are efecte toxice asupra organismelor acvatice și albinelor, poate cauza schimbări de durată în mediul înconjurător – poluarea lacurilor mici, cursul apelor, canalelor, trebuie evitată.  
Eliminarea:citiți prospectul produsului.

#### 13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

#### 14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

#### 15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Multi-Trade Company VET - AGRO Sp. z o.o.  
Gliniana 32, 20-616 Lublin, Polonia  
Telefon + 48 81 445 23 00, fax + 48 81 445 23 20

#### 16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

#### 17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}



**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ**  
**PRIMAR**  
**Pipeta x 0,7 ml**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

FIPREX 75, 52,5mg/pipetă, soluție spot on pentru pisici  
Fipronil

**2. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

0,7 ml

**3. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE**


Spot-on

**4. NUMĂRUL SERIEI**

Lot{număr}

**5. DATA EXPIRĂRII**

EXP{lună/an}



## PROSPECT

FIPREX 75, 52,5 mg/pipetă, soluție spot on pentru pisici

### 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producător responsabil pentru eliberarea seriilor:

Multi-Trade Company VET - AGRO Sp. z o.o.  
Gliniana 32, 20-616 Lublin, Republica Polonia  
Telefon + 48 81 445 23 00, fax + 48 81 445 23 20

### 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

FIPREX 75, 52,5 mg/pipetă, soluție spot on pentru pisici  
Fipronil

### 3. DECLARAȚAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)

O pipetă de 0,7 ml conține:

**Substanță activă:**

Fipronil 52,5 mg / pipetă

**Excipienti:**

Butilhidroxitoluen (E320)	2,1 mg
Butilhidroxianisol (E321)	2,1 mg

### 4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

La pisici în tratamentul infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*), păduchi hematofagi (*Linognathus spp.*) și păduchi malofagi (*Trichodectes spp.*). Produsul manifestă un efect letal imediat împotriva puricilor; căpușele mor în 24-48 ore. Produsul conferă protecție împotriva reinfestării repetitive cu căpușe la pisici, timp de o lună de zile.

Fiprex poate fi utilizat auxiliar în tratamentul dermatitei alergice la purici.

### 5. CONTRAINDECAȚII

Nu se utilizează la puii de pisică cu vârstă sub 8 săptămâni și / sau care cântăresc mai puțin de 2 kg.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la compușii fenilpirazolului.

Nu se utilizează la animale bolnave sau în perioada de convalescență.


Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienti.

### 6. REACȚII ADVERSE

Rareori, pot apărea efecte ca, decolorarea blanii, cădere locală a părului, congestie, prurit, aspect onctuos sau păr încâlcit.

În cazul în care animalul va linge zona unde s-a aplicat produsul, pot apărea simptome ca hipersalivatie, vomă și simptome nervoase ( hipersensibilitate, defecare). Efectele adverse de obicei scad în intensitate după 24 ore.

În cazul apariției unor efecte adverse după aplicarea produsului sau observarea altor simptome nemenționate în acest prospect (inclusiv simptome apărute la oameni după contactul cu produsul medicinal), solicitați imediat sfatul medicului veterinar sau deținătorului autorizației de comercializare (prin distribuitorul din România).



- Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm informați medicul veterinar.

## 7. SPECII ȚINTĂ

Pisici.

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul este destinat pentru uz extern și se aplică direct pe pielea animalului în zona cefei sau dorsal în zona omoplașilor.

O pipetă de 0,7 ml / pisică.

Deschideți pipeta îndepărând capacul acesteia. Se face o cărare în blana din zona omoplașilor și se aplică capătul pipetei direct pe suprafața pielii apoi se apasă pentru a se elibera conținutul.

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu spălați animalele cu 2 zile înainte și 2 zile după aplicarea produsului.

Protejați ochii animalului de contactul direct cu produsul.

Nu permiteți ca animalele să se lingă pe blană după aplicarea produsului.

Toate pisicile din gospodărie vor fi tratate simultan.

## 10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra pipeta în cutia de carton.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumină solară directă.

A nu se utilizează acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă după EXP.

## 12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

### Precauții speciale pentru utilizare la animale

În cazul contactului produsului cu ochii – clătiți ochii cu multă apă.

A nu se utilizează pe pielea lezionată.

### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

La manipularea produsului purtați mănuși din cauciuc.

În cursul aplicării produsului a nu se consuma alimente, lichide sau fuma.

Spălați-vă pe mâini după aplicare.

Aerisați camera unde s-a manipulat produsul.

Nu atingeți animalele până când produsul nu se usucă complet.

În cazul ingerării accidentale a produsului solicitați imediat sfatul medicului și prezentați produsul sau eticheta.



**Gestație și lactație**

Produsul poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

**Supradoxozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)**

Riscul apariției unor efecte adverse (vezi punctul REACȚII ADVERSE) poate crește în cazul supradoxozării produsului.

**Incompatibilități majore**

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

**13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Produsul Fiprex 75 pentru pisici nu trebuie să ajungă în cursuri de apă deoarece este periculos pentru pești și alte organisme acvatice.

Fipronilul are efecte toxice asupra organismelor acvatice și albinelor, poate cauza schimbări de durată în mediul înconjurător – poluarea lacurilor mici, cursul apelor, canalelor, trebuie evitată.

**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL****15. ALTE INFORMAȚII****Mod de ambalare:**

Pipete din polietilenă (LDPE 80% și HDPE 20%) x 0,7 ml, cu canulă din HDPE detașabil.

Cutie de carton cu 1, 3 și 12 pipete.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

S.C. MARAVET S.A., strada Maravet nr.1, Baia Mare, Tel/Fax: 0262-211.964

