

## **I. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**FIPREX SPRAY**, 5 mg/ml, spray cutanat, soluție pentru câini și pisici

## **2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

1 ml soluție conține:

**Substanță activă:** Fipronil 5 mg

**Excipienti:**

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Spray cutanat, soluție.

Soluție limpă de culoare gălbuiie până la maroniu.

## **4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**

### **4.1 Specii țintă**

Câini și pisici.

### **4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă**

În tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*) la câini și pisici.

În tratamentul și prevenirea infestațiilor cu păduchi hematofagi la câini (*Trichodectes canis*) și la pisici (*Fenicola subrostratus*).

Produsul este eficient împotriva reinfestării cu purici timp de aproximativ 8 săptămâni și împotriva reinfestării cu căpușe timp de până la 4 săptămâni.

### **4.3 Contraindicații**

A nu se utiliza la animalele cu hipersensibilitate la substanță activă sau la oricare dintre excipienti.

A nu se utiliza la cățeii cu vârstă mai mică de 10 săptămâni de viață și la pisoi cu vârstă sub 12 săptămâni de viață și/sau care cântăresc mai puțin de 2 kg greutate corporală.

A nu se utiliza la animale bolnave (boli sistemice, febră, etc.) sau în convalescență.

A nu se utiliza la iepuri, deoarece pot să apară reacții adverse și chiar moartea.

### **4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă**

A nu se permite animalelor să lingă locul de aplicare câteva ore după tratament.

A nu se aplică la animale care au leziuni sau răni ale pielii.

Sporadic se pot ataşa căpușe. Din acest motiv, transmiterea de boli infecțioase nu poate fi complet exclusă în cazul în care condițiile sunt nefavorabile.

Se recomandă aplicarea tratamentului la toate pisicile și la toți câinii din gospodărie.

Câinilor nu ar trebui să li se permită să înnoate în cursurile de apă timp de 2 zile înainte și după aplicare.

Nu este recomandată îmbăierea sau şamponarea frecventă a animalului înainte de tratament, deoarece eficacitatea produsului în aceste cazuri nu a fost testată.

Puricii câinilor și pisicilor infestează de asemenea și coșul sau locurile în care animalele dorm sau se odihnesc (carpete, mobilier). Aceste locuri ar trebui să fie în mod regulat tratate cu insecticiduri adecvate și curățate cu ajutorul unui aspirator.



## **4.5 Precauții speciale pentru utilizare**

### **Precauții speciale pentru utilizare la animale**

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă în care animalul nu se poate linge. Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă unele pe celelalte după tratament.

Evitați contactul produsului cu ochii animalului.

### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Aplicați produsul cu mănuși de protecție din cauciuc.

Evitați contactul accidental al conținutului cu mâinile. Dacă se întâmplă acest lucru, se spală mâinile cu săpun și apă. Spălați-vă mâinile după utilizare.

Contactul accidental al produsului cu gura și cu ochii trebuie evitat. În cazul contactului accidental cu ochii, clătiți imediat ochii cu apă din abundență. Dacă iritația ochilor persistă solicitați imediat sfatul medicului și prezentați acestuia prospectul sau eticheta produsului. În caz de ingestie accidentală de produs solicitați imediat sfatul medicului.

A nu se fuma, consuma lichide sau alimente în timpul aplicării produsului.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau la excipienti trebuie să evite contactul cu acest produs medicinal veterinar.

Pulverizați animalele în aer liber sau într-o cameră bine ventilată.

Animalele tratate nu trebuie să fie manipulate până când locul de aplicare este complet uscat, iar copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până când locul de aplicare nu este complet uscat. Prin urmare, este recomandat ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, ele vor fi tratate seara devreme și nu li se va permite să doarmă cu proprietarii lor, în special cu copiii.

## **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

În cazul în care animalul linge locul de aplicare se poate observa salivărie excesivă.

În cazuri rare au fost raportate vomă, simptome neurologice (hipersensibilitate sau letargie), cădere locală a părului, iritație, prurit sau aspectul uleios al părului. Reacțiile adverse, de obicei, dispar după 24 de ore.

## **4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație**

Studiile efectuate pe animale de laborator nu au produs nici o dovadă referitoare la efecte teratogene sau embriotoxică.

Nu au fost efectuate studii pe cătele gestante sau în lactație utilizând acest produs medicinal veterinar.

Prin urmare, utilizarea sa în timpul gestației și lactației la cătele ar trebui să fie efectuată numai după o analiză beneficiu-risc realizată de către medicul veterinar.

## **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune**

Nu există date disponibile.

## **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Calea de administrare: prin pulverizare



Mod de administrare: Reglați duza pompei pentru pulverizare poziția ON. Pulverizați animalul pe întreg corpul prin aplicare de la o distanță de aproximativ 10-20 cm.  
Se aplică în sensul invers creșterii firelor de păr. Asigurați-vă că toată blana animalului este umezită. Blana se va căzuți, în special la animalele cu păr lung, deoarece produsul trebuie să pătrunde până la piele.

Pentru tratamentul regiunii capului și atunci când se tratează animalele de companie tinere sau cu comportament nervos, aplicarea poate fi efectuată prin pulverizare utilizând pe mână o mănușă cu ajutorul căreia se fricționează produsul pe blană. Se lasă să se usuce natural. Nu se usucă cu prosopul. După aplicare, răsuciți capacul de la pulverizator în poziția OFF.

#### Dozare:

Produsul se aplică pe piele în doză de 1,5-3 ml pe kg greutate corporală (1-2 pulverizări/kg greutate corporala din flaconul de 250 ml și 3-6 pulverizări/kg greutate corporală din flaconul de 100 ml), echivalent cu 7,5 - 15 mg fipronil pe kg greutate corporală.

Produsul conține un agent de acoperire. Așadar, prin pulverizare se formează o peliculă care face blana lucioasă.

Pentru cele mai bune rezultate, intervalul minim între tratamente este de 4 săptămâni.

#### 4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), dacă este necesar

Riscul de apariție a reacțiilor adverse (vezi secțiunea 4.6) poate fi mai mare în caz de supradozare. Supradozarea poate provoca contractii musculare și convulsii. În câteva cazuri au apărut, agitație, somnolență și hipersensibilitate la zgomot și lumină. De asemenea au fost observate, vertig temporar, salivărie excesivă și vârsături. La locul de aplicare al produsului pot să apară, înroșire temporară sau iritații ale pielii. Toate simptomele dispar, de obicei, în decurs de 24 de ore. Pentru a reduce intensitatea lor, un tratament simptomatic poate fi utilizat.

Urmărind instrucțiunile producătorului și avertismentele, se vor reduce la minim posibilitățile de apariție a reacțiilor adverse.

#### 4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

### 5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Alte ectoparaziticide pentru utilizare topicală.

Codul veterinar ATC: QP53AX15

#### 5.1 Proprietăți farmacodinamice

Fipronil, substanță activă a produsului, blochează fluxul de cloruri la nevertebrate în celulele nervoase, care este controlat prin receptorii GABA (acid gamaaminobutiric) - neurotransmițatorul inhibitor principal în sistemul nervos central. Ca rezultat al activității fipronilului, fluxul de ioni de clorură prin intermediul canalelor de clorură este blocat. Blocarea proceselor de inhibiție duce la apariția de excitații necontrolate care cauzează moartea imediată a insectelor și acarienilor.

Fipronil este letal pentru purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Ixodes spp.* inclusiv *Ixodes ricinus*, *Dermacentor spp.* și *Rhipicephalus spp.*), păduchi hematofagi (*Felicola subrostratus* și *Trichodectes canis*).



## 5.2 Particularități farmacocinetice

Fipronil este o substanță hidrofobă care este dizolvată în stratul lipidic care acoperă pielea. Datorită translocație în stratul lipidic, fipronilul este răspândit în mod egal pe toata suprafața pielii, pătrunzând în glandele sebacee de unde este secretat treptat la suprafața epidermei.

Acest produs medicinal veterinar se distribuie în 48 de ore pe toată pielea animalului.

Absorbția de fipronil după aplicarea topică la câini este neglijabilă.

Concentrația de fipronil pe blană scade în timp.

## 6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

### 6.1 Lista excipientilor

Dietilenglicol monoetileter, povidonă, alcool izopropilic

### 6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

### 6.3 Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

### 6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumina solară directă.

Acest produs este foarte inflamabil. A se feri de căldură, scânteie, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.

### 6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Ambalaj primar:

Flacon de 100 ml din polietilenă de înaltă densitate cu o pompă pentru pulverizare ce eliberează un volum de 0,5 ml la o pulverizare.

Flacon de 250 ml din polietilenă de înaltă densitate cu o pompă pentru pulverizare ce eliberează un volum de 1,5 ml la o pulverizare.

Ambalaj secundar:

Cutie de carton x 1 flacon x 100 ml; x 1 flacon x 250 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

### 6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Nu se vor contamina lacurile, râurile sau sistemele de canalizare cu produsul sau flaconul gol.

Câinilor nu ar trebui să li se permită să înoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare. Fipronil poate afecta negativ organisme acvatice.

Fipronil este toxic pentru albine și organisme acvatice. El poate avea un impact pe termen lung asupra mediului înconjurător. Orice contaminare a lacurilor, râurilor, canalelor, etc. ar trebui evitat.



**7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. Z o.o.  
Str. Gliniana nr 32, 20-616 Lublin, Polonia  
Tel. +48 814452305, fax +48 814452320

**8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

**9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

07.03.2007

**10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

**INTERDICTII PENTRU VANZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE**

Nu este cazul.



**INFORMATII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR**

Flacon de 100 ml din polietilenă de înaltă densitate

Flacon de 250 ml din polietilenă de înaltă densitate

**INFORMATII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie de carton x 1 flacon x 100 ml; x 1 flacon x 250 ml

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR****FIPREX SPRAY**, 5 mg/ml, spray cutanat, soluție pentru câini și pisici

Fipronil

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE**

Substanță activă: fipronil 5 mg/ml

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Spray cutanat, soluție

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

100 ml

250 ml

Cutie de carton x 1 flacon x 100 ml;

Cutie de carton x 1 flacon x 250 ml

**5. SPECII ȚINTĂ**

Câini, pisici.

**6. INDICAȚIE (INDICAȚII)**În tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*) la câini și pisici.În tratamentul și prevenirea infestațiilor cu păduchi hematofagi la câini (*Trichodectes canis*) și la pisici (*Fenicola subrostratus*).

Produsul este eficient împotriva reinfestării cu purici timp de aproximativ 8 săptămâni și împotriva reinfestării cu căpușe timp de până la 4 săptămâni.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

**8. TEMPORALITATE**

Nu este cazul.

**9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

**10. DATA EXPIRĂRII**

EXP: {lună / an}

**11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

- A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumina solară directă.
- Acest produs este foarte inflamabil. A se ţări de căldură, scânteie, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.



## **12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unui astfel de produs, ar trebui să fie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Nu se vor contamina lacurile, râurile sau sistemele de canalizare cu produsul sau flaconul gol.

Câinilor nu ar trebui să li se permită să înoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare. Fipronil poate afecta negativ organisme acvatice.

Fipronil este toxic pentru albine și organisme acvatice. El poate avea un impact pe termen lung asupra mediului înconjurător. Orice contaminare a lacurilor, râurilor, canalelor, etc. ar trebui evitată.

## **13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz**

Numai pentru uz veterinar.

## **14. MENTIUNEA "A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR"**

A nu se lăsa la vederea și îndemână copiilor.

## **15. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. Z o.o.  
Str. Gliniana nr 32, 20-616 Lublin, Polonia.  
Tel. + 48 814452305, fax +48 814452320

## **16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

## **17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

Lot: {număr}



**PROSPECTUL**

**FIPREX SPRAY, 5 mg/ml, spray cutanat, soluție pentru câini și pisici.**

**I. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE  
ȘI A DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE, RESPONSABIL PENTRU  
ELIBERAREA SERIEI, DACĂ SUNT DIFERITE**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. Z o.o.  
Str. Gliniana nr. 32, 20-616. Lublin, Polonia  
Tel. + 48 814452305, fax +48 814452320

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**FIPREX SPRAY, 5 mg/ml, spray cutanat, soluție pentru câini și pisici.**  
Fipronil

**3. DECLARAREA SUBSTANȚEI (LOR) ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (I)**

Substanță activă: Fipronil 5 mg/ml

**4. INDICAȚIE (I)**

În tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*) la câini și pisici.

În tratamentul și prevenirea infestațiilor cu păduchi hematofagi la câini (*Trichodectes canis*) și la pisici (*Fenicola subrostratus*).

Produsul este eficient împotriva reinfestării cu purici timp de aproximativ 8 săptămâni și împotriva reinfestării cu căpușe timp de până la 4 săptămâni.

**5. CONTRAINDICAȚII**

A nu se utiliza la animalele cu hipersensibilitate la substanță activă sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza la cățeii cu vârstă mai mică de 10 săptămâni de viață și la pisoi cu vârstă sub 12 săptămâni de viață și/sau care cântăresc mai puțin de 2 kg greutate corporală.

A nu se utiliza la animale bolnave (boli sistemice, febră, etc.) sau în convalescență.

A nu se utiliza pe iepuri, deoarece pot să apară reacții adverse și chiar moartea.

**6. REACȚII ADVERSE**

În cazul în care animalul linge locul de aplicare se poate observa salivărie excesivă.

În cazuri rare au fost raportate vomă, simptome neurologice (hipersensibilitate sau letargie), cădere locală a părului, iritație, prurit sau aspectul uleios al părului. Reacțiile adverse, de obicei, dispar după 24 de ore.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

**7. SPECII ȚINTĂ**

Câini și pisici

**8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) ȘI MOD DE  
ADMINISTRARE**

Calea de administrare: prin pulverizare

Metoda de administrare: Reglați duza pompei pentru pulverizare poziția ON. Pulverizați animalul întreg corpul prin aplicare de la o distanță de aproximativ 10-20 cm.



Se aplica în sensul invers creșterii firelor de păr. Asigurați-vă că toată blana animalului este umezită.  
• Blana se va ciufuli, în special la animalele cu păr lung, deoarece produsul trebuie să pătrunde până la piele.

Pentru tratamentul regiunii capului și atunci când se tratează animalele de companie tinere sau cu comportament nervos, aplicarea poate fi efectuată prin pulverizare utilizând pe mână o mănușă cu ajutorul căreia se fricționează produsul pe blană. Se lasă să se usucre natural. Nu se usucre cu prosopul. După aplicare, răsuciți capacul de la pulverizator în poziția OFF.

#### Dozare:

Produsul se aplică pe piele în doză de 1,5-3 ml pe kg greutate corporală (1-2 pulverizări/kg greutate corporală din flaconul de 250 ml și 3-6 pulverizări/kg greutate corporală din flaconul de 100 ml), echivalent cu 7,5 - 15 mg fipronil pe kg greutate corporală.

Produsul conține un agent de acoperire. Așadar, prin pulverizare se formează o peliculă care face blana lucioasă.

### 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru cele mai bune rezultate, intervalul minim între tratamente este de 4 săptămâni.

### 10. TEMPORALITATEA TRATAMENTULUI

Nu este cazul.

### 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumina solară directă.

A nu se utilizează după data de expirare (EXP), înscrisă pe etichetă.

Acest produs este foarte inflamabil. A se feri de căldură, scânteie, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.

### 12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

#### Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

A nu se permite animalelor să lingă locul de aplicare câteva ore după tratament.

A nu se aplică la animale care au leziuni sau răni ale pielii.

Sporadic se pot ataşa căpușe. Din acest motiv, transmiterea de boli infecțioase nu poate fi complet exclusă în cazul în care condițiile sunt nefavorabile.

Se recomandă aplicarea tratamentului la toate pisicile și la toți cainii din gospodărie.

Cainilor nu ar trebui să li se permită să însoțească în cursurile de apă timp de 2 zile înainte și după aplicare.

Nu este recomandată îmbăierea sau şamponarea frecventă a animalului înainte de tratament, deoarece eficacitatea produsului în aceste cazuri nu a fost testată.

Puricii cainilor și pisicilor infestează de asemenea și coșul sau locurile în care animalele dorm sau se odihnesc (carpete, mobilier). Aceste locuri ar trebui să fie în mod regulat tratate cu insecticide adecvate și curățate cu ajutorul unui aspirator.

#### Precauții speciale pentru utilizare la animale

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă în care animalul nu se poate linge.

Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă unele pe celelalte după tratament.

Evitați contactul produsului cu ochii animalului.

#### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Aplicați produsul cu mănuși de protecție din cauciuc.



Evitați contactul accidental al conținutului cu mâinile. Dacă se întâmplă acest lucru, se spală ~~mâinile~~  
cu săpun și apă. Spălați-vă mâinile după utilizare.

Contactul accidental al produsului cu gura și cu ochii trebuie evitat. În cazul contactului accidental cu ochii, clătiți imediat ochii cu apă din abundență. Dacă iritația ochilor persistă solicitați imediat sfatul medicului și prezentați acestuia prospectul sau eticheta produsului. În caz de ingestie accidentală de produs solicitați imediat sfatul medicului.

A nu se fuma, consuma lichide sau alimente în timpul aplicării produsului.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau la excipienți trebuie să evite contactul cu acest produs medicinal veterinar.

Pulverizați animalele în aer liber sau într-o cameră bine ventilată.

Animalele tratate nu trebuie să fie manipulate până când locul de aplicare este complet uscat, iar copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până când locul de aplicare nu este complet uscat. Prin urmare, este recomandat ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, ele vor fi tratate seara devreme și nu li se va permite să doarmă cu proprietarii lor, în special cu copiii.

#### **Utilizare în perioada de gestație, lactație**

Studiile efectuate pe animale de laborator nu au produs nici o dovadă referitoare la efecte teratogene sau embriotoxice.

Nu au fost efectuate studii pe cățele gestante sau în lactație utilizând acest produs medicinal veterinar. Prin urmare, utilizarea sa în timpul gestației și lactației la cățele ar trebui să fie efectuată numai după o analiză beneficiu-risc realizată de către medicul veterinar.

#### **Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), dacă este necesar**

Riscul de apariție a reacțiilor adverse (vezi secțiunea 6) poate fi mai mare în caz de supradozare.

Supradozarea poate provoca contracții musculare și convulsii. În câteva cazuri au apărut, agitație, somnolență și hipersensibilitate la zgromot și lumină. De asemenea au fost observate, vertig temporar, salivărie excesivă și vârsături. La locul de aplicare al produsului pot să apară, înrăosire temporară sau iritații ale pielii. Toate simptomele dispar, de obicei, în decurs de 24 de ore. Pentru a reduce intensitatea lor, un tratament simptomatic poate fi utilizat.

Urmărind instrucțiunile producătorului și avertismentele, se vor reduce la minim posibilitățile de apariție a reacțiilor adverse.

### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Orice produs neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unui astfel de produs, ar trebui să fie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Nu se vor contamina lacurile, râurile sau sistemele de canalizare cu produsul sau flaconul gol.

Câinilor nu ar trebui să li se permită să înoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare. Fipronil poate afecta negativ organismele acvatice.

Fipronil este toxic pentru albine și organismele acvatice. El poate avea un impact pe termen lung asupra mediului înconjurător - Orice contaminare a lacurilor, râurilor, canalelor, etc. ar trebui evitat.

### **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**



## **15. ALTE INFORMAȚII**

### **Ambalaj primar:**

Flacon de 100 ml din polietilenă de înaltă densitate cu o pompă pentru pulverizare ce eliberează un volum de 0,5 ml la o pulverizare.

Flacon de 250 ml din polietilenă de înaltă densitate cu o pompă pentru pulverizare ce eliberează un volum de 1,5 ml la o pulverizare.

### **Ambalaj secundar:**

Cutie de carton x 1 flacon x 100 ml; x 1 flacon x 250 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare:

S. C. MARAVET S.A.  
430016 Baia Mare,  
Str. Maravet nr.1,  
Tel/Fax: +40 262 211 964,  
e-mail: [office@maravet.com](mailto:office@maravet.com)

