

**ANEXA I**  
**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**

## **1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 268 mg Soluție spot On pentru câini de talie mare

## **2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

1 pipetă de 2,68 ml conține:

### **Substanță activă:**

Fipronil ..... 268,0 mg

### **Excipienti:**

Butilhidroxianisol (E320).....	0,536 mg
Butilhidroxitoluen (E321).....	0,268 mg
Alcool benzilic (E1519).....	763,800 mg

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Soluție spot-on

Soluție incoloră spre gălbui

## **4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**

### **4.1 Specii țintă**

Câini.

### **4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă**

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides canis*) la câini. Durata protecției împotriva infestațiilor cu purici este de 5 săptămâni.

Produsul protejează câinii împotriva infestațiilor noi cu căpușe (*Dermatocentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) între 7 și 28 zile de la data aplicării produsului.

Acest produs este potrivit pentru câini cu greutatea corporala între 20 și 40 kg și câini cu greutatea corporala de peste 60 kg (vezi secțiunea 4.9).

### **4.3 Contraindicații**

Nu se utilizează la câinii cu o vîrstă mai mică de 8 săptămâni și/sau cu o greutate corporală mai mică de 2 kg.

Nu se utilizează în cazuri de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienti.

Nu se utilizează la animale bolnave (ex. boli sistemică, febră) sau la cele aflate în convalescență.

Nu se utilizează la iepuri, ca urmare a reacțiilor adverse și chiar le poate provoca moarte.

Nu se utilizează la pisici, acest lucru ar putea duce la supradozare.

#### **4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă**

Pentru un control optim al infestațiilor cu purici în gospodăriile cu multe animale de companie, toți câinii și pisicile trebuie să fie tratate cu un insecticid adecvat.

Puricii animalelor de companie infestează adesea coșul animalelor, locurile unde animalele dorm și se odihnesc, precum covoare și mobilier moale, care trebuie să fie tratate în mod regulat cu insecticide adecvate și curățate cu ajutorul unui aspirator, în cazul infestațiilor masive sau în momentul începerii aplicării măsurilor de control.

Nu se cunosc informații cu privire la efectul pe care îl are îmbăierea/șamponarea asupra eficacității la câini. Șamponarea anterioară sau prea frecventă după tratament poate reduce eficacitatea produsului (vezi de asemenea secțiunea 6.6).

Produsul nu previne atașarea căpușelor de animal. În plus, eficacitatea împotriva căpușelor deja existente nu a fost demonstrată. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecțioase nu poate fi exclusă.

Este cunoscut că produsul protejează împotriva infestațiilor cu noi căpușe între 7-28 zile de la data aplicării produsului. Totuși, nu este cunoscut dacă eficiența împotriva infestării cu căpușe persistă și peste 4 săptămâni. De aceea pot să apară perioade neacoperite de protecție împotriva infestațiilor după aplicarea produsului, chiar dacă acesta este aplicat la un interval de minim 4 săptămâni.

#### **4.5 Precauții speciale pentru utilizare**

##### Precauții speciale pentru utilizare la animale

Numai pentru uz extern. Nu aplicați acest produs pe pielea cu răni sau leziuni.

Evitați contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență.

Animalele trebuie să fie cântărite cu precizie înainte de începerea tratamentului (vezi secțiunea 4.3).

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă a corpului la care animalul nu poate ajunge să se lingă și că animalele nu se pot linge unele pe altele după tratament.

Nu se cunosc informații cu privire la toxicitatea potentială a produsului asupra cățeilor mai mici de 8 săptămâni ce intră în contact cu cățeaua căreia îl s-a aplicat tratamentul. Trebuie acordată o atenție specială în acest caz.

##### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Păstrați pipetele în ambalajul original până în momentul utilizării.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau oricare dintre excipienti (vezi secțiunea 6.1), trebuie să evite contactul cu produsul. Evitați contactul conținutului cu degetele. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați mâinile cu apă și săpun.

Acest produs poate provoca iritarea mucoasei sau a ochilor. Prin urmare, trebuie evitat contactul produsului cu gura sau ochii.

După expunerea oculară accidentală, spălați ochii din abundență cu apă curată.

Ingerarea produsului este nocivă. Nu lăsați pipetele la îndemâna copiilor și eliminați imediat pipetele utilizate după aplicarea produsului.

Animalele tratate nu trebuie să fie manipulate până ce locul de aplicare al produsului nu s-a uscat, iar copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până ce locul de aplicare nu s-a uscat. Prin urmare, se recomandă să nu se aplice tratamentul în timpul zilei, ci la începutul serii, iar animalelor tratate recent nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii lor, mai ales cu copii.

Nu fumați, nu consumați băuturi și nu mâncati în timpul aplicării.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

#### Alte precautii

Câinilor nu trebuie să li se permită să înnoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare.  
Produsul poate afecta suprafetele vopsite, lăcuite sau alte tipuri de suprafete din gospodărie sau mobilierul.

#### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

În cazul în care câinele s-a lins, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivăție, datorată în principal naturii excipientilor.

Printre reacțiile adverse asteptate extrem de rar, după utilizare se pot observa: reacții cutanate tranzitorii în locul aplicării (decolorarea pielii, alopecia locală, prurit, eritem) și prurit general sau alopecia. În mod excepțional, au fost observate după utilizare urmatoarele: hipersalivăția, semne neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, semne nervoase), vomă sau semne respiratorii.

Evitați supradozarea. Riscul apariției de efecte adverse poate crește în caz de supradozare.

#### **4.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație**

Studiile de laborator privind utilizarea de fipronil au demonstrat că acesta nu produce efecte teratogene sau fetotoxice. În absența studiilor cu privire la evaluarea siguranței acestui produs pentru animalele gestante sau în lactație, a se utiliza numai în conformitate cu evaluarea raportului beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar. Dacă animalele sunt tratate în timpul perioadei de lactație, vezi secțiunea 4.5 (i).

#### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Nu utilizați produsul simultan cu alte produse antiparazitare care se aplică direct pe animal.

#### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Asigurați-vă că utilizați produsul corect, corespunzător greutății corporale a câinelui dumneavoastră.

Calea de administrare – Prin aplicare topica pe piele. Numai pentru uz extern.

Dozare:

- 1 pipetă de 2,68 ml pentru un câine cu o greutate corporala de peste 20 kg și pana la 40 kg greutate corporala.  
Proportia de dozare este de 6,7 – 13,4 mg fipronil/kg greutate corporală.
- 2 pipete de 2,68 ml pentru un caine cu o greutate corporala de peste 60 kg.  
Proportia de dozare este de până la 8,9 mg fipronil/kg greutate corporală.

Metoda de administrare - Utilizați colțurile ușor de dezlipit pentru a scoate pipeta din blister. Nu întepăti folia cu foarfeca, cuțite sau alte instrumente ascuțite, deoarece aceasta ar putea deteriora pipeta din interior.

Tineți pipeta în poziție verticală. Loviți ușor capătul îngust al pipetei pentru a vă asigura că întreg conținutul se află în corpul pipetei. Tăiați vârful pipetei cu o foarfecă.

Faceți loc în părul câinelui, între umeri și baza capului, până când pielea devine vizibila. Puneți vârful pipetei pe piele și aplicați ușor câte jumătate din conținut în cele două locuri de aplicare.

Evitați aplicarea soluției pe blană și nu frecăți pielea.

Ar trebui să aveți grija pentru a evita umezirea excesivă a părului cu produsul, acest lucru provocând un aspect lipicios al părului la locul de tratament. Cu toate acestea, în cazul în care apare acest lucru, va dispărea de obicei, în termen de 24-48 ore de la aplicare.

În absența studiilor privind siguranța intervalul minim dintre tratamente este de 4 săptămâni.

#### **4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Nu au fost demonstreate efecte adverse în urma studiilor de toleranță efectuate la căței de până la 8 săptămâni, căței în perioada de creștere și la câini cu greutatea corporală de aproximativ 2 kg, care au fost tratați cu doze de până la 5 ori doza recomandată. Riscul apariției de efecte adverse poate însă să crească odată cu supradozarea. Prin urmare, este recomandat să tratați întotdeauna animalele cu pipeta de mărime corespunzătoare.

#### **4.11 Timp de așteptare**

Nu este cazul.

### **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

**Grupa farmacoterapeutică:** Ectoparaziticide pentru uz local, inclusiv insecticide

**Codul veterinar ATC:** QP53AX15

#### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Fipronilul este un insecticid/acaricid din familia fenilpirazolului. El acționează prin inhibarea complexului GABA, prin legarea la canalul ionilor de clor și astfel are loc blocarea transferului pre- și post-sinaptic al ionilor de clor prin membrană. Aceste rezultate conduc la o activitate necontrolată a sistemului nervos central și la moartea insectelor și acarienilor.

#### **5.2 Particularități farmacocinetice**

La câine, după aplicarea locală a produsului, absorbția fipronilului prin piele se face ușor. Un nivel scăzut de fipronil poate fi depistat în plasmă, cu o variabilitate foarte mare între indivizi. După aplicarea topică, produsul se extinde de la locul de aplicare spre întreaga suprafață a animalului. Un gradient de concentrație de fipronil se găsește pe blana animalului, extinzându-se de la locul aplicării spre zonele periferice (zonele lombare, flancuri,...).

Fipronilul este metabolizat în principal în derivați sulfonați (RM1602), care de asemenea au proprietăți insecticide și acaricide.

Concentrația de fipronil din păr scade cu timpul.

#### **5.3 Proprietăți referitoare la mediul înconjurător**

Produsul poate afecta negativ organismele acvatice.

### **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

#### **6.1 Lista excipientilor**

Butilhidroxianisol (E320)  
Butilhidroxitoluen (E321)  
Alcool benzilic (E1519)  
Dietilen glicol monoetyl eter.

#### **6.2 Incompatibilități majore**

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

### **6.3 Perioadă de valabilitate**

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: a se utiliza imediat.

### **6.4. Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

Păstrați pipeta în blister și în cutie până în momentul utilizării, pentru a fi protejată de lumină.

### **6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**

O pipetă de culoare albastră este compusă dintr-un înveliș sudat termic (polipropilena și copolimer acrilonitril metil acrilat/copolimer olefina ciclica și polipropilena/polipropilena) și un film (copolimer acrilonitril metil acrilat/ aluminiu/poliester).

1, 2, 3, 6 pipete sunt ambalate intr-o cutie de carton.

Sau

O pipetă de culoare albastră este compusă dintr-un înveliș sudat termic (polipropilenă /copolimer olefină ciclică/copolimer etilen vinil alcool/polipropilenă) și un film (tereftalat de polietilenă/ aluminiu/polipropilenă).

Pipeta albastră este protejată într-un blister de aluminiu (polietilenă/poliamidă/aluminiu/poliamidă/polietilenă și poliamidă/aluminiu/polietilenă).

1, 2, 3, 4, 6 pipete sunt ambalate intr-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

### **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Fipronilul poate afecta negativ organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, râurile sau canalele cu aceste produse sau cu ambalajele lor goale.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Beaphar B.V.  
Str. Drostenkamp, nr. 3  
8101 BX, loc. Raalte  
Olanda

## **8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE** 150084

## **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

Data primei autorizări: 11.03.2015

## **10 DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

Martie 2018

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE  
Nu este cazul





**ANEXA III**  
**ETICHETARE ȘI PROSPECT**

**A. ETICHETARE**

**INFORMATII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR [****Cutie de carton (folie PP/ALU și prospect inclus)****1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 268 mg Soluție spot On pentru câini de talie mare  
Fipronil

**2. DECLARAAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE**

**Substanță activă:**  
Fipronil ..... 268,0 mg

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Soluție Spot-on

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

1x 2,68 ml

**5. SPECII TINTĂ**

Câini

**6. INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides canis*) la câini. Durata protecției împotriva infestațiilor cu purici este de 5 săptămâni.

Produsul protejează câinii împotriva infestațiilor noi cu căpușe (*Dermatocentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) între 7 și 28 zile de la data aplicării produsului. Produsul nu a fost dovedit a fi eficient atunci când căpușele sunt deja prezente pe animal.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Cum se aplică Fiprotec:



Cale de administrare – Prin aplicare topică pe piele.

Dozare:

- 1 pipetă de 2,68 ml pentru un câine cu o greutate corporală de peste 20 kg și pana la 40 kg greutate corporală.  
Proportia de dozare este de 6,7 - 13,4 mg fipronil/kg greutate corporală.
- 2 pipete de 2,68 ml pentru un câine cu o greutate corporală de peste 60 kg.  
Proportia de dozare este de până la 8,9 mg fipronil/kg greutate corporală.

Asigurați-vă că utilizați produsul corect, corespunzător greutății corporale a câinelui dumneavoastră.

Numai pentru uz extern.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

#### **8. TEMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul

#### **9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

#### **10. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

#### **11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

Utilizați imediat după prima deschidere a blisterului.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

Păstrați pipeta în blister și cutie până în momentul utilizării, pentru a fi protejată de lumină.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe etichetă. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii.

#### **12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Produsul poate afecta negativ organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, râurile sau canalele cu aceste produse sau cu ambalajele lor goale.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

#### **13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONE PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz**

Numai pentru uz veterinar.

#### **14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR**

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

#### **15. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Beaphar B.V.  
Drostenkamp 3  
8101 BX, Raalte  
Olanda  
Tel: +31 572 348 834  
Fax: +31 572 348 835  
E-mail: hqb@beaphar.com

#### **16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

150084

**17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS**

Serie {număr}

## INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR [

Cutie de carton (folie Barex®, fără prospect inclus)

### 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Fiprotec 268 mg Soluție spot On pentru câini de talie mare  
Fipronil

### 2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 pipetă de 2,68 ml conține:

#### Substanță activă:

Fipronil ..... 268,0 mg

#### Excipienți:

Butilhidroxianisol (E320) ..... 0,536 mg  
Butilhidroxitoluen (E321) ..... 0,268 mg  
Alcool benzilic (E1519) ..... 736,800 mg


Soluție incoloră spre gălbui.

### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție Spot-on

### 4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1x 2,68 ml



### 5. SPECII TINTĂ

Câini

### 6. INDICAȚII

Tratamentul și prevenirea infestatiilor cu purici (*Ctenocephalides canis*) la caini. Durata protecției împotriva infestațiilor cu purici este de 5 săptămâni.

Produsul protejează câinii împotriva infestatiilor noi cu căpușe (*Dermatocentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) intre 7 si 28 zile de la data aplicării produsului. Produsul nu a fost dovedit a fi eficient atunci când căpușele sunt deja prezente pe animal.

### 7. METODA ȘI CALE (CAI) DE ADMINISTRARE



Cale de administrare – Prin aplicare topica pe piele.

Dozare

- 1 pipetă de 2,68 ml pentru un câine cu o greutate corporală de peste 20 kg și pana la 40 kg greutate corporală.

Proportia de dozare este de 6,7 - 13,4 mg fipronil/kg greutate corporală.

• 2 pipetele de 2,68 ml pentru un câine cu o greutate corporală de 20 kg și pana la 40 kg greutate corporală.

Asigurați-vă că utilizatii produsul corect, corespunzător greutății corporale a câinelui dumneavoastră.

Numai pentru uz extern.

Păstrați pipetele în ambalajul original până la momentul utilizării.

#### **8. TIMP DE AȘTEPTARE**

#### **9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Înainte de fiecare utilizare, citiți informațiile din interiorul cutiei de carton pentru a primi instrucțiuni complete și avertizări, inclusiv cele referitoare la atenționările utilizatorului.

#### **10. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

Utilizați imediat după prima deschidere.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe etichetă. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii.

#### **11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

Păstrați pipeta în cutia de carton până în momentul utilizării, pentru a fi protejată de lumină.

#### **12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite de la acesta se elimină în conformitate cu legile locale.

Produsul poate afecta negativ organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, râurile sau canalele cu aceste produse sau cu ambalajele lor goale.

#### **13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONE PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

Numai pentru uz veterinar.

#### **14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR**

A nu se lăsa la vedere și îndemână copiilor.

#### **15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX, Raalte

Olanda

Tel: +31 572 348 834

Fax: +31 572 348 835

E-mail: info@beaphar.com

**16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

150084

**17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

Serie

## **INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE INTERIORUL CUTIEI DE CARTON**

**Cutie de carton (folie Barex®, fără prospect inclus)**

### **1. CONTRAINDICAȚII**

Nu se utilizează la câinii cu o varsta mai mica de 8 săptămâni și/sau cu o greutate corporala mai mică 2 kg.

Nu se utilizează în cazuri de alergie la substanța activă sau la oricare dintre excipienti.

Nu se utilizează la câinii bolnavi sau la cei aflați în convalescență.

Nu se utilizează la iepuri, ca urmare a reacțiilor adverse și chiar le poate provoca moarte.

Acest produs este destinat numai pentru utilizarea pe câini. Nu se utilizează la pisici, acest lucru ar putea duce la supradozare.

### **2. REACȚII ADVERSE**

În cazul în care câinele s-a lins, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivitație, datorată în principal naturii excipientilor.

Printre reacțiile adverse asteptate extrem de rar, după utilizare se pot observa: reacții cutanate temporare în locul aplicării (decolorarea pielii, pierderea locală a părului, prurit, roșeață) și prurit general sau pierderea părului. În mod excepțional, au fost observate după utilizare urmatoarele: hipersalivitație, semne neurologice reversibile (sensibilitate excesivă a pielii, depresie, semne nervoase), vomă sau semne respiratorii.

Evitati supradozarea. Riscul apariției de efecte adverse poate crește în caz de supradozare.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar

### **3. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Metoda de administrare - țineți pipeta în poziție verticală. Loviți ușor capătul îngust al pipetei pentru a vă asigura că întreg conținutul se află în corpul pipetei. Tăiați vârful pipetei cu o foarfecă.

Faceți loc în părul câinelui, între umeri și baza capului, până când pielea devine vizibila. Puneți vârful pipetei pe piele și aplicați ușor câte jumătate din conținut în cele două locuri de aplicare.

Evități aplicarea soluției pe blană și nu frecăți pielea.

Ar trebui să aveți grijă pentru a evita umezirea excesivă a părului cu produsul, acest lucru provocând un aspect lipicios al părului la locul de tratament. Cu toate acestea, în cazul în care apare acest lucru, va dispare de obicei, în termen de 24-48 ore de la aplicare.

În absența studiilor privind siguranță, intervalul minim dintre tratamente este de 4 săptămâni.

### **4. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

#### **Attentionari speciale pentru fiecare specie tinta**

Pentru un control optim al infestării cu purici în gospodăriile cu multe animale de companie, toti câinii și pisicile trebuie să fie tratate cu un insecticid adecvat.

Puricii animalelor de companie infestează adesea coșul animalelor, locurile unde animalele dorm și se odihnesc, precum covoare și mobilier-moale, care trebuie să fie tratate în mod regulat cu insecticide adecvate și curatare cu ajutorul unui aspirator, în cazul infestatiilor masive sau în momentul inceperei aplicării masurilor de control.

Nu se cunosc informații cu privire la efectul pe care îl are îmbăierea/șamponarea asupra eficacității la câini. Samponarea anterioară sau prea frecventă după tratament poate reduce eficacitatea produsului.

Produsul nu previne atașarea căpușelor de animal. În plus, eficacitatea împotriva căpușelor deja existente nu a fost demonstrată. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecțioase nu poate fi exclusă.

Este cunoscut că produsul protejează împotriva infestării cu noi căpușe între 7-28 zile de la data aplicării produsului. Totuși, nu este cunoscut dacă eficiența împotriva infestării cu căpușe persistă și peste 4 săptămâni. De aceea pot să apară perioade neacoperite de protecție împotriva infestatiilor după aplicarea produsului, chiar dacă acesta este aplicat la un interval de minim 4 săptămâni.

#### **Precautii speciale pentru utilizare la animale**

Numai pentru uz extern. Nu aplicați produsul pe pielea cu răni sau leziuni.

Evitați contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență.

Animalele trebuie să fie cântărite cu precizie înainte de începerea tratamentului.

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă a corpului la care animalul nu poate ajunge să se lingă și că animalele nu se pot linge unele pe altele după tratament.

Nu se cunosc informații cu privire la toxicitatea potențială a produsului asupra cățelor mai mici de 8 săptămâni ce intră în contact cu cățeaua căreia i s-a aplicat tratamentul.

A nu se utilizează simultan cu alte produse contra puricilor care se aplică direct pe animal.

#### **Atentionari pentru utilizator**

Păstrați pipetele în ambalajul original până în momentul utilizării.

Personale cu hipersensibilitate cunoscută (alergie) la fipronil sau la oricare dintre excipienți, trebuie să evite contactul cu produsul. Evitați contactul continutului cu degetele. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați mâinile cu apă și săpun.

Acest produs poate provoca iritarea mucoasei sau a ochilor. Prin urmare, trebuie evitat contactul produsului cu gura sau ochii.

Dupa expunerea oculară accidentală, spălați ochii din abundență cu apă curată.

Ingerarea produsului este nocivă. Nu lăsați pipetele la îndemâna copiilor și eliminați imediat pipetele utilizate după aplicarea produsului.

Animalele tratate nu trebuie să fie manipulate până ce locul de aplicare al produsului nu s-a uscat, iar copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până ce locul de aplicare nu s-a uscat. Prin urmare, se recomandă să nu se aplice tratamentul în timpul zilei, ci la începutul serii, iar animalelor tratate recent nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii lor, mai ales cu copii.

Produsul poate afecta suprafețele vopsite, lăcuite sau alte tipuri de suprafețe din gospodarie sau mobilierul.

Nu fumați, nu consumați băuturi și nu mâncăti în timpul aplicării.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

#### **Alte precauții**

Câinilor nu trebuie să li se permită să inoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare.

#### **Utilizare în perioada de gestație și lactație**

Nu utilizați produsul la cătele gestante sau în lactație.

**Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Nu au fost demonstrează efecte adverse în urma studiilor de toleranță efectuate la cătei de pana la 8 săptămâni, cătei în perioada de creștere și la caini cu greutatea corporala de aproximativ 2 kg, care au fost tratați cu doze de până la 5 ori doza recomandata. Riscul aparitiei de efecte adverse poate însă să crească odată cu supradozarea. Prin urmare, este recomandat să tratezi întotdeauna animalele cu pipeta de marime corespunzătoare.

**5. DATA IN BAZA CAREIA TEXTELE DE PE ETICHETA AU FOST APROBATE**

Martie 2018

**6. ALTE INFORMAȚII**

1, 2, 3, 6 pipete sunt ambalate într-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate

**Producătorul responsabil cu eliberarea seriei**

Laboratorios Calier, S.A.

Barcelona, –str. Pla del Ramassà, nr. 26

08520 Les Franqueses del Vallès

(Barcelona)

SPANIA

Tel.: +34 93 849 51 33

Fax.: + 34 93 840 13 98

e-mail: laboratorios@calier.es

**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

**Blister (FOLIE ALUMINIU)**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 268 mg soluție spot-on pentru câini de talie mare  
kg)  
Fipronil



(20-40

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)**

Fipronil ..... 268,0 mg

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

1x 2,68 ml



**4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE**

Aplicare topică pe piele

**5. TEMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul

**6. NUMĂRUL SERIEI**


Serie {număr}

**7. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

**8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

**Numai pentru uz veterinar**



**Informații suplimentare:**

Beaphar B.V.

**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII**

Pipetă (folie PP)

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 268 mg fipronil



(acest simbol este optional)

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

[REDACTAT]

**3. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

**4. NUMĂRUL SERIEI**

Serie {număr}

**5. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

[REDACTAT]

**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE PIPETE ȘI BLISTERE  
(folie Barex®)**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 268 mg Solutie Spot On pentru caini de talie mare  
Fipronil

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Beaphar B.V.

**3. DATA EXPIRĂRII**

{lună/an}

**4. NUMARUL SERIEI DE PRODUS**

{număr}

**5. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar

**B. PROSPECT**  
**(Inclus doar în caz de folie PP/ALU)**

**PROSPECT:**

Fiprotec 268 mg soluție spot-on pentru câini de talie mare

**1 NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Detinătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

Beaphar B.V.  
Drostenkamp 3  
8101 BX, Raalte  
Olanda  
T: +31 572 348 834  
F: +31 572 348 835  
E: hqb@beaphar.com

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Laboratorios Calier, S.A.  
Barcelonès, 26 – Pla del Ramassà  
08520 Les Franqueses del Vallès  
(Barcelona)  
SPANIA  
Telf.: +34 93 849 51 33  
Fax.: + 34 93 840 13 98  
e-mail: laboratorios@calier.es

**2 DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**



(20-40 kg)

Fiprotec 268 mg soluție spot-on pentru câini de talie mare  
Fipronil

**3 DECLARAȚAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)**

1 pipetă de 2,68 ml conține:

**Substanță activă:**

Fipronil ..... 268,0 mg

**Excipienti:**

Butilhidroxianisol (E320) ..... 0,536 mg

Butilhidroxitoluen (E321) ..... 0,268 mg

Alcool benzilic (E1519) ..... 763,800 mg

Soluție incoloră spre gălbui

**4 INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides canis*) la câini. Durata protecției împotriva infestațiilor cu purici este de 5 săptămâni.

Produsul protejează câinii împotriva infestațiilor noi cu căpușe (Dermatocentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) între 7 și 28 zile de la data aplicării produsului. Produsul nu și-a demonstrat eficiența împotriva căpușelor deja prezente.

Acest medicament este potrivit pentru câinii cu greutatea între 20-40 kg și pentru câinii cu greutatea peste 60 kg.

#### 5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la câinii cu o vârstă mai mică de 8 săptămâni și/sau cu o greutate corporală mai mică 2 kg.

Nu se utilizează în cazuri de alergie la substanța activă sau la oricare dintre excipienti.

Nu se utilizează la animalele bolnave sau la cele aflate în convalescență.

Nu se utilizează la iepuri, ca urmare a reacțiilor adverse și chiar le poate provoca moarte.

Acest produs este destinat numai pentru utilizarea pe câini. Nu se utilizează la pisici, acest lucru ar putea duce la supradozare.

#### 6. REACȚII ADVERSE

În cazul în care câinele s-a lins, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivăție, datorată în principal naturii excipientilor.

Printre reacțiile adverse asteptate extrem de rar, după utilizare se pot observa: reacții cutanate temporare în locul aplicării (decolorarea pielii, pierderea locală a părului, prurit, roșeață) și prurit general sau pierderea părului. În mod excepțional, au fost observate după utilizare urmatoarele: hipersalivăție, semne neurologice reversibile (sensibilitate excesivă a pielii, depresie, semne nervoase), vomă sau semne respiratorii.

Evitați supradozarea. Riscul apariției de efecte adverse poate crește în caz de supradozare.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.


#### ■ SPECII ȚINTĂ

Câini



#### ■ POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Cum se aplică Fiprotec:



Calea de administrare – Prin aplicare topică pe piele.

Dozare:

- 1 pipetă de 2,68 ml pentru un câine cu o greutate corporală de peste 20 kg și până la 40 kg greutate corporală. Proportia de dozare este de 6.7 – 13.4 mg fipronil/kg greutate corporală.

- 2 pipete de 2,68 ml pentru un câine cu o greutate corporală de peste 60 kg Proportia de dozare este de 8,9 mg fipronil/kg greutate corporală.


Asigurați-vă că utilizați produsul corect, corespunzător greutății corporale a câinelui dumneavoastră.

Numai pentru uz extern.

Păstrați pipetele în ambalajul original până în momentul utilizării.

## **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Utilizați colțurile ușor de dezlipit pentru a scoate pipeta din blister. Nu începați folia cu foarfeca, cuțite sau alte instrumente ascuțite, deoarece aceasta ar putea deteriora pipeta din interior.



Tineți pipeta în poziție verticală. Loviți ușor capătul îngust al pipetei pentru a vă asigura că întreg conținutul se află în corpul pipetei. Tăiați vârful pipetei cu o foarfecă. Faceți loc în părul câinelui, între umeri și baza capului, până când pielea devine vizibila. Puneți vârful pipetei pe piele și aplicați ușor câte jumătate din conținut în cele două locuri de aplicare.

Evități aplicarea soluției pe blană și nu frecați pielea. Ar trebui să aveți grijă pentru a evita umezirea excesivă a părului cu produsul, acest lucru provocând un aspect lipicios al părului la locul de tratament. Cu toate acestea, în cazul în care apare acest lucru, va dispărea de obicei, în termen de 24-48 ore de la aplicare.

În absența studiilor privind siguranță, intervalul minim dintre tratamente este de 4 săptămâni.

## **10. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se utiliza imediat după prima deschidere a blisterului.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

Păstrați pipeta în blister și în cutie până în momentul utilizării, pentru a fi protejată de lumină.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe etichetă. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

## **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

Precautii speciale pentru fiecare specie tintă:

Pentru un control optim al infestațiilor cu purici în gospodăriile cu multe animale de companie, toți câinii și pisicile trebuie să fie tratate cu un insecticid adecvat.

Puricii animalelor de companie infestează adesea coșul animalelor, locurile unde animalele dorm și se odihnesc, precum covoare și mobilier moale, care trebuie să fie tratate în mod regulat cu insecticide adecvate și curățate cu ajutorul unui aspirator, în cazul infestațiilor masive sau în momentul începerii aplicării măsurilor de control.

Nu se cunosc informații cu privire la efectul pe care îl are îmbăierea/șamponarea asupra eficacității la câini. Samponarea anteroară sau prea frecventă după tratament poate reduce eficacitatea produsului.

Produsul nu previne atașarea căpușelor de animal. În plus, eficacitatea împotriva căpușelor deja existente nu a fost demonstrată. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecțioase nu poate fi exclusă.

Este cunoscut că produsul protejează împotriva infestării cu noi căpușe între 7-28 zile de la data aplicarea produsului. Totuși, nu este cunoscut dacă eficiența împotriva infestării cu căpușe persistă și peste 4 săptămâni. De aceea pot să apară perioade neacoperite de protecție împotriva infestațiilor după aplicarea produsului, chiar dacă acesta este aplicat la un interval de minim 4 săptămâni.

#### Precautii speciale pentru utilizare la animale:

Numai pentru uz extern. Nu aplicați produsul pe pielea cu răni sau leziuni. Evitați contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență.

Animalele trebuie să fie cântărite cu precizie înainte de începerea tratamentului.

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă a corpului la care animalul nu poate ajunge să se lingă și că animalele nu se pot linge unele pe altele după tratament.

Nu se cunosc informații cu privire la toxicitatea potențială a produsului asupra cățeilor mai mici de 8 săptămâni ce intră în contact cu căteaua căreia i s-a aplicat tratamentul.

A nu se utilizează simultan cu alte produse contra puricilor care se aplică direct pe animal.

#### Precautii speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Păstrați pipetele în ambalajul original până în momentul utilizării.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută (alergie) la fipronil sau la oricare dintre excipienți, trebuie să evite contactul cu produsul. Evitați contactul conținutului cu degetele. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați mâinile cu apă și săpun.

Acest produs poate provoca iritarea mucoasei sau a ochilor. Prin urmare, trebuie evitat contactul produsului cu gura sau ochii.

După expunerea oculară accidentală, spălați ochii din abundență cu apă curată.

Ingerarea produsului este nocivă. Nu lăsați pipetele la îndemâna copiilor și eliminați imediat pipetele utilizate după aplicarea produsului.

Animalele tratate nu trebuie să fie manipulate până ce locul de aplicare al produsului nu s-a uscat, iar copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până ce locul de aplicare nu s-a uscat. Prin urmare, se recomandă să nu se aplice tratamentul în timpul zilei, ci la începutul serii, iar animalelor tratate recent nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii lor, mai ales cu copii.

Produsul poate afecta suprafețele vopsite, lăcuite sau alte tipuri de suprafețe din gospodărie sau mobilierul.

Nu fumați, nu consumați băuturi și nu mâncați în timpul aplicării.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

#### Alte precauții:

Câinilor nu trebuie să li se permită să înnoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare.

#### Gestatie și lactație:

Nu utilizați produsul la cățele gestante sau în lactație.

#### Supradozare (simptome, proceduri de urgentă, antidot):

Nu au fost demonstate efecte adverse în urma studiilor de toleranță efectuate la căței de până în 8 săptămâni, căței în perioada de creștere și la câini cu greutatea corporală de aproximativ 2

kg, care au fost tratați cu doze de până la 5 ori doza recomandată. Riscul apariției de efecte adverse poate însă să crească odată cu supradozarea. Prin urmare, este recomandat să tratați întotdeauna animalele cu pipeta de mărime corespunzătoare.

### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Produsul poate afecta negativ organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, râurile sau canalele cu aceste produse sau cu ambalajele lor goale.

### **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

Martie 2018

### **15. ALTE INFORMAȚII**

1, 2, 3, 4, 6 pipete sunt ambalate într-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate