

*ANEXA 1*

**ANEXA 1**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**

## **1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 67 mg Soluție Spot On pentru câini de talie mică

## **2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

1 pipetă de 0,67 ml conține:

### **Substanță activă**

Fipronil..... 67,0 mg

### **Excipienti:**

Butilhidroxianisol (E320)..... 0,134 mg

Butilhidroxitoluen (E321)..... 0,067 mg

Alcool benzilic (E1519) ..... 190,950 mg

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Soluție spot-on

Soluție limpede incoloră spre gălbui

## **4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**

### **4.1 Specii țintă**

Câini.

Acest produs este potrivit pentru câini cu greutatea corporala între 2 și 10 kg.

### **4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă**

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides felis*) la câini. Durata protecției împotriva infestațiilor cu purici este de 5 săptămâni.

Produsul protejează câinii împotriva infestațiilor noi cu căpușe (*Dermatocentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) între 7 și 28 zile de la data aplicării produsului.

### **4.3 Contraindicații**

Nu se utilizează la câinii cu o varsta mai mica de 8 săptămâni și/sau cu o greutate corporala mai mică de 2 kg.

Nu se utilizează în cazuri de hipersensibilitate la substanță activă sau la oricare dintre excipienti.

Nu se utilizează la câinii bolnavi (ex. boli sistemice, febră) sau la cei aflați în convalescență.

Nu se utilizează la iepuri, deoarece pot apărea reacții adverse și chiar moartea.

Nu se utilizează la pisici, acest lucru ar putea duce la supradozare.

#### **4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă**

Pentru un control optim al infestării cu purici în gospodăriile cu multe animale de companie, toate animalele din gospodării trebuie să fie tratate cu un insecticid adecvat.

Puricii animalelor de companie infestează adesea coșul animalelor, locurile unde animalele dorm și se odihnesc, precum covoare și mobilier moale, care trebuie să fie tratate în mod regulat cu insecticide adecvate și curățate cu ajutorul unui aspirator, în cazul infestațiilor masive sau în momentul începerii aplicării măsurilor de control.

Nu se cunosc informații cu privire la efectul pe care îl are îmbăierea/șamponarea asupra eficacității la câini. Șamponarea anterioară sau prea frecventă după tratament poate reduce eficacitatea produsului (vezi de asemenea secțiunea 6.6).

Produsul nu previne atașarea căpușelor de animal. În plus, eficacitatea împotriva căpușelor deja existente nu a fost demonstrată. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecțioase nu poate fi exclusă.

Este cunoscut că produsul protejează împotriva infestării cu noi căpușe între 7-28 zile de la data aplicării produsului. Totuși, nu este cunoscut dacă eficiența împotriva infestării cu căpușe persistă și peste 4 săptămâni. De aceea pot să apară perioade neacoperite de protecție împotriva infestațiilor după aplicarea produsului, chiar dacă acesta este aplicat la un interval de minim 4 săptămâni.

#### **4.5 Precauții speciale pentru utilizare**

##### Precauții speciale pentru utilizare la animale.

Numai pentru uz extern. Nu aplicați produsul pe pielea cu răni sau leziuni.

Evitați contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență.

Animalele trebuie să fie cântărite cu precizie înainte de începerea tratamentului (vezi secțiunea 4.3).

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă a corpului la care animalul nu poate ajunge să se lingă și că animalele nu se pot linge unele pe altele după tratament.

Nu se cunosc informații cu privire la toxicitatea potențială a produsului asupra cățeilor mai mici de 8 săptămâni ce intră în contact cu căteauna căreia i s-a aplicat tratamentul. Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

##### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Păstrați pipetele în ambalajul original până când sunt pregătite pentru utilizare și aruncați imediat pipetele folosite.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau la oricare dintre excipienți (vezi secțiunea 6.1), trebuie să evite contactul cu produsul. Evitați contactul conținutului cu degetele. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați mâinile cu apă și săpun.

Acest produs poate provoca iritarea mucoasei sau a ochilor. Prin urmare, trebuie evitat contactul produsului cu gura sau ochii.

După expunerea oculară accidentală, spălați ochii din abundenta cu apă curată.

Ingerarea produsului este nocivă. Nu lăsați pipetele la îndemâna copiilor și eliminați imediat pipetele utilizate după aplicarea produsului. În cazul ingestiei accidentale, consultați medicul și arătați-i prospectul sau eticheta.

Animalele tratate nu trebuie să fie manipulate până ce locul de aplicare al produsului nu s-a uscat, iar copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până ce locul de aplicare nu s-a uscat. Prin urmare, se recomandă să nu se aplice tratamentul în timpul zilei, ci la începutul serii, iar animalelor tratate recent nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii lor, mai ales cu copii.

Nu fumați, nu consumați băuturi și nu mâncăți în timpul aplicării.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

#### Alte precauții

Fipronilul poate afecta negativ organismele acvatice.

Câinilor nu trebuie să li se permită să înnoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare.

Produsul poate afecta suprafețele vopsite, lăcuite sau alte tipuri de suprafețe din gospodărie sau mobilierul.

#### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

În cazul în care câinele s-a lins, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivație, datorată în principal naturii excipienților.

Printre reacțiile adverse asteptate extrem de rar, după utilizare se pot observa: reacții cutanate tranzitorii în locul aplicării (decolorarea pielii, alopecia locală, prurit, eritem) și prurit general sau alopecia. În mod excepțional, au fost observate după utilizare urmatoarele: hipersalivație, semne neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, semne nervoase), vomă sau semne respiratorii.

Evitați supradozarea. Riscul apariției de efecte adverse poate crește în caz de supradozare.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând urmatoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse )
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate )

#### **4.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație**

Studiile de laborator privind utilizarea de fipronil au demonstrat că acesta nu produce efecte teratogene sau fetotoxice. Siguranța acestui produs nu a fost stabilită pentru cătelele gestante sau în lactație, a se utiliza numai în conformitate cu evaluarea raportului beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil. Dacă animalele sunt tratate în timpul perioadei de lactație, vezi secțiunea 4.5 (i).

#### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Nu utilizați produsul simultan cu alte produse antiparazitare care se aplică direct pe animal.

#### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Asigurați-vă că utilizați produsul corect, corespunzător greutății corporale a câinelui dumneavoastră.

Cale de administrare – Prin aplicare topică pe piele. Numai pentru uz extern.

Dozare:

- 1 pipetă de 0,67 ml pentru un câine cu o greutate corporală de peste 2 kg și până la 10 kg greutate corporală.  
Proportia de dozare este de 6,7 – 33,5 mg fipronil/kg greutate corporală.

Metoda de administrare - Utilizați colțurile ușor de dezlipit pentru a scoate pipeta din blister. Nu înțepați folia cu foarfeca, cuțite sau alte instrumente ascuțite, deoarece aceasta ar putea deteriora pipeta din interior.

Tineți pipeta în poziție verticală. Loviți ușor capătul îngust al pipetei pentru a vă asigura că întreg conținutul se află în corpul pipetei. Tăiați vârful pipetei cu o foarfecă.

Faceți loc în părul câinelui, între umeri și baza capului, până când pielea devine vizibila. Puneți vârful pipetei pe piele și aplicați ușor câte jumătate din conținut în cele două locuri de aplicare.

Evitați aplicarea soluției pe blană și nu frecați pielea.

Ar trebui să aveți grijă pentru a evita umezirea excesivă a părului cu produsul, acest lucru provocând un aspect lipicios al părului la locul de tratament. Cu toate acestea, în cazul în care apare acest lucru, va dispare de obicei, în termen de 24-48 ore de la aplicare.

În absența studiilor privind siguranța, intervalul minim dintre tratamente este de 4 săptămâni.

#### **4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Nu au fost demonstate efecte adverse în urma studiilor de toleranță efectuate la căței de până la 8 săptămâni, căței în perioada de creștere și la câini cu greutatea corporală de aproximativ 2 kg, care au fost tratați cu doze de până la 5 ori doza recomandată. Riscul apariției de efecte adverse poate însă să crească odată cu supradozarea. Prin urmare, este recomandat să tratați întotdeauna animalele cu pipeta de mărime corespunzătoare.

#### **4.11 Timp de așteptare**

Nu este cazul.

### **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

**Grupa farmacoterapeutică:** Ectoparaziticide pentru uz topic, inclusiv insecticide

**Codul veterinar ATC:** QP53AX15

#### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Fipronilul este un insecticid/acaricid din familia fenilpirazolului. El acționează prin inhibarea complexului GABA, prin legarea la canalul ionilor de clor și astfel are loc blocarea transferului pre- și post-sinaptic al ionilor de clor prin membrană. Aceste rezultate conduc la o activitate necontrolată a sistemului nervos central și la moartea insectelor și acarienilor.

## **5.2 Particularități farmacocinetice**

La câine, după aplicarea topică a produsului, absorbția fipronilului prin piele se face ușor. Un nivel scăzut de fipronil poate fi depistat în plasmă, cu o variabilitate foarte mare între indivizi. După aplicarea topică, produsul se extinde de la locul de aplicare spre întreaga suprafață a animalului. Un gradient de concentrație de fipronil se găsește pe blana animalului, extinzându-se de la locul aplicării spre zonele periferice (zonele lombare, flancuri,...).

Fipronil este metabolizat în principal în derivați sulfonați (RM1602), care de asemenea au proprietăți insecticide și acaricide.

Concentrația de fipronil din păr scade cu timpul.

## **5.3 Proprietăți referitoare la mediul înconjurător**

Produsul poate afecta negativ organismele acvatice.

## **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

### **6.1 Lista excipientilor**

Butilhidroxianisol (E320)

Butilhidroxitoluen (E321)

Alcool benzilic (E1519)

Dietilen glicol monoetyl eter.

### **6.2 Incompatibilități majore**

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

### **6.3 Perioadă de valabilitate**

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare:  
2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: a se utiliza imediat.

### **6.4. Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

Păstrați pipeta în blister și în cutie până în momentul utilizării, pentru a fi protejată de lumină.

### **6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**

O pipetă de culoare albastră este compusă dintr-un înveliș sudat termic (polipropilena și copolimer acrilonitril metil acrilat/copolimer olefina ciclica și polipropilena/polipropilena) și un film (copolimer acrilonitril metil acrilat/ aluminiu/poliester).

1, 2, 3, 6 pipete sunt ambalate într-o cutie de carton.

Sau

O pipetă de culoare albastră este compusă dintr-un înveliș sudat termic (polipropilenă /copolimer olefină ciclică/copolimer etilen vinil alcool/polipropilenă) și un film (tereftalat de polietilenă/ aluminiu/polipropilenă).

Pipeta albastră este protejată într-un blister de aluminiu (polietilenă/poliamidă/aluminiu/poliamidă/polietilenă și poliamidă/aluminiu/polietilenă).

1, 2, 3, 4, 6 pipete sunt ambalate intr-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

#### **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Fipronilul poate afecta negativ organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, râurile sau canalele cu aceste produse sau cu ambalajele lor goale.

#### **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Beaphar B.V.  
Str. Drostenkamp, nr. 3  
8101 BX, loc. Raalte  
Olanda

#### **8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

#### **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

Data primei autorizări: 11.03.2015

#### **10 DATA REVIZUIIRII TEXTULUI**

Octombrie 2019

#### **INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE**

Nu este cazul.

1946-1947  
1947-1948  
1948-1949  
1949-1950  
1950-1951  
1951-1952  
1952-1953  
1953-1954  
1954-1955  
1955-1956  
1956-1957  
1957-1958  
1958-1959  
1959-1960  
1960-1961  
1961-1962  
1962-1963  
1963-1964  
1964-1965  
1965-1966  
1966-1967  
1967-1968  
1968-1969  
1969-1970  
1970-1971  
1971-1972  
1972-1973  
1973-1974  
1974-1975  
1975-1976  
1976-1977  
1977-1978  
1978-1979  
1979-1980  
1980-1981  
1981-1982  
1982-1983  
1983-1984  
1984-1985  
1985-1986  
1986-1987  
1987-1988  
1988-1989  
1989-1990  
1990-1991  
1991-1992  
1992-1993  
1993-1994  
1994-1995  
1995-1996  
1996-1997  
1997-1998  
1998-1999  
1999-2000  
2000-2001  
2001-2002  
2002-2003  
2003-2004  
2004-2005  
2005-2006  
2006-2007  
2007-2008  
2008-2009  
2009-2010  
2010-2011  
2011-2012  
2012-2013  
2013-2014  
2014-2015  
2015-2016  
2016-2017  
2017-2018  
2018-2019  
2019-2020  
2020-2021  
2021-2022  
2022-2023  
2023-2024  
2024-2025  
2025-2026  
2026-2027  
2027-2028  
2028-2029  
2029-2030  
2030-2031  
2031-2032  
2032-2033  
2033-2034  
2034-2035  
2035-2036  
2036-2037  
2037-2038  
2038-2039  
2039-2040  
2040-2041  
2041-2042  
2042-2043  
2043-2044  
2044-2045  
2045-2046  
2046-2047  
2047-2048  
2048-2049  
2049-2050  
2050-2051  
2051-2052  
2052-2053  
2053-2054  
2054-2055  
2055-2056  
2056-2057  
2057-2058  
2058-2059  
2059-2060  
2060-2061  
2061-2062  
2062-2063  
2063-2064  
2064-2065  
2065-2066  
2066-2067  
2067-2068  
2068-2069  
2069-2070  
2070-2071  
2071-2072  
2072-2073  
2073-2074  
2074-2075  
2075-2076  
2076-2077  
2077-2078  
2078-2079  
2079-2080  
2080-2081  
2081-2082  
2082-2083  
2083-2084  
2084-2085  
2085-2086  
2086-2087  
2087-2088  
2088-2089  
2089-2090  
2090-2091  
2091-2092  
2092-2093  
2093-2094  
2094-2095  
2095-2096  
2096-2097  
2097-2098  
2098-2099  
2099-20100

**ANEXA III**

**ETICHETARE ȘI PROSPECT**

ANEXA n. 3

10807  
1980

**A. ETICHETARE**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie de carton (folie PP/ALU și prospect inclus)****1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 67 mg Soluție Spot On pentru câini de talie mică.  
Fipronil

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE****Substanță activă:**

Fipronil..... 67,0 mg

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Soluție Spot-On

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

1x 0,67 ml  
2x 0,67 ml  
3x 0,67 ml  
4x 0,67 ml  
6x 0,67 ml

**5. SPECII ȚINTĂ**

Câini

Acest produs este potrivit pentru câini cu greutatea corporala între 2 și 10 kg.


**6. INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides felis*) la câini. Durata protecției împotriva infestațiilor cu purici este de 5 săptămâni.

Produsul protejează câinii împotriva infestațiilor noi cu căpușe (*Dermatocentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) între 7 și 28 zile de la data aplicării produsului. Produsul nu a fost dovedit a fi eficient atunci când căpușele sunt deja prezente pe animal.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Cum se aplică Fiprotec:



Calea de administrare – Prin aplicare topică pe piele.

Dozare:

- 1 pipetă de 0,67 ml pentru un câine cu o greutate corporală de peste 2 kg și până la 10 kg greutate corporală.  
Proporția de dozare este de 6,7 – 33,5 mg fipronil/kg greutate corporală.

Asigurați-vă că utilizați produsul corect, corespunzător greutății corporale a câinelui.  
dumneavoastră.

Numai pentru uz extern.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

#### **8. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul

#### **9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

#### **10. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

#### **11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

Utilizați imediat după prima deschidere a blisterului.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C .

Păstrați pipeta în blister și în cutie până în momentul utilizării, pentru a fi protejată de lumină.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe etichetă. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii.

#### **12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Produsul poate afecta negativ organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, râurile sau canalele cu aceste produse sau cu ambalajele lor goale.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

#### **13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

Numai pentru uz veterinar.

#### **14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR**

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

#### **15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX, Raalte

Olanda

Tel: +31 572 348 834  
Fax: +31 572 348 835  
E-mail: [hgb@beaphar.com](mailto:hgb@beaphar.com)

**16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

**17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

Serie {număr}

## INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton (folie Barex® , fără prospect inclus)

### 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Fiprotec 67 mg Soluție Spot On pentru câini de talie mică.  
Fipronil

### 2. DECLARAAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 pipetă de 0,67 ml conține:

#### Substanță activă:

Fipronil ..... 67,0 mg

#### Excipienti:

Butilhidroxianisol (E320)..... 0,134 mg

Butilhidroxitoluen (E321)..... 0,067 mg

Alcool benzilic (E1519) ..... 190,950 mg

Soluție lăptătoare incoloră spre galben.

### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot-on

### 5. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1x 0,67 ml

2x 0,67 ml

3x 0,67 ml

6x 0,67 ml

### 5. SPECII ȚINTĂ

Câini


Acest produs este potrivit pentru câini cu greutatea corporala între 2 și 10 kg.

### 6. INDICAȚII

Tratamentul și prevenirea infestatiilor cu purici (*Ctenocephalides felis*) la caini. Durata protecției împotriva infestațiilor cu purici este de 5 săptămâni.

Produsul protejează câinii împotriva infestatiilor noi cu căpușe (*Dermatocentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) între 7 și 28 zile de la data aplicării produsului. Produsul nu a fost dovedit a fi eficient atunci când căpușele sunt deja prezente pe animal.

### 7. METODA ȘI CALE (CAI) DE ADMINISTRARE



Calea de administrare – Prin aplicare topica pe piele.

Dozare:

- 1 pipetă de 0,67 ml pentru un câine cu o greutate corporală de peste 2 kg și până la 10 kg greutate corporală.  
Proporția de dozare este de 6,7 – 33,5 mg fipronil/kg greutate corporală.

Asigurați-vă că utilizati produsul corect, corespunzător greutății corporale a câinelui dumneavoastră.

Numai pentru uz extern.

Păstrați pipetele în ambalajul original până la momentul utilizării.

#### **8. TIMP DE AȘTEPTARE**

#### **9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Înainte de fiecare utilizare, citiți informațiile din interiorul cutiei de carton pentru a primi instrucțiuni complete și avertizări, inclusiv cele referitoare la atenționările utilizatorului.

#### **10. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

#### **11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

Utilizați imediat după prima deschidere.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C

Păstrați pipeta în blister până în momentul utilizării, pentru a fi protejată de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii.

#### **12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite de la acesta se elimină în conformitate cu legile locale.

Produsul poate afecta negativ organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, râurile sau canalele cu aceste produse sau cu ambalajele lor goale.

#### **13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

Numai pentru uz veterinar.

#### **14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR**

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

**15. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Beaphar B.V.  
Drostenkamp 3  
8101 BX, Raalte  
Olanda  
Tel: +31 572 348 834  
Fax: +31 572 348 835  
E-mail: [hqb@beaphar.com](mailto:hqb@beaphar.com)

**16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE****17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

Serie

## **INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE INTERIORUL CUTIEI DE CARTON**

**Cutie de carton (folie Barex®, fără prospect inclus)**

### **1. CONTRAINDICAȚII**

Nu se utilizează la câinii cu o varsta mai mica de 8 săptămâni și/sau cu o greutate corporala mai mică 2 kg.

Nu se utilizează în cazuri de alergie la substanța activă, sau la oricare dintre excipienti.

Nu se utilizează la câini bolnavi sau la cei aflați în convalescență.

Nu se utilizează la iepuri, deoarece pot apărea reacții adverse și chiar moartea.

Acest produs este destinat numai pentru utilizarea pe câini. Nu se utilizează la pisici, acest lucru ar putea duce la supradozare.

### **2. REACȚII ADVERSE**

În cazul în care câinele s-a lins, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivăție, datorată în principal naturii excipientilor.

Printre reacțiile adverse asteptate extrem de rar, după utilizare se pot observa: reacții cutanate tranzitorii în locul aplicării (decolorarea pielii, pierderea locală a părului, prurit, roșeață) și prurit general sau piedere părului. În mod excepțional, au fost observate după utilizare următoarele: hipersalivăție, semne neurologice reversibile (sensibilitate excesivă a pielii, semne nervoase), vomă sau semne respiratorii.

Evitați supradozarea. Riscul apariției de efecte adverse poate crește în caz de supradozare.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând urmatoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse )
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate )

### **3. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Metoda de administrare - țineți pipeta în poziție verticală. Loviți ușor capătul îngust al pipetei pentru a vă asigura că întreg conținutul se află în corpul pipetei. Tăiați vârful pipetei cu o foarfecă.

Faceți loc în părul câinelui, între umeri și baza capului, până când pielea devine vizibila. Puneți vârful pipetei pe piele și aplicați ușor câte jumătate din conținut în cele două locuri de aplicare.

Evitați aplicarea soluției pe blană și nu frecați pielea.

Ar trebui să aveți grijă pentru a evita umerezarea excesivă a părului cu produsul, acest lucru provocând un aspect lipicios al părului la locul de tratament. Cu toate acestea, în cazul în care apare acest lucru, va dispare de obicei, în termen de 24-48 ore de la aplicare.

În absența studiilor privind siguranța, intervalul minim dintre tratamente este de 4 săptămâni.

#### **4. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

##### **Atentionari speciale pentru fiecare specie tinta**

Pentru un control optim al infestării cu purici în gospodăriile cu multe animale de companie, toate animalele din gospodării trebuie să fie tratate cu un insecticid adecvat.

Puricii animalelor de companie infestează adesea coșul animalelor, locurile unde animalele dorm și se odihnesc, precum covoare și mobilier moale, care trebuie să fie tratate în mod regulat cu insecticide adecvate și curatare cu ajutorul unui aspirator, în cazul infestatiilor masive sau în momentul începerii aplicării masurilor de control.

Nu se cunosc informații cu privire la efectul pe care îl are îmbăierea/șamponarea asupra eficacității la câini. Samponarea anteroară sau prea frecventă după tratament poate reduce eficacitatea produsului.

Produsul nu previne atașarea căpușelor de animal. În plus, eficacitatea împotriva căpușelor deja existente nu a fost demonstrată. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecțioase nu poate fi exclusă.

Este cunoscut că produsul protejează împotriva infestării cu noi căpușe între 7-28 zile de la data aplicării produsului. Totuși, nu este cunoscut dacă eficiența împotriva infestării cu căpușe persistă și peste 4 săptămâni. De aceea pot să apară perioade neacoperite de protecție împotriva infestatiilor după aplicarea produsului, chiar dacă acesta este aplicat la un interval de minim 4 săptămâni.

##### **Precautii speciale pentru utilizare la animale**

Numai pentru uz extern. Nu aplicați produsul pe pielea cu răni sau leziuni. Evitați contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență.

Animalele trebuie să fie cântărite cu precizie înainte de începerea tratamentului.

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă a corpului la care animalul nu poate ajunge să se lingă și că animalele nu se pot linge unele pe altele după tratament.

Nu se cunosc informații cu privire la toxicitatea potențială a produsului asupra cățeilor mai mici de 8 săptămâni ce intră în contact cu cățeaua căreia i s-a aplicat tratamentul. Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

A nu se utiliza simultan cu alte produse contra puricilor care se aplică direct pe animal.

##### **Atentionari pentru utilizator**

Păstrați pipetele în ambalajul original până când sunt pregătite pentru utilizare și aruncați imediat pipetele folosite.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută (alergie) la fipronil sau la oricare dintre excipienti, trebuie să evite contactul cu produsul.

Evitați contactul continuului cu degetele. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați mâinile cu apă și săpun.

Acest produs poate provoca iritarea mucoasei sau a ochilor. Prin urmare, trebuie evitat contactul produsului cu gura sau ochii.

Dupa expunerea oculara accidentală, spalati ochii din abundență cu apă curată.

Ingerarea produsului este nocivă. Nu lăsați pipetele la îndemâna copiilor și eliminați imediat pipetele utilizate după aplicarea produsului. În cazul ingestiei accidentale, consultați medicul și arătați-i prospectul sau eticheta.

Animalele tratate nu trebuie să fie manipulate până ce locul de aplicare al produsului nu s-a uscat, iar copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până ce locul de aplicare nu s-a uscat. Prin urmare, se recomandă să nu se aplice tratamentul în timpul zilei, ci la începutul serii, iar animalelor tratate recent nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarilor lor, mai ales cu copii.

Nu fumați, nu consumați băuturi și nu mâncati în timpul aplicării.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

#### **Alte precautii**

Fipronilul poate afecta negativ organisme acvatice

Câinilor nu trebuie să li se permită să inoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare.

Produsul poate afecta suprafețele vopsite, lăcuite sau alte tipuri de suprafețe din gospodarie sau mobilierul.

#### **Incompatibilități majore**

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinar.

#### **Utilizare în perioada de gestație și lactație**

Nu utilizați produsul la cățele gestante sau în lactație.

Studiile de laborator privind utilizarea de fipronil au demonstrat că acesta nu produce efecte teratogene sau fetotoxice. Siguranța acestui produs nu a fost stabilită pentru cățelele gestante sau în lactație, a se utiliza numai în conformitate cu evaluarea raportului beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil. Dacă animalele sunt tratate în timpul perioadei de lactație, vezi **Precautii speciale pentru utilizare la animale**.

#### **Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Nu au fost demonstate efecte adverse în urma studiilor de toleranță efectuate la căței de până la 8 săptămâni, căței în perioada de creștere și la caini cu greutatea corporala de aproximativ 2 kg, care au fost tratați cu doze de până la 5 ori doza recomandată. Riscul aparitiei de efecte adverse poate însă să crească odată cu supradozarea. Prin urmare, este recomandat să tratați întotdeauna animalele cu pipeta de marime corespunzătoare.

#### **5. DATA IN BAZA CAREIA TEXTELE DE PE ETICHETA AU FOST APROBATE**

Octombrie 2019

#### **6. ALTE INFORMAȚII**

1, 2, 3, 6 pipete sunt ambalate într-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

#### **Producătorul responsabil cu eliberarea seriei**

Laboratorios Calier, S.A.  
Barcelonès, 26– Pla del Ramassà  
08520 Les Franqueses del Vallès  
(Barcelona)  
SPANIA  
Tel.: +34 93 849 51 33  
Fax.: +34 93 840 13 98  
e-mail: [laboratorios@calier.es](mailto:laboratorios@calier.es)

Beaphar B.V.  
Oude Lindertseweg 9  
8102 EV, Raalte  
Olanda  
Tel: +31 572 348 834  
Fax: +31 572 348 835  
E-mail: [hqb@beaphar.com](mailto:hqb@beaphar.com)

**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

**Blister (FOLIE ALUMINIU)**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 67 mg soluție spot-on pentru câini de talie mică  
Fipronil



(2-10 kg)

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)**

Fipronil..... 67,0 mg

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

1 x 0,67 ml  
2 x 0,67 ml  
3 x 0,67 ml  
4 x 0,67 ml  
6 x 0,67 ml

**4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE**

Aplicare topică pe piele

**5. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

**6. NUMĂRUL SERIEI**


Serie {număr}

**7. DATA EXPIRĂRII**

EXP {luna/anul}

**8. MENTIUNE „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

**Numai pentru uz veterinar.**



**Informații suplimentare:**

Beaphar B.V.

**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII**

**Pipetă (Folie PP)**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 67 mg fipronil



(2-10 kg) (acest simbol este opțional)

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

A se vedea blisterul din aluminiu

**3. DATA EXPIRĂRII**

EXP {luna/anul}

**4. NUMĂRUL SERIEI**

Serie {număr}

**5. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

A se vedea blisterul din aluminiu

**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE PIPETE ȘI BLISTERE  
(folie Barex®)**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 67 mg soluție spot on pentru câini de talie mică  
Fipronil

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Beaphar B.V.

**3. DATA EXPIRĂRII**

{lună/an}

**4. NUMARUL SERIEI DE PRODUS**

{număr}

**5. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.

*ANEXA nr. 4*

*22.03.2011*

*PROIECT*

**B. PROSPECT\**  
(Inclus doar în caz de folie PP/ALU)

**PROSPECT:**

Fiprotec 67 mg soluție spot-on pentru câini de talie mică

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

**Deținătorul autorizației de comercializare:**

Beaphar B.V.  
Drostenkamp 3  
8101 BX, Raalte  
Olanda  
Tel: +31 572 348 834  
Fax: +31 572 348 835  
e-mail: hqb@beaphar.com

**Producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:**

Laboratorios Calier, S.A.  
Barcelonès, 26 – Pla del Ramassà  
08520 Les Franqueses del Vallès  
(Barcelona)  
SPANIA  
Telf.: +34 93 849 51 33  
Fax.: + 34 93 840 13 98  
e-mail: [laboratorios@calier.es](mailto:laboratorios@calier.es)

Beaphar B.V.  
Oude Lindertseweg 9  
8102 EV, Raalte  
Olanda  
Tel: +31 572 348 834  
Fax: +31 572 348 835  
E-mail: [hqb@beaphar.com](mailto:hqb@beaphar.com)

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Fiprotec 67 mg soluție spot-on pentru câini de talie mică  
Fipronil



(2-10 kg)

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)**

1 pipetă de 0,67 ml conține:

**Substanță activă:**

Fipronil..... 67,0 mg

**Excipienti:**

Butilhidroxianisol (E-320) ..... 0,134 mg

Butilhidroxitoluen (E-321) ..... 0,067 mg

Alcool benzilic (E-1519) ..... 190,950 mg

Soluție limpă incoloră spre gălbui

#### **4. INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides felis*) la câini. Durata protecției împotriva infestațiilor cu purici este de 5 săptămâni.

Produsul protejează câinii împotriva infestațiilor noi cu căpușe (*Dermatocentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) între 7 și 28 zile de la data aplicării produsului. Produsul nu și-a demonstrat eficiența împotriva căpușelor deja prezente.

#### **5. CONTRAINDICAȚII**

Nu se utilizează la câinii cu o vîrstă mai mică de 8 săptămâni și/sau cu o greutate corporală mai mică 2 kg.

Nu se utilizează în cazuri de alergie la substanța activă, sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează la animale bolnave sau la cele aflate în convalescență.

Nu se utilizează la iepuri, deoarece pot apărea reacții adverse și chiar moartea.

Acest produs este destinat numai pentru utilizarea pe câini. Nu se utilizează la pisici, acest lucru ar putea duce la supradozare.

#### **6. REACȚII ADVERSE**

În cazul în care câinele s-a lins, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivăție, datorată în principal naturii excipientilor.

Printre reacțiile adverse asteptate extrem de rar, după utilizare se pot observa: reacții cutanate tranzitorii în locul aplicării (decolorarea pielii, pierderea locală a părului, prurit, roșeață) și prurit general sau piedere părului. În mod excepțional, au fost observate după utilizare următoarele: hipersalivăție, semne neurologice reversibile (sensibilitate excesivă a pielii, semne nervoase), vomă sau semne respiratorii.

Evitați supradozarea. Riscul apariției de efecte adverse poate crește în caz de supradozare.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse )
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate )


**7****SPECII ȚINTĂ**

Câini

Acest produs este potrivit pentru câini cu greutatea corporala între 2 și 10 kg.


**8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Cum se aplică Fiprotec:



Calea de administrare – Prin aplicare topică pe piele.

Dozare:

- 1 pipetă de 0,67 ml pentru un câine cu o greutate corporala de peste 2 kg și până la 10 kg greutate corporală. Proporția de dozare este de 6,7 – 33,5 mg fipronil/kg greutate corporală.


Asigurați-vă că utilizați produsul corect, corespunzător greutății corporale a câinelui dumneavoastră.

Numai pentru uz extern.

Păstrați pipetele în ambalajul original până în momentul utilizării.

**9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Utilizați colțurile ușor de dezlipit pentru a scoate pipeta din blister. Nu întepăti folia cu foarfeca, cuțite sau alte instrumente ascuțite, deoarece aceasta ar putea deteriora pipeta din interior.



Tineți pipeta în poziție verticală. Loviți ușor capătul îngust al pipetei pentru a vă asigura că întreg conținutul se află în corpul pipetei. Tăiați vârful pipetei cu o foarfecă.

Faceți loc în părul câinelui, între umeri și baza capului, până când pielea devine vizibila. Puneți vârful pipetei pe piele și aplicați ușor câte jumătate din conținut în cele două locuri de aplicare.

Evitați aplicarea soluției pe blană și nu frecați pielea.

Ar trebui să aveți grijă pentru a evita umezirea excesivă a părului cu produsul, acest lucru provocând un aspect lipicios al părului la locul de tratament. Cu toate acestea, în cazul în care apare acest lucru, va dispărea de obicei, în termen de 24-48 ore de la aplicare.

În absența studiilor privind siguranța, intervalul minim dintre tratamente este de 4 săptămâni.

## **10. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se utiliza imediat după prima deschidere a blisterului.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

Păstrați pipeta în blister și în cutie până în momentul utilizării, pentru a fi protejată de lumină.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

## **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

### Precauții speciale pentru fiecare specie țintă:

Pentru un control optim al infestării cu purici în gospodăriile cu multe animale de companie, toate animalele din gospodării trebuie să fie tratate cu un insecticid adecvat.

Puricii animalelor de companie infestează adesea coșul animalelor, locurile unde animalele dorm și se odihnesc, precum covoare și mobilier moale, care trebuie să fie tratate în mod regulat cu insecticide adecvate și curatare cu ajutorul unui aspirator, în cazul infestațiilor masive sau în momentul începerii aplicării măsurilor de control.

Nu se cunosc informații cu privire la efectul pe care îl are îmbăierea/șamponarea asupra eficacității la câini. Șamponarea anterioară sau prea frecventă după tratament poate reduce eficacitatea produsului.

Produsul nu previne atașarea căpușelor de animal. În plus, eficacitatea împotriva căpușelor deja existente nu a fost demonstrată. Din acest motiv, transmiterea bolilor infecțioase nu poate fi exclusă.

Este cunoscut că produsul protejează împotriva infestațiilor noi cu căpușe între 7-28 zile de la data aplicării produsului. Totuși, nu este cunoscut dacă eficiența împotriva infestării cu căpușe persistă și peste 4 săptămâni. De aceea pot să apară perioade neacoperite de protecție împotriva infestațiilor după aplicarea produsului, chiar dacă acesta este aplicat la un interval de minim 4 săptămâni.

### Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Numai pentru uz extern. Nu aplicați produsul pe pielea cu răni sau leziuni.

Evitați contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență.

**Animalele trebuie să fie căntărite cu precizie înainte de începerea tratamentului.**

**Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă a corpului la care animalul nu poate ajunge să se lingă și că animalele nu se pot linge unele pe altele după tratament.**

Nu se cunosc informații cu privire la toxicitatea potențială a produsului asupra cățeilor mai mici de 8 săptămâni ce intră în contact cu căteaua căreia i s-a aplicat tratamentul. Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

A nu se utiliza simultan cu alte produse contra puricilor care se aplică direct pe animal.

**Precautii speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:**

Păstrați pipetele în ambalajul original până când sunt pregătite pentru utilizare și aruncați imediat pipetele folosite.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută (alergie) la fipronil sau la oricare dintre excipienti, trebuie să evite contactul cu produsul. Evitați contactul conținutului cu degetele. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați mâinile cu apă și săpun.

Acest produs poate provoca iritarea mucoasei sau a ochilor. Prin urmare, trebuie evitat contactul produsului cu gura sau ochii.

După expunerea oculară accidentală, spălați ochii din abundență cu apă curată.

Ingerarea produsului este nocivă. Nu lăsați pipetele la îndemâna copiilor și eliminați imediat pipetele utilizate după aplicarea produsului. În cazul ingestiei accidentale, consultați medicul și arătați-i prospectul sau eticheta.

Animalele tratate nu trebuie să fie manipulate până ce locul de aplicare al produsului nu s-a uscat, iar copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până ce locul de aplicare nu s-a uscat. Prin urmare, se recomandă să nu se aplice tratamentul în timpul zilei, ci la începutul serii, iar animalelor tratate recent nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii lor, mai ales cu copii.

Nu fumați, nu consumați băuturi și nu mâncați în timpul aplicării.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

**Alte precautii:**

Fipronilul poate afecta negativ organismele acvatice.

Câinilor nu trebuie să li se permită să înnoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare. Produsul poate afecta suprafetele vopsite, lăcuite sau alte tipuri de suprafete din gospodărie sau mobilierul.

**Incompatibilități majore**

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

**Gestătie și lactație:**

Nu utilizați produsul la cățele gestante sau în lactație.

Studiile de laborator privind utilizarea de fipronil au demonstrat că acesta nu produce efecte teratogene sau fetotoxice. Siguranța acestui produs nu a fost stabilită pentru cățelele gestante sau în lactație, a se utiliza numai în conformitate cu evaluarea raportului beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil. Dacă animalele sunt tratate în timpul perioadei de lactație, vezi Precautii speciale pentru utilizare la animale.

**Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot):**

Nu au fost demonstrate efecte adverse în urma studiilor de toleranță efectuate la cătei de până la 8 săptămâni, cătei în perioada de creștere și la câini cu greutatea corporală de aproximativ 2 kg, care au fost tratați cu doze de până la 5 ori doza recomandată. Riscul apariției de efecte adverse poate însă să crească odată cu supradozarea. Prin urmare, este recomandat să tratați întotdeauna animalele cu pipeta de mărime corespunzătoare.

**13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Produsul poate afecta negativ organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, râurile sau canalele cu aceste produse sau cu ambalajele lor goale.

**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

Octombrie 2019

**15. ALTE INFORMAȚII**

1, 2, 3, 4, 6 pipete sunt ambalate într-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.