

ETICHETA-PROSPECT**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Deținătorul avizului de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

S.C. VANELLI S.R.L.
Sos Iasi-Tg-Frumos, km. 10
Iasi, 707410-RO
Tel.: +40 232 253 442
Fax: +40232 253 456
e-mail: office@vanellivet.ro,
www.vanellivet.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

FIPROVAN 2,5mg / ml, spray cutanat , soluție pentru păsările de colivie
Fipronil

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml soluție conține:

Substanța activă:

Fipronil 2,5 mg

Excipienti: alcool izopropilic, apă

4. INDICAȚII

Tratamentul infestațiilor cu căpușe (*Dermanyssus* spp), păduchi malofagi (*Columbicola columbae*, *Lipeurus* spp), purici (*Ctenocephalides columbae*) la păsări de colivie.

5. CONTRAINDICAȚII


A nu se utiliza la animale altele decât cele pentru care este indicat.

A nu se administra la iepuri.

Nu se tratează puii sub vârsta de o lună.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienti.





6. REACȚII ADVERSE

În unele cazuri pot să apară: salivație abundentă care se remite în scurt timp; rar pot să apară reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, căderea penelor pe zona aplicării, prurit, eritem) și prurit general sau căderea penelor pe tot corpul, foarte rar semne neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, agitație) sau regurgitare după utilizare.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Păsări de colivie.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Calea de administrare : aplicare cutanată, prin pulverizare la nivelul pielii.

Produsul se administrează prin pulverizare de la o distanță de 10 - 20 cm în sensul invers de creștere al penelor, până la piele. Se aplică pe spate, piept, picioare, gât. Zona capului se tratează prin pulverizarea produsului pe o mânășă după care se aplică pe penajul capului și în jurul ochilor.

Doza este de 0,5 ml produs/ kg greutate corporală, echivalent cu 1,2 mg fipronil / kg greutate corporală (4 pulverizări/ kg greutate corporală)

Produsul este eficace timp de 4 săptămâni.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizați produsul dacă observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, la temperaturi mai mici de 25°C.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.



12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ.

Toxic pentru pești și animale acvatice.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

13. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE):

Precauții speciale de utilizare:

Precauții speciale de utilizare la animale:

Se va lăsa să se usuce natural, păsările nu se vor șterge cu prosopul.

A se evita contactul produsului cu ochii păsărilor.

Precauții speciale care trebuie luate de către persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preveni orice efecte neplăcute, la manipularea produsului se recomandă purtarea mănușilor. Spălați bine mâinile după contactul cu produsul.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii, adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta.

Interacțiuni cu alte produse medicinale veterinare și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

14. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA

Numai pentru uz veterinar.

15. NUMARUL AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

16. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

< Serie> < Lot> < BN> {număr}

17. DATE ÎN BAZA CARORA A FOST APROBATA ULTIMA DATA ETICHETA-- PROSPECTUL

Noiembrie 2017

18. ALTE INFORMATII

Dimensiuni de ambalaj:

Flacon cu pulverizator și bușon din PP x 100 ml

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.