

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Flevox 134 mg spot-on soluție pentru câini de talie medie.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

fiecare pipetă de 1.34 ml conține:

Substanța activă:

Fipronil 134 mg

Excipienți:

Butilhidroxianisol (E320) 0.536 mg

Butilhidroxitoluen (E321) 0.268 mg

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot-on

Soluție limpede de culoare galbenă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Câini

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

La câini:

Tratamentul infestației cu purici (*Ctenocephalides spp.*) și păduchi malofagi (*Trichodectes canis*) la câini.

Eficiența insecticidă, împotriva noilor infestații cu purici adulți, persistă până la 8 săptămâni. Puricii care reinfestează animalul sunt uciși în termen de 48 de ore de la contactul cu acesta. Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament pentru controlul dermatitei alergice produse de purici în cazul în care acest lucru a fost diagnosticat anterior de către un medic veterinar.

Produsul nu a demonstrat un efect imediat acaricid împotriva căpușelor, dar a demonstrat eficacitate acaricidă persistentă până la 4 săptămâni împotriva *Rhipicephalus sanguineus* și *Dermacentor reticulatus* și de până la 3 săptămâni împotriva *Ixodes ricinus*. În cazul în care căpușele aparținând acestor specii sunt prezente în momentul aplicării produsului, nu toate capusele vor fi ucise în primele 48 de ore dar pot fi ucise într-o săptămână.

4.3 Contraindicații

Nu se utilizează la cățeei mai mici de 8 săptămâni și/sau cu greutate mai mică de 2 Kg, în cazul în care nu se cunosc alte date.

Nu se administrează animalelor bolnave (boli sistemice, febră...) sau în convalescență.

Nu se administrează la iepuri, deoarece pot apărea reacții adverse și chiar moartea.

Nu se administrează în cazul hipersensibilității la fipronil sau la oricare dintre excipienți.

Nu se administrează oral.

Acest produs a fost creat special pentru câini. Nu se folosește la pisici pentru că poate duce la supradozare.



4.4 Precauțiuni speciale pentru fiecare specie țintă

Puricii animalelor de companie infestază adesea coșul acestora, așternutul și zona de odihnă, covorașele și decorațiunile interioare, care ar trebui tratate, în cazul infestațiilor masive și la începutul măsurilor de control, cu un insecticide adecvat și aspirate în mod regulat.

Căpușele aflate pe animal înaintea aplicării tratamentului ar putea să nu fie ucise în primele 48 de ore după aplicare, dar pot fi ucise într-o săptămână. Este recomandată îndepărtarea căpușelor aflate pe animal înaintea aplicării tratamentului. Produsul nu previne atașarea căpușelor de animal. Dacă animalul a fost tratat înaintea expunerii la atacul cu căpușe, majoritatea căpușelor vor fi ucise în termen de 48 de ore de la infestare. Acest lucru se întâmplă, de obicei, înainte ca acestea să ajungă la saturație, ceea ce limitează dar nu exclude riscul transmiterii de boli. Odată ucise, căpușele cad de cele mai multe ori de pe animal, cele rămase putând fi îndepărtate printr-o tragere ușoară.

Nu sunt disponibile date cu privire la influența îmbăierii/șamponării asupra eficacității produsului. Prin urmare, îmbăierea/imersarea în apă timp de 2 zile de la aplicare și îmbăierile mai frecvente decât o dată pe săptămână trebuie evitate.

Pentru controlul optim al infestării cu purici, în gospodăriile cu mai multe animale de casă, toți câinii și toate pisicile din acestea ar trebui să fie tratate cu insecticid adecvat.

Când este utilizat ca parte a strategiei de tratament a dermatitei alergice determinată de atacul cu purici, se recomandă aplicații lunare atât la pacient cât și la ceilalți câini și pisici din gospodărie.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Animalele ar trebui cântărite cu precizie înaintea administrării tratamentului.

A se evita contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii clătiți imediat cu multă apă.

Nu aplicați produsul pe răni sau pe pielea deteriorată.

Nu au fost efectuate studii de siguranță specifice cu privire la administrările repetate, fiind bine cunoscut profilul sigur al substanței active și al excipienților.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Acest produs poate provoca iritarea ochilor și mucoaselor. Prin urmare ar trebui evitat contactul cu ochii și gura.

În cazul contactului accidental cu ochii clătiți imediat cu multă apă. Dacă iritația persistă cereți sfatul medicului și prezentați acestuia ambalajul sau prospectul produsului.

Evitați contactul conținutului cu degetele. Dacă acest lucru se întâmplă, spălați mâinile cu apă și săpun. Spălați mâinile după utilizare.

A nu se fuma, bea sau mânca în timpul aplicării.

Persoanele cu o hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau orice excipient ar trebui să evite contactul cu produsul.

Animalele tratate nu pot fi manipulate până când locul de elecție nu este uscat, iar copiii ar trebui să evite joaca cu animalele tratate până când locul unde a fost aplicat produsul este complet uscat. Este recomandat, prin urmare, ca animalele să nu fie tratate ziua, ci seara devreme, iar cele tratate recent nu ar trebui să doarmă în pat cu proprietarul, în special cu copiii.

Alte precauții

Fipronilul poate avea efecte negative asupra organismelor acvatice. Câinilor nu ar trebui să li se permită înotul în cursurile de apă timp de 2 zile după aplicare.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Dacă animalul se linge, poate să apară hipersalivația pentru o scurtă perioadă, în principal datorită naturii substanței de transport.

Printre reacțiile adverse, întâlnite extrem de rar, apar reacții cutanate tranzitorii la locul de aplicație (decolorarea pielii, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit generalizat, sau alopecie.

În nod excepțional, după administrare pot să apară hipersalivație, semne neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, semen nervoase), vărsături sau semen respiratorii.



4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Studiile de laborator nu au arătat că fipronilul ar avea efecte teratogene sau embriotoxice. Nu există studii realizate cu acest produs pe cățele gestante sau care alăptează. Folosiți produsul în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc făcută de medicul veterinar responsabil.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Doar pentru uz extern.

Aplicați topic o pipetă de 1.34 ml pentru un câine cu greutate corporală de la 10 kg până la 20kg.

Intervalul minim între tratamente este de 4 săptămâni.

Modul de administrare:

Separați blana între omoplați până ce pielea devine vizibilă. Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți ușor pentru a goli conținutul direct pe piele.

Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă în care animalul nu se poate linge, și că animalele nu se ling între ele după tratament.

Se va evita, cât este posibil, umezirea excesivă a părului cu produsul, deoarece acest lucru dă un aspect lipicios firelor de păr de la locul aplicării. Oricum acest fenomen apare după administrare și poate dura de la 24 de ore până la două săptămâni.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu au fost observate reacții adverse la animalele țintă în urma studiilor de siguranță efectuate pe câini și căței de 8 săptămâni și mai mari, cu greutatea în jur de 2 Kg, tratați cu doze de până la 5 ori mai mari decât doza recomandată. Riscul apariției efectelor secundare poate crește însă în cazul supradozării, astfel încât ar trebui folosită întotdeauna doza recomandată în funcție de greutatea corporală.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide pentru uz topic, inclusiv insecticide.

Codul veterinary ATC: QP53AX15

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Fipronil este un insecticid și acaricid care aparține familiei fenilpirazolelor. Acesta acționează prin inhibarea complexului GABA, foarte important în funcționarea canalului de clor, blocând astfel transferul pre- și post- sinaptic al ionilor de clor prin membrane celulară. Rezultă o activitate necontrolată a sistemului nervos central și moartea insectelor sau acarienilor.

Fipronilul inhibă, de asemenea, canalele de clor activate de glutamat (GluCl_s) întâlnite doar la nevertebrate.

5.2 Particularități farmacocinetice

După aplicarea locală de fipronil la câine, acesta este ușor absorbit prin piele. Cantități mici de fipronil pot fi detectate în plasmă, cu variabilitate foarte crescută între câini. După aplicare, are loc o bună distribuire a substanței în păr, prezentând un bun gradient de concentrație între zona de aplicare și zonele periferice.

Metabolitul principal este derivat sulfonă de fipronil, care posedă, de asemenea, proprietăți insecticide și acaricide. Concentrația de fipronil în păr scade odată cu trecerea timpului.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Povidonă (K17)
Butilhidroxianisol (E320)
Butilhidroxitoluen (E321)
Dietilen glicol monoetileter

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Ambalajul primar este o pipetă fabricată din poliacrilonitril / polipropilenă –copolimer olefină ciclic - polipropilenă / polipropilenă termoformată sigilată cu poliacrilonitril / aluminiu /capac din folie de polietilenă tereftalat.

Fiecare pipetă este introdusă într-un blister individual.

Cutie de carton care conține 1 blister cu 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 3 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 6 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 30 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 36 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 50 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Fipronilul poate afecta organismele acvatice. Nu contaminați apele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau pipetele goale

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

VETOQUINOL SA
MAGNY VERNOIS
F-70200 LURE
FRANȚA



8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI


<{DD/MM/YYYY}> <{DD month YYYY}>...

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

{MM/YYYY} or <month YYYY>

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.



ANEXA III
ETCHETARE ȘI PROSPECT



A. ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

FLEVOX SPOT ON CÂINI 10-20 kg

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Flevox 134 mg spot on soluție pentru câini de talie medie.
Fipronil

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

O pipetă de 1.34 ml conține:

Fipronil	134 mg
Butilhidroxianisol (E320)	0.536 mg
Butilhidroxitoluen (E321)	0.268 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot on

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 pipetă cu 1.34 ml
3 pipete cu 1.34 ml
6 pipete cu 1.34 ml
30 pipete cu 1.34 ml
36 pipete cu 1.34 ml
50 pipete cu 1.34 ml

5. SPECII ȚINTĂ

Câini

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Tratamentul infestației cu purici și păduchi malofagi, controlul dermatitei alergice la purici.
Citiți prospectul înainte de utilizare.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare

8. TIMP DE AȘTEPTARE


Nu este cazul

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare

10. DATA EXPIRĂRII

EXP { lună/an }>



11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

~~Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.~~

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: citiți prospectul.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

VETOQUINOL SA
MAGNY-VERNOIS
F-70200 LURE
FRANȚA

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ

BLISTER – FLEVOX SPOT ON CÂINI 10-20 kg

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Flevox 134 mg spot on soluție pentru câini de talie medie

Fipronil

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Fipronil 134 mg

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1.34 ml

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE



Pictograma pentru calea de administrare

5. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot

7. DATA EXPIRĂRII


EXP { lună/an }

8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII

PIPETTE – FLEVOX SPOT ON PENTRU CÂINI DE 10-20 kg



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Flevox 134 mg ~~spot on, soluție~~ pentru câini de talie mare
Fipronil

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Vetoquinol

3. DATA EXPIRĂRII

EXP { lună/an }

4. NUMĂRUL SERIEI

Lot

5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

~~Numai pentru uz veterinar~~



~~Pictograma de specie țintă pentru tratamentul animalelor și forma farmaceutică~~



B. PROSPECT

PROSPECT

Flevox 67 mg spot-on soluție pentru câini de talie mică
Flevox 134 mg spot-on soluție pentru câini de talie medie
Flevox 268 mg spot-on soluție pentru câini de talie mare
Flevox 402 mg spot-on soluție pentru câini de talie foarte mare



1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producător

VETOQUINOL SA
MAGNY VERNOS
F-70200 LURE
FRANȚA

Producător pentru eliberarea seriei:

VETOQUINOL BOWET Sp. Z.o.o.
UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 13/14
66-400 GORZÓW WLKP
POLONIA

Or

VETOQUINOL SA
MAGNY VERNOS
F-70200 LURE
FRANȚA

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Flevox 67 mg spot-on soluție pentru câini de talie mică
Flevox 134 mg spot-on soluție pentru câini de talie medie
Flevox 268 mg spot-on soluție pentru câini de talie mare
Flevox 402 mg spot-on soluție pentru câini de talie foarte mare

Fipronil

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Fiecare pipetă conține:

	Flevox câini de talie mică	Flevox câini de talie medie	Flevox câini de talie mare	Flevox câini de talie foarte mare
Substanța activă Fipronil	67 mg	134 mg	268 mg	402 mg
Excipienți:				
Butilhidroxianisol (E320)	0.268 mg	0.536 mg	1.072 mg	1.608 mg
Butilhidroxitoluen (E321)	0.134 mg	0.268 mg	0.536 mg	0.804 mg

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

La câini:

Tratamentul infestației cu purici (*Ctenocephalides spp.*) și păduchi malofagi (*Trichodectes canis*) la câini.

Eficiența insecticidă, împotriva noilor infestații cu purici adulți, persistă până la 8 săptămâni. Puricii care reinfestează animalul sunt uciși în termen de 48 de ore de la contactul cu acesta. Produsul

poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament pentru controlul dermatitei alergice produse de purici în cazul în care acest lucru a fost diagnosticat anterior de către un medic veterinar.

Produsul nu a demonstrat un efect imediat acaricid împotriva căpușelor, dar a demonstrat eficacitate acută persistentă până la 4 săptămâni împotriva *Rhipicephalus sanguineus* și *Dermacentor reticulatus* și de până la 3 săptămâni împotriva *Ixodes ricinus*. În cazul în care căpușele aparținând acestor specii sunt prezente în momentul aplicării produsului, nu toate capusele vor fi ucise în primele 48 de ore dar pot fi ucise într-o săptămână.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la cățelei mai mici de 8 săptămâni și/sau cu greutate mai mică de 2 Kg, în cazul în care nu se cunosc alte date.

Nu se administrează animalelor bolnave (boli sistemice, febră...) sau în convalescență.

Nu se administrează la iepuri, deoarece pot apărea reacții adverse și chiar moartea.

Nu se administrează în cazul hipersensibilității la fipronil sau la oricare dintre excipienți.

Nu se administrează oral

Acest produs a fost creat special pentru câini. Nu se folosește la pisici pentru că poate duce la supradozare.

6. REACȚII ADVERSE

Dacă animalul se linge, poate să apară hipersalivația, pentru o scurtă perioadă, în principal datorită naturii substanței de transport.

Printre reacțiile adverse, întâlnite extrem de rar, apar reacții cutanate tranzitorii la locul de elecție (decolorarea pielii, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit generalizat, sau alopecie.

În nod excepțional, după administrare pot să apară hipersalivație, semne neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, semen nervoase), vărsături sau semen respiratorii.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doar pentru uz extern.

Aplicați topic:

*1 pipetă de 0.67ml pentru câini cu greutate corporală de la 2kg până la 10kg

*1 pipetă de 1.34ml pentru câini cu greutate corporală de la 10kg până la 20kg



*1 pipetă de 2.68ml pentru câini cu greutate corporală de la 20kg până la 40kg

*1 pipetă de 4.02ml pentru câini cu greutate corporală de la 40kg până la 60kg

Pentru câinii peste 60kg folosiți două pipete de 2.68ml.

Intervalul minim între tratamente este de 4 săptămâni.

Separați blana între omoplați până ce pielea devine vizibilă. Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți ușor pentru a goli conținutul direct pe piele.



Este important să vă asigurați că produsul este aplicat într-o zonă în care animalul nu se poate linge, și că animalele nu se ling între ele după tratament.

Se va evita, cât este posibil, umezirea excesivă a părului cu produsul, deoarece acest lucru dă un aspect lipicios firelor de păr de la locul aplicării. Oricum acest fenomen apare după administrare și poate dura de la 24 de ore până la două săptămâni.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu există.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Puricii animalelor de companie infestază adesea coșul acestora, așternutul și zona de odihnă, covoarele și decorațiunile interioare, care ar trebui tratate, în cazul infestațiilor masive și la începutul măsurilor de control, cu un insecticide adecvat și aspirate în mod regulat.

Căpușele aflate pe animal înaintea aplicării tratamentului ar putea să nu fie ucise în primele 48 de ore după aplicare, dar pot fi ucise într-o săptămână. Este recomandată îndepărtarea căpușelor aflate pe animal înaintea aplicării tratamentului. Produsul nu previne atașarea căpușelor de animal. Dacă animalul a fost tratat înaintea expunerii la atacul cu căpușe, majoritatea căpușelor vor fi ucise în termen de 48 de ore de la infestare. Acest lucru se întâmplă, de obicei, înainte ca acestea să ajungă la saturație, ceea ce limitează dar nu exclude riscul transmiterii de boli. Odată ucise, căpușele cad de cele mai multe ori de pe animal, cele rămase putând fi îndepărtate printr-o tragere ușoară.

Nu sunt disponibile date cu privire la influența îmbăierii/șamponării asupra eficacității produsului. Prin urmare, îmbăierea/imersarea în apă timp de 2 zile de la aplicare și îmbăierile mai frecvente decât o dată pe săptămână trebuie evitate.

Pentru controlul optim al infestării cu purici, în gospodăriile cu mai multe animale de casă, toți câinii și toate pisicile din acestea ar trebui să fie tratate cu insecticid adecvat.

Când este utilizat ca parte a strategiei de tratament a dermatitei alergice determinată de atacul cu purici, se recomandă aplicații lunare atât la pacient cât și la ceilalți câini și pisici din gospodărie.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Animalele ar trebui cântărite cu precizie înaintea administrării tratamentului.

A se evita contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii clătiți imediat cu multă apă.

Nu aplicați produsul pe răni sau pe pielea deteriorată.

Nu au fost efectuate studii de siguranță specifice cu privire la administrările repetate, fiind bine cunoscut profilul sigur al substanței active și al excipienților.



Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Acest produs poate provoca iritarea ochilor și mucoaselor. Prin urmare ar trebui evitat contactul cu ochii și gura.

În cazul contactului accidental cu ochii clătiți imediat cu multă apă. Dacă iritația persistă cereți sfatul medicului și prezentații acestuia ambalajul sau prospectul produsului.

Evitați contactul conținutului cu degetele. Dacă acest lucru se întâmplă, spălați mâinile cu apă și săpun. Spălați mâinile după utilizare.

A nu se fuma, bea sau mânca în timpul aplicării.

Persoanele cu o hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau orice excipient ar trebui să evite contactul cu produsul.

Animalele tratate nu pot fi manipulate până când locul de elecție nu este uscat, iar copiii ar trebui să evite joaca cu animalele tratate până când locul unde a fost aplicat produsul este complet uscat. Este recomandat, prin urmare, ca animalele să nu fie tratate ziua, ci seara devreme, iar cele tratate recent nu ar trebui să doarmă în pat cu proprietarul, în special cu copiii.

Alte precauții

Fipronilul poate avea efecte negative asupra organismelor acvatice. Câinilor nu ar trebui să li se permită înotul în cursurile de apă timp de 2 zile după aplicare.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Studiile de laborator nu au arătat că fipronilul ar avea efecte teratogene sau embriotoxice. Nu există studii realizate cu acest produs pe cățele gestante sau care alăptează. Folosiți produsul în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc făcută de medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu au fost observate reacții adverse la animalele țintă în urma studiilor de siguranță efectuate pe câini și căței de 8 săptămâni și mai mari, cu greutatea în jur de 2 Kg, tratați cu doze de până la 5 ori mai mari decât doza recomandată. Riscul apariției efectelor secundare poate crește însă în cazul supradozării, astfel încât ar trebui folosită întotdeauna doza recomandată în funcție de greutatea corporală.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Fipronilul poate afecta organismele acvatice. Nu contaminați apele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau pipetele goale

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Forma de ambalare

Flevox 67 mg spot-on soluție pentru câini de talie mică

Cutie de carton care conține 1 blister cu 1 pipeta de 0.67 ml
Cutie de carton care conține 3 blistere cu câte 1 pipeta de 0.67 ml
Cutie de carton care conține 6 blistere cu câte 1 pipeta de 0.67 ml
Cutie de carton care conține 30 blistere cu câte 1 pipeta de 0.67 ml
Cutie de carton care conține 36 blistere cu câte 1 pipeta de 0.67 ml
Cutie de carton care conține 50 blistere cu câte 1 pipeta de 0.67 ml

Flevox 134 mg spot-on soluție pentru câini de talie medie

Cutie de carton care conține 1 blister cu 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 3 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 6 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 30 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 36 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml
Cutie de carton care conține 50 blistere cu câte 1 pipeta de 1.34 ml

Flevox 268 mg spot-on soluție pentru câini de talie mare

Cutie de carton care conține 1 blister cu 1 pipeta de 2.68 ml
Cutie de carton care conține 3 blistere cu câte 1 pipeta de 2.68 ml
Cutie de carton care conține 6 blistere cu câte 1 pipeta de 2.68 ml
Cutie de carton care conține 30 blistere cu câte 1 pipeta de 2.68 ml
Cutie de carton care conține 36 blistere cu câte 1 pipeta de 2.68 ml
Cutie de carton care conține 50 blistere cu câte 1 pipeta de 2.68 ml

Flevox 402 mg spot-on soluție pentru câini de talie foarte mare

Cutie de carton care conține 1 blister cu 1 pipeta de 4.02 ml
Cutie de carton care conține 3 blistere cu câte 1 pipeta de 4.02 ml
Cutie de carton care conține 6 blistere cu câte 1 pipeta de 4.02 ml
Cutie de carton care conține 30 blistere cu câte 1 pipeta de 4.02 ml
Cutie de carton care conține 36 blistere cu câte 1 pipeta de 4.02 ml
Cutie de carton care conține 50 blistere cu câte 1 pipeta de 4.02 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.