

1 DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

GALLIMUNE SE+ST

2 COMPOZITIE CALITATIVA SI CANTITATIVA

Fiecare doza de 0,3 ml de vaccin contine :

- *Salmonella Enteritidis PT4 inactivata , cel putin.....* 142 unitati mOD
- *Salmonella Typhimurium DT 104 inactivata, cel putin* 71 unitati mOD
- *Thiomersal, cel mult* 30 µg
- *Ulei de parafina (ca adjuvant).....* q.s. 0,3 ml

unitati mOD : cantitatea de bacterii, masurata prin densitate optica la 562 nm dupa inactivare

Pentru lista completa a excipientilor, vezi partea 6.1.

3 FORMA FARMACEUTICA

Emulsie uleioasa injectabila

4 PARTICULARITATII CLINICE**4.1 Specii tinta**

Pasari (tineret reproductie si tineret gaini ouatoare)

4.2 Indicatii:

Imunizarea activa a tinereturui reproductie si gaini ouatoare:

- Pentru a reduce rezisolarea *Salmonella Enteritidis* de la nivelul organelor genitale si a tractului intestinal, si consecutiv a contaminarii cojii oualelor si a contaminarii transovariene a oualelor.
- Pentru a reduce rezisolarea *Salmonella Typhimurium* de la nivelul tractului intestinal si consecutiv a contaminarii cojii oualelor.

Imunitatea a fost demonstrata prin infectie de control. Imunitatea se instaleaza la 4 saptamani dupa vaccinare si persista pana la sfarsitul perioadei de ouat.

4.3 Contra-indicatii

Nu exista.

4.4 Avertizarii speciale

Nu exista.

4.5 Precautii speciale de utilizare**Precautii speciale de utilizare la pasari**

Vaccinati numai pasarile sanatoase.


Precautii speciale pentru persoana care administreaza vaccinul la pasari:

Pentru persoana ce administreaza vaccinul:

Acest produs contine ulei mineral. Injectarea accidentală / autoinjectarea poate determina inflamatie si durere la locul injectiei in special daca aceasta sa produs la nivelul articulatiei sau a degetului, si in cazuri rare poate determina pierderea degetului afectat daca nu se acorda atentie medicala prompta.

Daca in mod accidental va injectati cu acest produs , trebuie sa primiti atentie medicala prompta chiar daca sa injectat o cantitate foarte mica de produs si prezentati medicului prospectul produsului.

Daca durerea persista mai mult de 12 ore de la examinarea medicala, este necesar un nou examen medical.



Pentru medic:

Acest produs contine ulei mineral. Chiar si o cantitate mica daca a fost injectata accidental aceasta poate provoca o inflamatie intensa, care poate determina de exemplu o necroza ischemica si chiar pierderea degetului. Atentia medicala-chirurgicala, PROMPTA, este necesara si poate necesita o incizie si irigarea zonei unde sa injectat accidental, in special daca este implicata pulpa degetului sau tendonul.

4.6 Reactii adverse (frecvente si severe)

Vaccinarea poate determina o reactie inflamatorie la locul injectiei. O usoara intarziere la intrarea in ouat poate fi observata, insa fara impact asupra varful productiei sau a productivitatii in general.

4.7 Utilizarea in perioada de productie

Nu se foloseste la mai putin de 2 saptamani inainte de intrarea in ouat sau in timpul perioadei de ouat.

4.8 Interactiuni cu alte produse medicinale si alte forme de interactiuni

Nu sunt disponibile informatii referitoare la siguranta si eficacitate in cazul administrarii altor vaccinuri concurente cu exceptia vaccinurilor inactive pentru pasari din gama Merial. Se recomanda de asemenea sa nu se administreze alte vaccinuri cu 14 zile inainte sau dupa vaccinarea cu acest vaccin.

4.9 Metoda de administrare si doza

Vaccinul se administreaza pe cale subcutanata sau intramusculara o doza (0,3 ml) de vaccin, urmarind urmatoarea schema de vaccinare:

- prima injectie : de la varsta de 6 saptamani
- a doua injectie : la varsta de 16 saptamani, si la cel putin 4 saptamani de la prima injectie.

Agitati bine inainte de utilizare.

Aplicati procedurile aseptice.

Nu folositi seringi cu piston din cauciuc natural sau butyl elastomer.

Echipamentul include ace si seringi care trebuie sa fie sterile inainte de utilizare.

4.10 Supradozare (simptome, urgente, antidot) daca este necesar

Nu au fost observate alte efecte adverse dupa administrarea unei supradoze de vaccin in afara celor mentionate la paragraful "Reactii adverse"


4.11 Perioada de asteptare

Zero zile.

5. PROPRIETATI IMUNOLOGICE

Vaccin inactivat cu adjuvant uleios impotriva *Salmonella Enteritidis* si *Salmonella Typhimurium*. Vaccinul stimuleaza imunitatea activa a tineretului de reproducie si gaini ouatoare impotriva *Salmonella Enteritidis* si *Salmonella Typhimurium*.

Tulpina SE este clasificata ca fagotip 4, iar tulpina ST este clasificata ca tipul Definitiv DT 104.
ATCvet cod :QI01AB01



6. PARTICULARITATI FARMACEUTICE**6.1 Lista excipientilor**

- Tiomersal
- Polisorbat 80
- Sorbitan oleat
- Apa pentru injectii

6.2 Incompatibilitati

A nu se amesteca cu alte vaccinuri sau produse imunologice.

6.3 Valabilitate

Perioada de valabilitate ca produs ambalat pentru vanzare.
18 luni

Perioada de valabilitate imediat dupa deschiderea ambalajului (flaconului)
A se folosi imediat dupa deschiderea flaconului

6.4 Precautii speciale de depozitare

A se pastra la temperatura cuprinsa intre +2°C si +8°C, ferit de lumina.A nu se congele.

6.5 Natura si continutul ambalajului (flaconului)

Natura a elementelor primare ale ambalajului :

- flacon din Polypropilena
- dop din nitril elastomer
- capac de aluminiu

6.6 Precautii speciale pentru vaccinul nefolosit (flacoane deschise si nefolosite) si a tuturor materialelor deriveate din utilizarea unpor astfel de produse

Orice produs nefolosit sau material trebuie degradat in concordanta cu cerintele nationale.

7 DETINATORUL AUTORIZATIEI DE MARKETING

MERIAL Italia S.p.A

Sediul administrativ in Milanofiori – Strada 6- Palazzo E5 – 20090 Assago (MI) si sediul de productie in Via Baviera 9 – 35027 Noventa Padovana (PD)





GALLIMUNE Se +St

Vaccin inactivat, impotriva infectiilor cu **Salmonella Enteritidis si cu Salmonella Typhimurium la pasari**

Compozitie :

Fiecare doza de 0,3 ml de vaccin contine :

- **Salmonella Enteritidis PT4 inactivata , cel putin.....142 unitati mOD**
- **Salmonella Typhimurium DT 104 inactivata, cel putin71 unitati mOD**
- **Thiomersal, cel mult30 µg**
- **Ulei de parafina (ca adjuvant).....q.s. 0,3 ml**

unitati mOD : cantitatea de bacterii, masurata prin densitate optica la 562 nm dupa inactivare.

Indicatii pentru utilizare:

Imunizarea activa a tineretului de reproductie si tineret rase usoare (gaini oua consum).

- Pentru a reduce reisolarea S. Enteritidis din organele genitale si tractul intestinal, si consecutiv pentru a reduce contaminarea cojii ouelor si contaminarea transovariana a ouelor.
- Pentru a reduce reisolarea S. Typhimurium din tractul intestinal, si consecutiv pentru a reduce contaminarea cojii ouelor.

Imunitatea a fost demonstrata prin infectii de control. Aceasta (imunitatea) incepe sa se instaleze la 4 saptamani de la vaccinare si persista pana la sfarsitul perioadei de ouat.

Proprietati imunologice :

Vaccin inactivat cu adjuvant uleios impotriva **Salmonella Enteritidis si Salmonella Typhimurium**. Vaccinul stimuleaza imunitatea activa la tineretul de reproductie rase grele si tineret rase usoare impotriva **Salmonella Enteritidis si Salmonella Typhimurium**.

Tulpina SE este clasificata ca phagotip 4, iar tulpina ST este clasificata ca Tip Definitiv DT 104.

Mod de administrare si dozare :

Se administreaza pe cale intramusculara sau subcutanata in doza de 0,3 ml vaccin / pasare, dupa urmatoarea schema de vaccinare :

- prima administrare : incepand cu varsta de 6 saptamani
- a doua administrare : la varsta de 16 saptamani, sau la cel putin 4 saptamani de la prima vaccinare

A se agita bine inainte de utilizare .

A se aplica prin proceduri aseptice usuale.

A nu se folosi seringi cu piston din cauciuc natural sau elastomer.

Echipamentul format din seringa si ac trebuie sterilizat inainte de utilizare.

Reactii adverse (frecvente si serioase):

La locul vaccinarii poate apare o reactie inflamatorie .

O usoara intarziere in intrarea in ouat poate fi observata, dar nu s-a observat afectarea varfului de productie sau a procentului de ouat in general.

Precautii speciale pentru folosirea la pasari.

A se vaccina numai la pasarile sanatoase.

Precautii speciale in timpul ouatului.

A nu se folosi la mai putin de 2 saptamani inainte de intrarea in ouat sau in timpul perioadei de ouat.

Interactiuni cu alte produse medicamentoase si alte forme de interactiuni

Nu exista informatii disponibile referitoare la siguranta si eficacitate, cand se administreaza impreuna cu alte vaccinuri exceptand gama de vaccinuri inactivate Merial pentru pasari. Se recomanda de asemenea ca nu se administra nici un alt vaccin inainte cu sau dupa 14 zile de la vaccinarea cu vaccin impotriva salmonelozelor.



Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Nu au fost observate alte efecte în afară celor menționate la paragraful "Reactii adverse", după administrarea unei supradoze.

Perioada de așteptare :

Nu este cazul. (0 zile)

Incompatibilitati majore:

A nu se amesteca cu alte vaccinuri sau produse imunologice.

Precautii speciale de pastrare :

A se pastra și transporta, la o temperatură de + 2°C - + 8°C, ferit de lumina. A se feri de inghet.

A se folosi imediat după ce flaconul a fost deschis.

Precautii speciale pentru vaccinul diluat si nefolosit si pentru flacoanele goale

Vaccinul nefolosit se distrugă și se dezinfecțează flacoanele goale înainte de a fi distruse.

INFORMATII ADITIONALE

Pentru persoanele care administrează vaccinul :

Acest produs conține ulei mineral. Injectarea accidentală poate determina apariția unei dureri severe și o reacție inflamatorie, în special dacă a fost injectat la nivelul articulației sau a degetului, și în rare cazuri poate determina pierderea degetului afectat dacă nu se acordă atenție medicală imediată.

Dacă se produce injectarea accidentală cu acest produs, imediat trebuie mers la medic chiar dacă a fost injectată o cantitate foarte mică de produs și arătați medicului prospectul vaccinului.

Dacă durerea persistă mai mult decât 12 ore de la examinarea medicală, mergeți din nou la medic.

Pentru medic:

Acest produs conține ulei mineral. Chiar și o cantitate mică din acest produs injectată accidental poate provoca o puternică reacție inflamatorie, care spre exemplu poate determina necroza ischemică și chiar pierderea degetului. Este necesară intervenția chirurgicală PROMPTĂ și poate necesita o incizie și irigarea zonei, în special dacă injectia a prins tendonul degetului .

Mod de prezentare :

Flacon x 300 ml (1000 doze)

Valabilitate : 18 Iunie


Numai pentru uz veterinar

A se elibera numai pe baza de prescripție medicală.

**TITULARUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ: MERIAL, Milanofiori – Strada 6 – Piazzo E / 5
20090 ASSAGO (MI) – Italia**

**IMPORTATOR: VETECO INTERSERVICES SRL - Str.Mr.Av. Ștefan Sănătescu nr.41, Sect 1 – Bucuresti;
tel:317.03.80/fax:317.03.85**

Insoțiti orice reclamație cu numărul seriei înscris pe etichetă.



PARTICULARITATI MINIME CE TREBUIE SA APARA PE ETICHETA FLACONULUI

FLACON 1000 DOZE

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICAL VETERINAR

Gallimune Se + St
Emulsie uleioasa pentru injectie

2. COMPOZITIE

Pentru fiecare doza de 0.3-ml :

Salmonella Enteritidis PT4 ≥, inactivata..... 142 mOD units*
Salmonella Typhimurium DT 104, inactivata 71 mOD units*

3. CONTINUTUL FLACONULUI CA VOLUM SI NUMAR DE DOZE

1000 doze
300 ml

4. CALEA DE ADMINISTRARE

Calea intramusculara sau subcutanata.

5. WITHDRAWAL PERIOD

Perioada de asteptare: zero zile.

6. NUMARUL LOTULUI

Lot :

7. DATA EXPIRARII

EXP

8. CUVINTELE "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR"

Numai pentru uz veterinar

Pasari (tineret reproductie si tineret gaini ouatoare)
Cititi prospectul produsului inainte de utilizare.

Merial Italia spa
Italy

