



**PROSPECT**  
Gallivac Reo

**NOMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE  
A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL  
PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Deținătorul autorizației de comercializare:

MERIAL Italia S.p.A.,  
Milanofiori – Strada 6 – Palazzo E5 – 20090  
Assago (MI),  
ITALIA

Producător pentru eliberarea seriei:

MERIAL ITALIA SPA  
Via Baviera 9, ZI Camin  
35027 NOVENTA PADOVANA  
ITALIA

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Gallivac Reo - vaccin viu liofilizat împotriva artritei virale (tenosinovita)

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR  
INGREDIENTE (INGREDIENTI)**

Gallivac Reo este un vaccin viu care conține minimum  $10^4$  DICT50/ doză de reovirus aviar, tulpină (S1133) dezvoltată pe culturi celulare de fibroblaste embrionare de pui și liofilizată cu un stabilizator special de protecție

**4 INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Gallivac Reo este recomandat pentru vaccinarea efectivului de reproducție la vârsta de 8-10 zile și la vârsta de 6-8 săptămâni.

**5. CONTRAINDICAȚII**

**6. REACȚII ADVERSE**

**7. SPECII ȚINTĂ**

**8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI  
MOD DE ADMINISTRARE**

Vaccinul se reconstituie prin transferarea a 2-3 ml de diluant în flaconul cu vaccin liofilizat, cu o seringă sterilă. După ce vaccinul se dizolvă, suspensia vaccinală se transferă în flaconul care conține restul de diluant. A se utiliza în maxim o oră după reconstituire. Vaccinul reconstituit se administrează subcutanat în partea dorsală a gâtului. Doza pentru fiecare pasăre este 0.2 ml.

## **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Imunitatea se instalează la 8-10 zile de la vaccinare. De aceea, este foarte important să fie redus la minim riscul de infecție al puiilor cu o tulpină virulentă a virusului artritei aviare înainte ca imunitatea să se instaleze, tineretul trebuie să fie vaccinat cât mai devreme posibil și mutat în hale curate și dezinfectate. GALLIVAC REO nu intervine în schema de vaccinare și oferă efectivului protecție uniformă.

## **10. TIMP DE AȘTEPTARE**

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C). Diluantul trebuie păstrat în loc răcoros și întunecat.

## **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

## **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

## **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

## **15. ALTE INFORMAȚII**

Prezentare

10 flacoane x 1000 doze cu flacoanele aferente de diluant

1 flacon x 1000 doze cu diluantul aferent

Numai pentru uz veterinar.

Merial Italia spa  
Italia