

HIPRAVIAR-TRT4

Vaccin inactivat împotriva Sindromului Capului Umflat, a Bolii Newcastle, a Bronșitei Infecțioase și a Bolii Gumboro, sub formă de emulsie injectabilă.

COMPOZIȚIE:

Virus TRT inactivat(tulpina 1062), Virus inactivat al Bolii Newcastle (tulpina La Sota), Virus inactivat al Bronșitei Infecțioase (tulpina H 52), Virus inactivat al Bolii Gumboro (tulpina W 2512). Adjuvant uleios.

Nevoia controlării Bronșitei Infecțioase și a Bolii Newcastle la păsări RRG în vederea evitării problemelor cauzate de virusii respectivi în timpul creșterii și perioadei de ouat, precum și necesitatea transmiterii la progeni a imunității pasive față de boala Gumboro (pentru controlul Bolii Gumboro subclinice în primele sale zile de viață) și protecția contra îmbolnăvirii ouătoarelor de Sindromul Capului Umflat face inevitabilă utilizarea unui vaccin ca HIPRAVIAR-TRT4. În plus, problemele legate de stress pot fi evitate, din moment ce păsările pot fi imunizate cu un singur vaccin împotriva a patru boli.

INDICAȚII:

RRG: Pentru prevenirea Sindromului Capului Umflat, a Bolii Newcastle, a Bronșitei Infecțioase și a Bolii Gumboro.

MOD DE ADMINISTRARE:

Intramuscular în plept.

DOZARE:

RRG: 1 ml/pasăre.

În general se recomandă vaccinarea înainte de transfer (18 săptămâni).

PERIODA DE AȘTEPTARE:

Zero zile.

PRECAUȚII SPECIALE CE TREBUIESC LUATE DE PERSOANA CE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL ANIMALELOR:

Utilizatorul:

Acest produs conține ulei mineral. Injectarea/autoinjectarea accidentală poate determina dureri serioase și umflături, în special dacă se produce la încheietură sau la deget. Rareori poate duce chiar la pierderea degetului afectat, dacă nu se acordă prompt asistență medicală. În caz de injectare accidentală cu acest produs, chiar și într-o cantitate mică, apălați imediat la asistență medicală și luați ambalajul cu dv. Dacă durerea persistă după 12 ore apălați din nou la medic.

Medicul:

Acest produs conține ulei mineral. Injectarea accidentală, chiar și în cantități mici, poate cauza umflarea zonei afectate, ceea ce la rândul ei poate provoca necroză ischemică sau chiar pierderea degetului. Se impune intervenția promptă a unui specialist, deoarece poate fi necesară incizia timpurie și irigarea zonei injectate, mai ales dacă e vorba de degete sau tendoane.

PRECAUȚII SPECIALE:

-Se recomandă administrarea vaccinului la temperaturi între +15 și +25 °C.

-A se agita înainte și în timpul administrării.

-A se păstra la temperaturi între +2 și +8 °C, evitând congelarea.

PRESENTARE:

Sticle a 500 de doze.

Reg. n° 050225
Prescripție veterinară
PRODUS DE UZ VETERINAR



LABORATORIOS HIPRA, S.A. - AVDA. LA SELVA, 135
17170 AMER (GIRONA) - SPANIA -
TEL. (34) 972 43 06 60