Anexa nr. 2

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

HIPRAVIAR-CLON/H120 liofilizat pentru suspensie pentru administrare oculonazală/ în apa de băut pentru găini

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare doză (0,03 ml) conține:

Substanțe active:

Virusul bolii de Newcastle, viu, tulpina CL/79	$10^{6,5}$ - $10^{7,7}$ DIE_{50}*
Virusul bronșitei infecțioase, viu, tulpina Mass H-120	$10^{3,0}$ - $10^{5,4}$ DIE_{50}*

*Doza infecțioasă 50% pe embrionii de pui

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți	**Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a produsului medicinal veterinar**
Liofilizat:	
Dodecahidrat fosfat disodic	
Fosfat dihidrogenat de potasiu	
Gelatină	
Povidona	
Clorură de sodiu	
Sucroză	
Glutamat monosodic	
Clorură de potasiu	
Diluant:	
Albastru Patentat V (E-131)	0,003 mg
Hidrogenofosfat disodic dodecahidrat	
Clorură de sodiu	
Clorură de potasiu	
Dihidrogenofosfat de potasiu	
Apă pentru preparate injectabile	

Liofilizat: Peletă liofilizată de culoare gălbuie.
Diluant: soluție albăstruie.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Găini.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Pentru imunizarea activă a găinilor în vederea prevenirii mortalităților și semnelor clinice specifice infecției cu virusul bolii de Newcastle și virusul bronșitei infecțioase.
Instalarea imunității: începând cu a 21 a zi post vaccinare
Durata imunității: până la sfârșitul vieții economice a broilerilor.

3.3 Contraindicații

Nu există.

3.4 Atenționări speciale

Vaccinați doar animalele sănătoase.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:
Găinile vaccinate pot excreta tulpina vaccinală până la 9 zile după vaccinare. În aceasta perioadă trebuie evitat contactul găinilor imunosupresate și nevaccinate cu găinile vaccinate.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
În caz de autoinjectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.
La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal constând din ochelari de protecție, masca pentru față și mănuși.

Vaccinul Hipraviar-Clon/H120 poate fi patogen pentru oameni. Deoarece acest produs medicinal veterinar imunologic a fost preparat cu microorganisme vii, atenuate, trebuie luate măsuri adecvate pentru prevenirea contaminării persoanei care manipulează produsul sau a altor persoane care sunt implicate în proces.

Găinile vaccinate pot excreta tulpina vaccinală până la 9 zile după vaccinare.
Pe parcursul acestei perioade, persoanele cu imunitate scăzuta sunt sfătuite să evite contactul cu acest produs medicinal veterinar imunologic și cu animalele vaccinate.

Tulpina vaccinală poate fi prezentă în mediul înconjurător până la 9 zile. Personalul care intră în contact cu găinile vaccinate trebuie să respecte principiile de igienă generală (schimbarea hainelor, purtarea mănușilor, curățarea și dezinfectarea încălțămintei) și să acorde o atenție deosebită manipulării deșeurilor și așternutului provenite de la găinile vaccinate recent.

Precauții speciale pentru protecția mediului:
Nu este cazul.

3.6 Evenimente adverse

Găini:

Foarte rare (<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate):	Simptome respiratori[1]

[1]Pot apare la 3 zile după vaccinare, dispărând spontan câteva zile mai târziu.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței produsului medicinal veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului autorizației de comercializare, fie autorității naționale competente prin sistemul național de raportare. Consultați prospectul pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Păsări ouătoare:
Poate fi utilizat în perioada de ouat.

3.8 Interacțiunea cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

Nu există informații privind siguranța și eficacitatea vaccinului când este utilizat cu alte produse medicinale veterinare. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după alte produse medicinale veterinare va fi stabilită de la caz la caz.

3.9 Căi de administrare și doze

Doze: 1 doză / pasăre.

Căile de administrare:

Administrare oculonazală: peleta liofilizată se dizolvă în diluantul ataşat
Administraţi o picătură de vaccin (0,03 ml) fiecărei păsări, în ochi sau nară, utilizând un picurător standard (30 ml pe 1 000 doze).

Administrare în apa de băut: dizolvaţi peleta liofilizată prin umplerea flaconului până la jumătate cu apă de băut, agitaţi şi adăugaţi conţinutul astfel format într-un container cu un volum de apă ce va fi consumat de către păsări în ½ oră – maxim 1 oră, având în vedere vârsta şi numărul păsărilor, astfel:

Vârsta păsărilor	**Cantitatea aproximativă de apă pentru 1 000 păsări**
1-3 săptămâni	5-10 litri
4-9 săptămâni	12-23 litri
10-16 săptămâni	27-37 litri

Pentru a vă asigura că soluţia vaccinală va fi consumată în ½ oră – maxim 1 oră, este recomandat să nu administraţi apă la păsări cu 1 oră înainte de vaccinare în timpul verii şi cu 2 ore înainte pe timp de iarnă.

Administrare prin sprayere: aparatul utilizat trebuie verificat pentru aflarea cantităţii necesare de soluţie vaccinală. Pentru aceasta, umpleţi aparatul cu apă de băut şi pulverizaţi pe suprafaţa ocupată de păsări, în aşa fel încât capetele păsărilor să fie acoperite cu picături de apă. Se verifică volumul de apă utilizat, iar această cantitate de apă va fi utilizată pentru amestecul vaccinal cu dozele necesare, în funcţie de numărul de păsări ce vor fi vaccinate.

Se recomandă utilizarea picăturilor grosiere, cu dimensiuni mari (mai mari de 50 μ).
Vaccinul reconstituit este un lichid transparent aproape incolor.

3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

Nu au fost descrise evenimente adverse în urma administrării unei doze de 10 ori mai mari decât doza recomandată.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioade de așteptare

Zero zile.

4. INFORMAȚII IMUNOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QI01AD11

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar, cu excepția diluantului furnizat pentru utilizarea cu acest produs medicinal veterinar.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.
Termenul de valabilitate după reconstituire conform indicațiilor: a se utiliza imediat.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C – 8 °C).
A se feri de îngheț.
A se feri de lumină.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Liofilizatul: flacoane din sticlă de tip I, închise cu dop de cauciuc din elastomer polimeric de tip I și sigiliu de aluminiu.

Diluant pentru administrare oculonazală: Flacon din plastic (MDPE) de 32 ml, prevăzut cu dop din clorobutil nitrilic de tip I și capsă de închidere din aluminiu. Ambalajul primar este completat cu un adaptor de transfer și un picurător din polietilenă de înaltă densitate (HDPE).

Dimensiuni ambalaj:
Cutie de carton cu 10 flacoane x 1 000 doze
Cutie de carton cu 10 flacoane x 2 500 doze
Cutie de carton cu 10 flacoane de diluant pentru 1 000 doze (32 ml).

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.
Produsul medicinal veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece substanțele active pot fi periculoase pentru pești și alte organisme acvatice.

Utilizați sistemele de returnare a oricărui produs medicinal veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite din acesta, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile produsului medicinal veterinar respectiv.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

7. NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

160238

8. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI

29/09/2004

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

14.09.2026

10. CLASIFICAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind Produsele (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

ANEXA III

ETICHETAREA ȘI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie cu 10 flacoane de 1 000 doze
Cutie cu 10 flacoane de 2 500 doze

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

HIPRAVIAR-CLON/H120 liofilizat pentru suspensie pentru administrare oculonazală/ în apa de băut

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare doză (0,03 ml) conţine:
Substanțe active:
Virusul bolii de Newcastle viu, tulpina CL/79 $10^{6,5}$ - $10^{7,7}$ DIE_{50}*
Virusul bronşitei infecţioase viu, tulpina Mass H-120 $10^{3,0}$ - $10^{5,4}$ DIE_{50}*
*Doza infecțioasă de 50% în embrionul de pui

3. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 x 1 000 doze
10 x 2 500 doze

4. SPECII ȚINTĂ

Găini

5. INDICAȚII

6. CĂI DE ADMINISTRARE

Administrare oculo-nazală, orală, prin sprayere.

7. PERIOADE DE AȘTEPTARE

Perioada de aşteptare: Zero zile.

8. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}
După reconstituire, a se utiliza imediat.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare.
A se feri de îngheţ.
A se feri de lumină.

10. MENȚIUNEA „A SE CITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE”

A se citi prospectul înainte de utilizare.

11. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

12. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

13. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. NUMERELE AUTORIZAȚIILOR DE COMERCIALIZARE

160238

15. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
Flacon de sticlă x 1 000 doze
Flacon de sticlă x 2 500 doze

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

HIPRAVIAR-CLON/H120

2. INFORMAȚII CANTITATIVE PRIVIND SUBSTANȚELE ACTIVE

Fiecare doză (0,03 ml) conține:

Virusul bolii de Newcastle viu, tulpina CL/79	$10^{6,5}$ - $10^{7,7}$ DIE_{50}
Virusul Bronșitei infecțioase viu, tulpina Mass H-120	$10^{3,0}$ - $10^{5,4}$ DIE_{50}

3. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

4. DATA EXPIRĂRII

EXP {ll/an}
După reconstituire, a se utiliza imediat.

5. CONȚINUT ÎN GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 000 doze
2 500 doze

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton (diluant)

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

HIPRAVIAR-CLON/H120 diluant

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

3. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 x 1 000 doze

4. SPECII ȚINTĂ

Găini

5. INDICAȚII

6. CĂI DE ADMINISTRARE

Pentru administrare oculonazală.

7. PERIOADE DE AȘTEPTARE

Perioada de aşteptare: Zero zile.

8. DATA EXPIRĂRII

Exp. {ll/aaaa}

După reconstituire, a se utiliza imediat.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare.
A se feri de îngheţ.
A se feri de lumină.

10. MENȚIUNEA „A SE CITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE"

A se citi prospectul înainte de utilizare.

11. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

12. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

13. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. NUMERELE AUTORIZAȚIILOR DE COMERCIALIZARE

160238

15. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR -DILUANT

Eticheta flaconului cu diluant pentru 1 000 de doze (32 ml)
Flacon din plastic

1. DENUMIREA DILUANTULUI

HIPRAVIAR-CLON/H120 diluant

2. SPECII ȚINTĂ

Găini

3. CĂI DE ADMINISTRARE

Pentru administrare oculonazală.
A se citi prospectul vaccinului înainte de utilizare.

4. DATA EXPIRĂRII

Exp. {ll/aaaa}

După deschidere, a se utiliza imediat.

5. INDICAȚII

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

7. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

8. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

32 ml pentru suspensie de 1 000 doze

ANEXA nr. 1

B. PROSPECTUL

PROSPECTUL

1. Denumirea produsului medicinal veterinar

HIPRAVIAR-CLON/H120 liofilizat pentru suspensie pentru administrare oculonazală/ în apa de băut pentru găini

2. Compoziție

Fiecare doză (0,03 ml) conține:

Substanțe active:

Virusul bolii de Newcastle viu, tulpina CL/79	$10^{6,5}$ - $10^{7,7}$ DIE_{50}*
Virusul bronșitei infecțioase viu, tulpina Mass H-120	$10^{3,0}$ - $10^{5,4}$ DIE_{50}*

*Doza infecțioasă 50% pe embrion de pui

Excipienți:

Albastru Patentat V (E-131): 0,003 mg

Liofilizat: Peletă liofilizată de culoare gălbuie.
Diluant: soluție albăstruie.

3. Specii țintă

Găini.

4. Indicații de utilizare

Pentru imunizarea activă a găinilor în vederea prevenirii mortalităților și semnelor clinice specifice infecției cu virusul bolii de Newcastle și virusul bronșitei infecțioase.
Instalarea imunității: începând cu a 21 a zi post vaccinare
Durata imunității: până la sfârșitul vieții economice a broilerilor.

5. Contraindicații

Nu există.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:
Vaccinați doar animalele sănătoase.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:
Găinile vaccinate pot excreta tulpină vaccinală până la 9 zile după vaccinare. În această perioada trebuie evitat contactul găinilor imunosupresate și nevaccinate cu găinile vaccinate.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
În caz de autoinjectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecţie personal constând din ochelari de protecție, masca pentru față și mănuși.
Vaccinul Hipraviar-Clon/H120 poate fi patogen pentru oameni. Deoarece acest produs medicinal veterinar imunologic a fost preparat cu microorganisme vii, atenuate, trebuie luate măsuri adecvate pentru prevenirea contaminării persoanei care manipulează produsul sau a altor persoane care sunt implicate în proces.

Găinile vaccinate pot excreta tulpina vaccinală până la 9 zile după vaccinare. Pe parcursul acestei perioade, persoanele cu imunitate scăzuta sunt sfătuite să evite contactul cu acest produs medicinal veterinar imunologic şi cu animalele vaccinate.

Tulpina vaccinală poate fi prezentă în mediul înconjurător până la 9 zile. Personalul care intră în contact cu găinile vaccinate trebuie să respecte principiile de igienă generală (schimbarea hainelor, purtarea mănuşilor, curăţarea şi dezinfectarea încălţămintei) şi să acorde o atenţie deosebită manipulării deşeurilor şi aşternutului provenite de la găinile vaccinate recent.

Păsări ouătoare:Poate fi utilizat în perioada de ouat.

Interacţiunea cu alte produse medicinale şi alte forme de interacţiune:
Nu există informații privind siguranța și eficacitatea vaccinului când este utilizat cu alte produse medicinale veterinare. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după alte produse medicinale veterinare va fi stabilită de la caz la caz.

Supradozaj:
Nu au fost descrise evenimente adverse în urma administrării unei doze de 10 ori mai mari decât doza recomandată.

Incompatibilităţi majore:
A nu se amestecă cu niciun alt produs medicinal veterinar, cu excepția diluantului furnizat pentru utilizarea cu acest produs medicinal veterinar.

7. Evenimente adverse

Găini:

Foarte rare (<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate):	Simptome respiratori[1]

[1]Pot apare la 3 zile după vaccinare, dispărând spontan câteva zile mai târziu.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați mai întâi medicul dumneavoastră veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul autorizației de comercializare utilizând datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: farmacovigilenta@ansvsa.ro icbmv@icbmv.ro

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Doze:1 doză / pasăre.

Căile de administrare:

Administrare oculonazală: peleta liofilizată se dizolvă în diluantul atașat.
Administrați o picătură de vaccin (0,03 ml) fiecărei păsări, în ochi sau nară, utilizându-n picurător standard (30 ml pe 1 000 doze).

Administrare în apa de băut: dizolvați peleta liofilizată prin umplerea flaconului până la jumătate cu apă de băut, agitați și adăugați conținutul astfel obtinut într-un container cu un volum de apă ce va fi consumat de către păsări în ½ oră – maxim 1 oră, având în vedere vârsta și numărul păsărilor astfel:

Vârsta păsărilor	**Cantitatea aproximativă de apă pentru 1 000 păsări**
1-3 săptămâni	5-10 litri
4-9 săptămâni	12-23 litri
10-16 săptămâni	27-37 litri

Administrare prin sprayere: aparatul utilizat trebuie verificat pentru aflarea cantității necesare de soluție vaccinală. Pentru aceasta, umpleți aparatul cu apă de băut și pulverizați pe suprafața ocupată de păsări, în așa fel încât capetele păsărilor să fie acoperite cu picături de apă. Se verifică volumul de apă utilizat, iar această cantitate de apă va fi utilizată pentru amestecul vaccinal cu dozele necesare, în funcție de numărul de păsări ce vor fi vaccinate.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Pentru a vă asigura că soluția vaccinală va fi consumată în ½ oră – maxim 1 oră, este recomandat să nu administrați apă la păsări cu 1 oră înainte de vaccinare în timpul verii și cu 2 ore înainte pe timp de iarnă. Se recomandă utilizarea picăturilor grosiere, cu dimensiuni mari (mai mari de 50 µ). Vaccinul reconstituit este un lichid transparent aproape incolor.

10. Perioade de așteptare

Zero zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C – 8 °C).
A se feri de îngheț.
A se feri de lumină.
Nu utilizați acest produs medicinal veterinar după dată expirării marcată pe cutia de carton după Exp.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Termenul de valabilitate după reconstituire conform indicațiilor: A se administra imediat.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.
Produsul medicinal veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece substanțele active pot fi periculoase pentru pești și alte organisme acvatice.

Utilizați sistemele de returnare a oricărui produs medicinal veterinar neutilizat sau a deșeurile provenite din acesta, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoate la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea produselor medicinale veterinare

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind Produsele (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

14. Numerele autorizațiilor de comercializare și dimensiunile ambalajelor

160238

Dimensiuni de ambalaj:
Cutie de carton cu 10 flacoane x 1 000 doze
Cutie de carton cu 10 flacoane x 2 500 doze
Cutie de carton cu 10 flacoane de diluant cu 1 000 (32 ml).

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuiri a prospectului

14.09.2026

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind Produsele (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Date de contact

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea evenimentelor adverse suspectate:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170 AMER (Girona), Spania
Tel: +34 972 43 06 60

17. Alte informații