

A. Rezumatul Caracteristicilor Produsului

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Hypophysin® LA

0.07 mg/ml solutie injectabila pentru bovine si porcine

2. COMPOZITIE CALITATIVA SI CANTITATIVA

1ml contine:

Substante active:

0.07 mg Carbetocin

Excipienti:

2 mg Chlorobutanol hemihydrate

Pentru lista completa a excipientilor a se vedea punctul 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Solutie injectabila apoasa pentru administrare intramusculara si intravenoasa.

4. PARTICULARITATI CLINICE

4.1 Specii tinta

Bovine si porcine.

4.2 Indicatii pentru utilizare, cu specificarea speciilor tintă

Bovine:

contractii slabe, fatari prelungite (cauzate de inertiile uterine, atonia uterina), retentii puerperale sau alte disfunctii post-partum. Inducerea eliminarii laptei.

Scroafe:

Agalaxia scroafelor, preventia si/sau tratarea sindromului MMA, pentru declansarea reflexului de eliminare a laptei. Pentru sincronizarea fatarilor in combinatie cu administrarea de PGF2alfa dar nu mai repede de ziua a 114-a de gestatie.

4.3 Contraindicatii

A nu se folosi in situatii de fatari indelungate, deschidere inadecvata a cailor de fatare, sau in situatia de fetusi supradimensionati. Hypophysin LA nu trebuie folosita in situatiile in care cervixul nu este dilatat. Aplicarea de Hypophysin LA nu este indicata in situatii de contractii puternice, obstacole mecanice, anomalii de prezintare, de pozitionare, contractii convulsive, in caz de rupturi uterine, torsione uterina, supradimensiuni ale fetusilor, precum si in situatiile de malformatii ale cailor de fatare.

4.4 Atentionari speciale pentru fiecare specie tinta

Nu sunt.

4.5 Precautii speciale de utilizare

Nu sunt specificate.

Atentionari speciale pentru operatori

Nu sunt aplicabile.

4.6. Reactii adverse

Nu se cunosc.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat
Nu este specificat.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Oxitocina nu poate fi administrata impreuna cu Hypophysin LA din cauza unei cresteri reciproce in potentă si efect.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Scroafe: 0,5 – 1,0 ml, i.m., s.c., (echivalent la 35 – 70 micrograme de Carbetocina)/ animal, pentru sincronizarea parturiei impreuna cu o administrare anterioara de PGF2alfa.

Bovine: 2,5 – 5,0 ml, (echivalent la 175 – 350 micrograme de Carbetocina)/ animal.

Se va administra prin injectii intramusculare sau intravenoase. In general se va administra o singura data.

4.10 Supradozare, după caz

Nu este specificat.

4.11 Timp de asteptare

<u>Bovine si porcine:</u>	Carne si tesuturi comestibile:	Zero zile
---------------------------	--------------------------------	-----------

<u>Bovine:</u>	Lapte:	Zero zile
----------------	--------	-----------

5 PROPRIETATI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică

Carbetocin este un analog modificat chimic al hormonului Oxitocin lob endogen al glandei pituitare posterioare

ATCvet code: QH01BB03

5.1 Proprietati farmacodinamice

Carbetocin este un analog modificat chimic care se degradeaza considerabil mai incet decat hormonul natural astfel manifestand un efect de lunga durata in organism.

Carbetocina la fel ca Oxitocina creste contractibilitatea uterului in fazele timpurii ale parturiei si in prezenta nivelului de osterogen ridicat induce eliminarea laptelei.

Dupa administrare intramusculara sau intravenoasa efectul Carbetocinei apare in cateva minute si dureaza mai multe ore.

Invesrtigatiile efectuate la porci au aratat ca Oxitocina (10 UI intravenos) a stimulat curgerea laptelei timp de 10-20 minute in schimb Carbetocina (200, 400 sau 600 µg intravenos) a facut o medie de 6 ore.

Contractiile uterului provocate de Carbetocin sunt similare muncii fiziologice. La scroafe s-a observat ca la doza mai mare se poate obtine o perioada mai lunga a eficacitatii fara schimbari semnificative a presiunii intrauterine si a frecventei contractiilor. Spasmele uterine cauzate de supradozarea Oxitocinei nu sunt asteptate in caz de administrare cu Carbetocina.

5.2 Proprietati farmacocinetice

Aplicarea de 06. mg de Carbetocina la scroafe produce o eliminare bifazica cu o scadere initiala in nivelurile plasmei (timp de injumatatire 7.5 pana la 10 minute) continuat de o scadere mai lenta (timp de injurgatatie 85 pana la 100 minute), unde nu a fost o diferență fundamentală intre aplicare intramusculara si intravenoasa. Carbetocin este degradata de enzime in fluiizi si tesuturile corpului si excretata renal.


6. PARTICULARITATI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

Chlorobutanol hemihydrat

Sodium acetate trihydrate

Acetic acid, glacial



Sodium hydroxide 20 % (pentru ajustarea pH-ului, daca este nevoie)-.
Apa pentru injectie.

6.2 Incompatibilitati

Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

28 de zile dupa prima deschidere a flaconului.

6.4 Precautii speciale pentru depozitare

A se pastra in frigider (2 °C - 8 °C). A se feri de lumina.

6.5 Natura si compozitia ambalajului primar

Flacoane de sticla multidoze de 10 ml, 20 ml 50 ml, inchise cu capac de cauciuc din bromobutilena, si acoperita cu capac de aluminiu.

Cutii: 1 x 10 ml, 6 x 10 ml, 1 x 20 ml, 6 x 20 ml, 1 x 50 ml

Nu toate formele de prezentare sunt disponibile.

6.6 Precautii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilitate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilitat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate in conformitate cu cerintele locale.

7 DETINATORUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germany

8. NUMARUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

060111

9. DATA PRIMEI AUTORIZARI/ REINNOIREA AUTORIZATIEI

Data primei autorizari: 27.02.2006.

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Ianuarie 2008

PROSPECT

Hypophysin® LA

0.07 mg/ml solutie injectabila pentru bovine si porcine

1. NUMELE SI ADRESA DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE:

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6

34639 Schwarzenborn

Germany

2. NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Hypophysin® LA

0.07 mg/ml solutie injectabila pentru bovine si porcine

3. SUBSTANTA ACTIVA SI A ALTOR INGREDIENTE

1 ml contine:

Substanta activa:

0.07 mg Carbetocin

Excipient:

2 mg Chlorobutanol hemihydrat

4. INDICATII

Bovine: Contractii slabe. Probleme post fatare rezultate din atonia uterina si alte disfunctionalitati puerperale(tonia uterina, lochiometria). In cazul eliminarii insuficiente de lapte.

La scroafe: contractii slabe. Probleme post fatare rezultate din atonia uterina, pentru suportul tratamentului in sistemul Metrite- Mastite- Agalaxie. In cazul eliminarii insuficiente de lapte. Pentru sincronizarea fatarilor in combinatie cu PGF2 α , dar nu mai repede de ziua a 114-a de gestatie.

5. CONTRAINDICATII

A nu se folosi in situatii de fatari indelungate, deschidere inadecvata a cailor de fatare, sau in situatia de fetusi supradimensionati. Hypophysin LA nu trebuie folosita in situatiile in care cervixul nu este dilatat. Aplicarea de Hypophysin LA nu este indicata in situatii de contractii puternice, obstacole mecanice, anomalii de prezentare, de pozitionare, contractii convulsive, in caz de rupturi uterine, torsione uterina, supradimensiuni ale fetusilor, precum si in situatiile de malformatii ale cailor de fatare.

6. REACTII ADVERSE

Nu sunt.

Pentru orice alte reactii decat cele mentionate in acest prospect, adresati-va medicului veterinar.

7. SPECII TINTA

Bovine si porcine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE

Scroafe: 0,5 – 1,0 ml, i.m., s.c., (echivalent la 35 – 70 micrograme de Carbetocina)/ animal, pentru sincronizarea parturiei impreuna cu o administrare anteroioara de PGF2alfa.

Bovine: 2,5 – 5,0 ml, (echivalent la 175 – 350 micrograme de Carbetocina)/ animal.

Se va administra prin injectii intramusculare sau intraveneoase. In general se va administra o singura data.

9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA

Nu sunt.

10. TEMP DE ASTEPTARE

Bovine si porcine:

Carne si tesuturi comestibile:

Zero zile

Bovine:

Lapte:

Zero zile

11. PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se folosi dupa termenul de valabilitate expirat.

A nu se lasa la indemana copiilor !
A se pastra in frigider (2 °C - 8 °C).
A se utilizeaza in 28 de zile dupa prima deschidere.

12. ATENTIONARI SPECIALE

Interactiuni: Oxitocina nu poate fi administrata impreuna cu Hypophysin LA din cauza unei cresteri reciproce in potentia si efect.

13. PRECAUTII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DESEURILOR, DUPA CAZ

Medicamentele nu pot fi aruncate impreuna cu resturile menajere.
Adresati-va medicului veterinar!

14. DATE IN BAZA CARORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

15. ALTE INFORMATII

Flacoane de sticla multidoze de 10 ml, 20 ml 50 ml, inchise cu capac de cauciuc din bromobutilena, si acoperite cu capac de aluminiu.
Cutii: 1 x 10 ml, 6 x 10 ml, 1 x 20 ml, 6 x 20 ml, 1 x 50 ml
Nu toate formele de prezentare sunt disponibile.

Distribuit in Romania de catre:
SC Maravet SRL-, dr. Korponay F.
RO-430000, Str. Europa nr. 9
Baia Mare, Romania
Tel/Fax: +40 262 211 964

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

Vl. Buhnea Cristian
Medic Veterinar

Propunerea pentru textul cutiei exterioare (1 x 10ml, 6 x 10ml, 1 x 20ml, 6 x 20ml, 1x 50 ml)

1. NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Hypophysin® LA

0.07 mg/ml solutie injectabila pentru bovine si porcine

Carbetocin

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 ml contine:

Substanta activa:

0.07 mg Carbetocin

Excipient:

2 mg Chlorobutanol hemihydrat

3. FORMA FARMACEUTICA

Solutie injectabila.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 x 10 ml

6 x 10 ml

1 x 20 ml

6 x 20 ml

1 x 50 ml.

5. SPECII ȚINTĂ

Bovine si porcine.

6. INDICATII

Bovine: Contractii slabe. Probleme post fatare rezultate din atonia uterina si alte disfuncionalitati puerperale(tonia uterina, lochiometria). In cazul eliminarii insuficiente de lapte.

La scroafe: contractii slabe. Probleme post fatare rezultate din atonia uterina, pentru suportul tratamentului in sistemul Metrite- Mastite- Agalaxie. In cazul eliminarii insuficiente de lapte. Pentru sincronizarea fatarilor in combinatie cu PGF2 α , dar nu mai repede de ziua a 114-a de gestatie.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul produsului.

8. TEMP DE ASTEPTARE

Bovine si porcine:

Carne si tesuturi comestibile:

Zero zile

Bovine:

Lapte:

Zero zile

9. ATENȚIONĂRI SPECIALE, DUPĂ CAZ

A se citi prospectul produsului.

10. DATA EXPIRĂRII

Data expirarii: luna/anul

Odata deschisa produsul trebuie folosita in 28 de zile.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se pastra in frigider (2 °C - 8 °C). A se feri de lumina.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ


Medicamentele si ambalajele ramase neutilizate se vor manipula conform legislatiei locale in vigoare.

Medicamentele si ambalajele ramase neutilizate se vor manipula conform legislatiei locale in vigoare.

13. MENTIUNE „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONI PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

A se livra doar pe prescriptie veterinara.



15. NUMELE SI ADRESA DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germany

16. NUMARUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

060111

17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot numar:

18. NUMELE SI ADRESA REPREZENTANTULUI LOCAL

Distribuit in Romania de catre:
SC Maravet SRL, dr. Korponay F.
RO-430000, Str. Europa nr. 9
Baia Mare, Romania
Tel/Fax: +40 262 211 964

INFORMATII MINIME CARE TREBUIE INSCRISE PE UNITATILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**{NATURA/TIP}****1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR****Hypophysin® LA**

0.07 mg/ml solutie injectabila pentru bovine si porcine

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)**Compozitie:**

1ml contine:

Substante active:

0.07 mg Carbetocin

Excipienti:

2 mg Chlorobutanol hemihydrate

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

10ml

20 ml

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Solutie injectabila apoasa pentru administrare intramusculara si intravenoasa.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

5. TEMPORALITATEA (TIMP DE AȘTEPTARE)Bovine si porcine:

Carne si tesuturi comestibile:

Zero zile

Bovine:

Lapte:

Zero zile

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot numar:

7. DATA EXPIRĂRII

Data expirarii: luna/anul

Odata deschisa produsul trebuie folosita in 28 de zile.

8. MENTIUNE „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Dr. MIHNEA CRISTIAN
Medic veterinar