



**Vaccin inactivat impotriva Bolii de Newcastle**  
**Emulsie Injectabila**  
**Pasari**

**Compozitie**

Fiecare doza de vaccin contine :

- Virusul Bolii de Newcastle tulpina Ulster , cel putin 50 PD50<sup>1</sup>
- Thiomersal, cel mult 0.015 mg
- Excipient uleios, q.s doza de 0.3 ml

1 : PD50 = doza de vaccine necesara pentru a obtine 50 % protectie la pasarile vaccinate.

**Indicatii**

Imunizarea activa a pasrilor impotriva bolii de Newcastle, si ca vaccinare de rapel dupa vaccinarea cu vaccin viu.

Administrare si dozare:

- Agitati foarte bine inainte de utilizare.
- Cale subcutanata si/sau intramusculara.
- Dozare :
  - Tineret de inlocuire (gaini ouatoare si reproductie) : o injectie in doza de 0,3 ml per pasare cu 2 - 4 saptamani inainte de intrarea in ouat.
  - Pasarile cu varsta mai mica de 1 saptamana : o injectie in doza de 0,1 ml per pasare simultan sau dupa vaccinarea cu vaccin viu ( tulpina HB1 sau VG/GA ) administrat pe cale oculara.

**Precautii :**

- Vaccinati numai pasarile sanatoase.
- Aplicati procedurile aseptice uzuale
- Nu folositi seringi cu piston din cauciuc natural sau elastomer.
- In cazul injectarii accidentale la om, este necesara atentie medicala de urgenta.

**Perioada de asteptare**

Nu se aplica.

**Pastrare :**

A se pastra la o temperatura cuprinsa intre +2°C si +8°C, ferit de lumina. A nu se congela.

**INFORMATII ADITIONALE :**

**Precautii :**

In cazul auto-injectarii accidentale, se poate dezvolta o reactie inflamatorie acuta locala in special in cazul unei injectii cu presiune ridicata in zona degenului sau a articulatiei (severitatea si evolutia leziunilor depinde in primul rand de locul injectarii accidentale).

**Note pentru persoana care administreaza vaccinul:**

In cazul auto-injectarii accidentale , TREBUIESC URMATE URMATOARELE INSTRUCIUNI CAT MAI REPEDE POSIBIL:

- 1) Dezinfectati locul injectiei cu un antiseptic sau doar spalati cu apa si sapun .
- 2) Puneti gheata la locul injectiei .
- 3) Este necesar imediat sfatul medicului (trebuie arata medicului eticheta, prospectul produsului sau chiar produsul).

**Note pentru medic:**

Verificat  
de Corina M. M.

*[Signature]*



accin) este inactivat si nu poate cauza zoonoze.

Etichetările recomandari trebuie să urmeze :

- 1) Consultați cu atenție zona în care s-a injectat produsul.
- 2) Verificați dacă imunizarea antitetanos este la zi.

3) **ÎN CAZUL UNEI PRESIUNII FOARTE MARI LA LOCUL INJECTIEI LA NIVELUL ARTICULAȚIEI DEGETULUI SAU A MAINII, ESTE NECESAR SFATUL UNUI MEDIC CHIRURG ÎNAINTE DE A IMPLEMENTA UN TRATAMENT SIMPTOMATIC.**

- 4) Dacă este necesar, se prescrie un tratament simptomatic, în general bazat pe analgezice, anti-inflamatorii și anti-histaminice.
- 5) Se asigură o monitorizare zilnică.

Mod de prezentare: flacoane x 300 ml ( 1000 doze)

Valabilitate : 24 de luni

Numai pentru uz veterinar .

A se elibera numai pe baza de prescripție medicală.

TITULARUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ: Merial, 29 Avenue Tony Garnier, 69007  
Lyon

IMPORTATOR: VETECO INTERSERVICES SRL - Str. Mr.Av. Ștefan Sănătescu nr.41, Sect 1 -  
București; tel:317.03.80/fax:317.03.35

Însușiți orice reclamație cu numărul seriei înscris pe etichetă.

Numai pentru uz veterinar