

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică
 Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie medie
 Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanțe active:

Flumetrin 22,5 mg/g

Propoxur 100 mg/g

	Lungime	Greutate	Propoxur	Flumetrin
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică	38 cm	12,5 g	1,25 g	0,28 g
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie medie	53 cm	30,2 g	3,02 g	0,68 g
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare	70 cm	45 g	4,50 g	1,013 g

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Zgardă antiparazitară de culoare galbenă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**4.1 Specii țintă**

Câini

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

În tratamentul infestațiilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) și purici (*Ctenocephalides canis / felis*) și pentru protejare împotriva reinfestării la câini. După aplicare zgarda este eficientă împotriva căpușelor și puricilor până la 7 luni.

4.3 Contraindicații

Nu se utilizează la animale cu obstrucție mecanică a aparatului digestiv sau urinar, astm bronșic sau alte afecțiuni pulmonare și cardiovasculare deoarece carbamații pot declanșa contracția musculaturii netede.

Nu se utilizează la căței cu vârsta mai mică de 3 luni.

Nu se utilizează la animale cu leziuni ale pielii.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

De regulă căpușele sunt omorâte și cad de pe gazdă până la 72 de ore după infestare, fără să fi avut o masă de sânge. Atașarea de căpușe izolate după tratament nu poate fi exclusă. Din acest motiv, transmiterea unor boli infecțioase cauzate de căpușe, nu poate fi exclusă complet dacă condițiile sunt nefavorabile.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Copiii trebuie să evite contactul cu animalele care poartă zgarda.
Depozitați departe de alimente și furaje/hrană.
Copii nu se vor juca cu zgarda.



Precauții speciale pentru utilizare la animale

Puricii pot fi gazde intermediare pentru tenii, prin urmare se recomandă să se utilizeze simultan și produse medicinale veterinare endoparazitare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Evitați contactul direct cu ochii și pielea.

Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul manipulării zgărzii.

Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun după manipularea zgărzii.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la orice excipient trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Acest produs conține un carbamat (propoxur). În caz de simptome toxice vă rugăm să cereți urgent sfatul medicului.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

În cazuri foarte rare, pot apărea reacții la locul de aplicare, cum ar fi prurit, eritem, leziuni și pierderea părului.

În cazuri foarte rare unele animale pot prezenta o ușoară senzație de mâncărime sau înroșire a pielii după aplicarea zgărzii.

Foarte rar pot apărea simptome cum ar fi voma, diaree sau salivă după expunerea la produs pe cale orală.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație

Pentru utilizarea în lactație și gestație nu trebuie luate măsuri suplimentare. Ambele substanțe active nefiind clasificate ca embriotoxice și nici teratogenice sau toxice pentru reproducție, cu atât mai puțin sunt de așteptat asemenea efecte pentru cățelele gestante sau în lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

A nu se utiliza zgarda în același timp cu administrarea de alte acaricide și insecticide.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

La câinii de talie mică se atașează o zgardă de 38 cm lungime (12,5 g). La câinii de talie medie se atașează o zgardă de 53 cm lungime (30,2 g), La câinii de talie mare se atașează o zgardă de 70 cm lungime (45 g).

Doar pentru uz extern!

Zgarda va fi eficientă până la 7 luni, atunci când purtată continuu. Perioada de eficacitate este modificată de lungimea părului, activitatea câinelui, nivelul de infestare a mediului înconjurător.

Puricii de pe câine sunt omorâți la câteva ore după atașarea zgărzii. Căpușele care sug sânge sunt omorâte în aproximativ o zi de la atașarea zgărzii. Căpușele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi îndepărtate foarte ușor.

De regulă căpușele sunt omorâte și cad de pe gazdă până la 72 de ore după infestare, fără să fi avut o masă de sânge. Atașarea de căpușe izolate după tratament nu poate fi exclusă. Din acest motiv, transmiterea unor boli infecțioase cauzate de căpușe, nu poate fi exclusă complet dacă condițiile sunt nefavorabile.

Pierderea efectului se poate verifica prin zgărirea zgărzii cu un obiect metalic. Dacă locul zgâriat este alb, zgarda are încă efect. În caz contrar, trebuie utilizată o zgardă nouă.

Sfaturi pentru o administrare corectă

Scoateți zgarda din învelișul protector și desfaceți-o.

Asigurați-vă că nu există resturi de conectori de plastic în interiorul zgărzii.

Reglați zgarda în jurul gâtului animalului fără a strânge prea strâns (ca un ghid, ar trebui să fie posibil să se introducă două degete între zgardă și gât).

Trageți excesul de zgardă prin buclă și tăiați orice lungime în exces mai mare de 2 cm. În special în cazul animalelor tinere potrivirea corectă a zgărzii se verifică în mod regulat și se ajustează.

Zgarda devine eficientă la 24 ore de la aplicarea ei la gâtul animalului. Durata și nivelul de eficiență depind de grosimea și lungimea părului, de activitățile animalului și de nivelul infestării.

Este de preferat să spălați părul animalului, dacă nu este curat, înainte de aplicarea zgărzii.

Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot și pusă la loc imediat după uscarea părului.

Mediul înconjurător poate fi contaminat cu ouă de purici larve sau pupe. Acestea vor evolua în timp în noi purici. Prin urmare, este important pentru o combatere eficientă a puricilor ca aceste stadii intermediare din mediul înconjurător al câinelui să fie de asemenea, combătute cu un insecticid adecvat, aprobat pentru această utilizare.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.

În studii controlate extinse au fost aplicate câinilor de diferite rase, vârste și greutate, două zgărzi Kiltix zgardă, pentru câini și nu au fost observate semne locale și sistemice de intolerabilitate (chimie clinică, hematologie, colinesteraza, parametri din urină, comportament).

Dacă accidental părți din zgardă sunt mestecate sau înghițite, ar putea să apară simptomele intoxicației cu carbamați cum ar fi salivă, contracții ale pupilelor, vomă sau diaree. În cazul în care apar semne clinice de intoxicație cu carbamați, tratamentul constă în măsuri simptomatice și administrarea intravenoasă de antidot: sulfat de atropină.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticid pentru utilizare topică, piretrine și piretroizi

Codul veterinar ATC: QP53AC55

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Produs antiparazitar cu efect acaricid și insecticid.

Zgarda Kiltix este un produs antiparazitar pentru combaterea infestării cu căpușe și purici și care conține ca substanțe active farmaceutice: Propoxur și Flumetrin.


Propoxur

Propoxur este un ectoparaziticid aparținând clasei acidului carbaminic. Modul de acțiune este bazat pe inhibarea colinesterazei parazitului urmată de acumularea de acetilcolină eliberată natural urmată de paralizia și moartea căpușelor și puricilor.

Flumetrin

Flumetrin este un ectoparazitoid de sinteză aparținând grupului piretroidelor (α -Ciano Piretroid Piretroid de tip II), care influențează activitatea canalelor de sodiu în celulele nervoase ale paraziților determinând impulsuri repetitive de lungă durată care în final conduc la paralizia și moartea parazitului.

Aceste efecte sunt determinate de faptul că ioni de Na^+ și de K^+ pătrund în membrana celulelor la diferite viteze și proporții. Suplimentar, flumetrinul are un „efect de doborâre” asupra puricilor. Are de asemenea un efect repelent (de îndepărtare) asupra insectelor, care ușurează dispariția puricilor de pe animalele tratate. Flumetrinul are puternice proprietăți acaricide.



5.2 Particularități farmacocinetice

După eliberare din zgardă ambele substanțe active sunt distribuite în blana animalului în concentrații acaricide și insecticide. Tratamentul câinilor infestați cu combinația de substanțe active din "Kiltix" au arătat în studii de laborator controlate și studii de teren o semnificativă îmbunătățire a eficacității și creșterea acțiunii asupra căpușelor și puricilor comparativ cu zgărzile care au doar una din substanțele active.

Bazat pe doza dermică DL_{50} ($> 5000 \text{ mg/kg}$ greutate corporală) stabilită pe iepuri și pe rezultatele obținute în studiile de reziduuri de la speciile țintă, o cantitate neglijabilă a fost resorbită prin derm și de aceea prezența sistemică a celor două substanțe din zgardă poate fi previzibilă la animalele tratate.

5.3 Proprietăți referitoare la mediul înconjurător

Acest produs este extrem de toxic pentru organismele acvatice, păsări și albine.

Nu permiteți câinilor care poartă aceasta zgardă să înoate în cursuri de apă care conțin organisme acvatice.

Acest produs poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Nu reutilizați ambalajul. Distrugeți sau eliminați ambalajele goale în conformitate cu cerințele locale.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Adipat de dibutil

Propilenglicol-dicaprilocatrat

Ulei de soia epoxidat

Acid stearic

Dioxid de titan (E171)

Oxid de fier (E 172)

Policlorură de vinil

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 36 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: după deschiderea ambalajului, zgarda trebuie să fie aplicată imediat.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică,
Punga de forma cilindrica din PETP/Al/PE sau PETP/PE care conține o zgardă (38cm, 12,5g).
Cutie din carton pliat, căptușită pe interior cu o folie din material compozit din poliester/polietilenă,
care conține o punga cu o zgardă și prospect.

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie medie,
Punga de forma cilindrica din PETP/Al/PE sau PETP/PE care conține o zgardă (53cm, 30,2g).
Cutie din carton pliat, căptușită pe interior cu o folie din material compozit din poliester/polietilenă,
care conține o punga cu o zgardă și prospect.

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare,
Punga de forma cilindrica din PETP/Al/PE sau PETP/PE care conține o zgardă (70 cm, 45g).
Cutie din carton pliat, căptușită pe interior cu o folie din material compozit din poliester/polietilenă,
care conține o punga cu o zgardă și prospect.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Nu se vor contamina râuri, lacuri, cursuri de apă, baraje și alte surse de apă cu produsul neutilizat.
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim
Germania

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică 160275
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie medie 160276
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare 160277

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

11.04.2011/30.08.2016

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

02/2024

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton care conține o zgardă (38cm, 12,5g)

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică
Propoxur, flumetrin

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE**Substanțe active:**

Propoxur 1,25 g/zgardă

Flumetrin 0,28 g/zgardă

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Zgardă antiparazitară (38 cm, 12,5 g)

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 zgardă

5. SPECII ȚINTĂ

Câini de talie mică

6. INDICAȚII

În tratamentul infestațiilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) și purici (*Ctenocephalides canis / felis*) și pentru protejare împotriva reinfestării la câini. După aplicare zgarda este eficientă împotriva căpușelor și puricilor până la 7 luni.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germania

Produsele neutilizate vor fi eliminate conform cerințelor locale.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PENTRU ELIBERAREA ȘI UTILIZARE

Numai pentru uz veterinar.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germania

16. NUMERELE AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

160275


17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică

Pungă din PETP/Al/PE sau PETP/PE pentru o zgardă



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică

Flumetrin 0,28 g/zgarda

Propoxur 1,25 g/zgarda

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Elanco logo

3. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

4. NUMĂRUL SERIEI

Lot{număr}

5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

PROSPECT



Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică,
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie medie
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE
ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU
ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

Deținătorul autorizației de comercializare:

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germania

Producător pentru eliberarea seriei:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer Str. 324 24106 Kiel, Germania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică,
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie medie
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare
flumetrin, propoxur

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

Flumetrin 22,5 mg/g, Propoxur 100 mg/g

	Lungim e	Greutate	Propoxur	Flumetri n
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică	38 cm	12,5 g	1,25 g	0,28 g
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie medie	53 cm	30,2 g	3,02 g	0,68 g
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare	70 cm	45 g	4,50 g	1,013 g

4. INDICAȚII

În tratamentul infestațiilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) și purici (*Ctenocephalides canis / felis*) și pentru protejare împotriva reinfestării la câini. După aplicare zgarda este eficientă împotriva căpușelor și puricilor până la 7 luni.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animale cu obstrucție mecanică a aparatului digestiv sau urinar, astm bronșic sau alte afecțiuni pulmonare și cardiovasculare deoarece carbamații pot declanșa contracția musculaturii netede.

Nu se utilizează la căței cu vârsta mai mică de 3 luni.

Nu se utilizează la animale cu leziuni ale pielii.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

În cazuri foarte rare, pot apărea reacții la locul de aplicare, cum ar fi prurit, eritem, leziuni și pierderea părului.

În cazuri foarte rare unele animale pot prezenta o ușoară senzație de mâncărime sau înroșire a pielii după aplicarea zgărzii.

Foarte rar pot apărea simptome cum ar fi vomă, diaree sau salivă după expunerea la produs pe cale orală.

Frecvența reacțiilor adverse posibile este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 animal din 10)
- Frecvente (afectează între 1 și 10 animale din 100)
- Mai puțin frecvente (afectează între 1 și 10 animale din 1000)
- Rare (afectează între 1 și 10 animale din 10000)
- Foarte rare (afectează mai puțin de 1 animal din 10 000)



Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

La câinii de talie mică se atașează o zgardă de 38 cm lungime (12,5 g). La câinii de talie medie se atașează o zgardă de 53 cm lungime (30,2 g), La câinii de talie mare se atașează o zgardă de 70 cm lungime (45 g).

Doar pentru uz extern!

Zgarda va fi eficientă până la 7 luni, atunci când purtată continuu. Perioada de eficacitate este modificată de lungimea părului, activitatea câinelui, nivelul de infestare a mediului înconjurător.

Puricii de pe câine sunt omorâți la câteva ore după atașarea zgărzii. Căpușele care sug sânge sunt omorâte în aproximativ o zi de la atașarea zgărzii. Căpușele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi îndepărtate foarte ușor.

De regulă căpușele sunt omorâte și cad de pe gazdă până la 72 de ore după infestare, fără să fi avut o masă de sânge. Atașarea de căpușe izolate după tratament nu poate fi exclusă. Din acest motiv, transmiterea unor boli infecțioase cauzate de căpușe, nu poate fi exclusă complet dacă condițiile sunt nefavorabile.

Pierderea efectului se poate verifica prin zgărirea zgărzii cu un obiect metallic. Dacă locul zgăriat este alb, zgarda are încă efect. În caz contrar, trebuie utilizată o zgardă nouă.

Sfaturi pentru o administrare corectă

Scoateți zgarda din învelișul protector și desfaceți-o.

Asigurați-vă că nu există resturi de conectori de plastic în interiorul zgărzii.

Reglați zgarda în jurul gâtului animalului fără a strânge prea strâns (ca un ghid, ar trebui să fie posibil să se introducă două degete între zgardă și gât).

Trageți excesul de zgardă prin buclă și tăiați orice lungime în exces mai mare de 2 cm. În special în cazul animalelor tinere potrivirea corectă a zgărzii se verifică în mod regulat și se ajustează.

Zgarda devine eficientă la 24 ore de la aplicarea ei la gâtul animalului. Durata și nivelul de eficiență depind de grosimea și lungimea părului, de activitățile animalului și de nivelul infestării.

Este de preferat să spălați părul animalului, dacă nu este curat, înainte de aplicarea zgărzii.

Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot și pusă la loc imediat după uscarea părului.

Mediul înconjurător poate fi contaminat cu ouă de purici larve sau pupe. Acestea vor evolua în timp în noi purici. Prin urmare, este important pentru o combatere eficientă a puricilor ca aceste stadii intermediare din mediul înconjurător al câinelui să fie de asemenea, combătute cu un insecticid adecvat, aprobat pentru această utilizare.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Câini care au blana aspră, încurcată sau murdară trebuie spălați și șamponați înainte de aplicarea zgărzii. Contactul frecvent cu apa (ploaia, înotul, îmbăierea) pot reduce eficacitatea produsului. Eficacitatea și durată efectivă de utilizare este determinată de lungimea, grosimea și condiția blănii dar și de gradul de infestare. Dacă eficacitatea produsului se diminuează este necesar să fie înlocuită zgarda mai repede. Pierderea efectului se poate verifica prin zgărirea zgărzii cu un obiect metalic. Dacă locul zgăriat este curat, zgarda are încă efect.

Puricii tind să infesteze așternutul și spațiul din jurul animalului de companie (covoare și draperii), care ar trebui să fie tratate cu un parazitocid adecvat și aspirate în mod regulat. Aceste măsuri ajută la reducerea infestării cu purici în mediul înconjurător și prelungesc eficacitatea împotriva unor noi infestări ale câinelui.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: după deschiderea ambalajului, zgarda trebuie să fie aplicată imediat.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

De regulă căpușele sunt omorâte și cad de pe gazdă până la 72 de ore după infestare, fără să fi avut o masă de sânge. Atașarea de căpușe izolate după tratament nu poate fi exclusă. Din acest motiv, transmiterea unor boli infecțioase cauzate de căpușe, nu poate fi exclusă complet dacă condițiile sunt nefavorabile.

Precauții speciale pentru utilizare

Copiii trebuie să evite contactul cu animalele care poartă zgarda.

Depozitați departe de alimente și furaje/hrană.

Copii nu se vor juca cu zgarda

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Puricii pot fi gazde intermediare pentru tenii, prin urmare se recomandă să se folosească simultan și medicamente endoparazitare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Evitați contactul direct cu ochii și pielea.

Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul manipulării zgărzii.

Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun după manipularea zgărzii.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la orice excipient trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Acest produs conține un carbamat (propoxur). În caz de simptome toxice vă rugăm să cereți sfatul medicului.

Gestație și lactație

Pentru utilizarea în lactație și gestație nu trebuie luate măsuri suplimentare. Ambele substanțe active nefiind clasificate ca embriotoxice și nici teratogenice sau toxice pentru reproducție, cu atât mai puțin sunt de așteptat asemenea efecte pentru cățelele gestante sau în lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

A nu se utiliza zgarda în același timp cu alte acaricide și insecticide.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.

În studii controlate extinse au fost aplicate câinilor de diferite rase, vârste și greutate, două zgărzi Kiltix zgardă, pentru câini și nu au fost observate semne locale și sistemice de intolerabilitate (chimie clinică, hematologie, colinesteraza, parametri din urină, comportament).

Dacă accidental părți din zgardă sunt mestecate sau înghițite, ar putea să apară simptomele intoxicației cu carbamați cum ar fi salivare, contracții ale pupilelor, vomă sau diaree. În cazul în care apar semne clinice de intoxicație cu carbamați tratamentul constă în măsuri simptomatice și administrarea intravenoasă de antidot: sulfat de atropină

Incompatibilități

Nu se cunosc.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR

Nu se vor contamina râuri, lacuri, cursuri de apă, baraje și alte surse de apă cu produsul neutilizat.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

02/2024

15. ALTE INFORMAȚII

Natura și compoziția ambalajului primar

Punga de formă cilindrică din PETP/Al/PE sau PETP/PE care conține o zgardă.

Ambalaj secundar:

Cutie din carton pliat, căptușită pe interior cu o folie din material compozit din poliester/polietilenă, care conține o pungă cu o zgardă și prospect.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.