



**ANEXA I**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**

## 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Libeo 10 mg comprimate masticabile pentru câini

## 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Un comprimat de 330 mg conține:

### Substanță activă:

Furosemid ..... 10 mg

### Excipient(excipienți):

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

## 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat masticabil

Comprimat în formă de trifoi, de culoare bej. Comprimatele pot fi divizate în sferturi egale.

## 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

### 4.1 Specii țintă

Câini

### 4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Tratamentul ascitei și al edemului, în special asociate cu insuficiența cardiacă.

### 4.3 Contraindicații

A nu se utiliza la câinii care suferă de hipovolemie, hipotensiune sau deshidratare.

A nu se utiliza în caz de insuficiență renală cu anurie.

A nu se utiliza în caz de deficit de electroliți.

A nu se utiliza în cazul hipersensibilității față de furosemid, de sulfonamide sau de oricare dintre excipienți.

### 4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Eficacitatea terapeutică poate fi redusă în cazul consumului crescut de apă potabilă. Dacă starea animalului permite acest lucru, consumul de apă trebuie limitat la nivelurile normale din punct de vedere fiziologic pe durata tratamentului.

### 4.5 Precauții speciale pentru utilizare

#### Precauții speciale pentru utilizare la animale

Comprimatele fiind aromate, acestea trebuie păstrate într-un loc sigur, astfel încât animalele să nu aibă acces la ele.

Furosemidul trebuie utilizat cu precauție în cazul în care există deja un dezechilibru electrolitic și/sau hidric, insuficiență hepatică (poate precipita coma hepatică) și diabet. În cazul tratamentului prelungit se recomandă monitorizarea frecventă a stării de hidratare și a electroliților din ser.

Cu 1-2 zile înainte și după începerea tratamentului cu diuretice și inhibitori ECA, se recomandă monitorizarea funcției renale și a stării de hidratare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută față de furosemid li se recomandă să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Spălați mâinile după utilizare.

Nu manipulați acest produs dacă știți că sunteți sensibil(ă) la sulfonamide, deoarece hipersensibilitatea față de sulfonamide poate duce la hipersensibilitate față de furosemid. Dacă prezentați simptome după expunere, cum ar fi o erupție cutanată, consultați medicul și arătați-i acest avertisment. Umflarea feței, a buzelor sau a ochilor sau dificultatea de a respira sunt simptome mai grave și necesită urgent îngrijiri medicale.

În caz de ingerare accidentală, consultați imediat medicul și arătați-i prospectul sau eticheta de pe ambalaj.

#### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

Este posibil să apară reactivitate încrucișată la sulfonamide.

În cazuri rare, medicamentul poate cauza apariția de fecale moi. Aceste simptome sunt trecătoare și nu necesită încetarea tratamentului.

Ca urmare a acțiunii diuretice a furosemidului, medicamentul poate cauza hemoconcentrație și insuficiență circulatorie. În cazul unui tratament prelungit, pot apărea deficit de electroliți (inclusiv hipokalemie, hiponatremie) și deshidratare.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate)

#### **4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat**

În urma studiilor de laborator s-au constatat efecte teratogene.

Nu s-a determinat siguranța administrării produsului la femelele gestante și în lactație, furosemidul fiind eliminat în lapte.

La animalele gestante și în lactație, produsul trebuie utilizat numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc realizată de către veterinarul curant.

#### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Administrarea simultană de substanțe care afectează echilibrul electrolitic (corticosteroizi, alte diuretice, amfotericină B, glicozide cardiace) necesită monitorizarea atentă.

Administrarea concomitentă de aminoglicozide sau cefalosporine poate duce la creșterea nefrotoxicității.

Furosemidul poate spori riscul de alergii la sulfonamidă.

Furosemidul poate modifica necesarul de insulină în cazul animalelor cu diabet.

Furosemidul poate reduce excreția medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene.

Poate fi necesară modificarea regimului de dozare în cazul tratamentului pe termen lung, în combinație cu inhibitori ECA, în funcție de reacția animalului la terapie.

#### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Cale orală.

Între 1 și 5 mg furosemid/kg greutate corporală pe zi, adică între ½ și 2,5 comprimate de produs per 5 kg greutate corporală, administrat în doză unică sau împărțită în două administrări zilnice.

În funcție de severitatea edemului sau ascitei sau în cazuri refractare, doza zilnică poate fi dublată.

Exemplu privind o doză-țintă de 1 mg/kg per administrare:

Comprimate per administrare
--------------------------------

	LIBEO 10 mg
2 – 3,5 kg	1/4
3,6 – 5 kg	1/2
5,1 – 7,5 kg	3/4
7,6 – 10 kg	1
10,1 – 12,5 kg	1 1/4
12,6 – 15 kg	1 1/2

Pentru câini de 15,1 kg până la 50 kg greutate corporală utilizați Libeo 40 mg comprimate.

Pentru menținere, dozele trebuie adaptate de către veterinar la doza minimă efecace, în funcție de reacția clinică a câinelui la terapie.

Poate fi necesară adaptarea dozelor și a programului de administrare în funcție de starea animalului. Dacă tratamentul este administrat seara chiar înainte de culcare, acesta poate cauza diureză neconvenabilă pe timpul nopții.

Instrucțiuni privind divizarea comprimatului: Așezați comprimatul pe o suprafață plană, cu partea crestată în jos (cu fața convexă în sus). Cu vârful arătătorului, apăsați ușor perpendicular pe mijlocul comprimatului, pentru a-l rupe în două jumătăți pe lățime. Pentru a obține sferturile, apăsați apoi ușor cu degetul arătător pe mijlocul unei jumătăți, pentru a o rupe pe lungime.

Comprimatele sunt aromate și pot fi amestecate cu puțină mâncare oferită înaintea mesei principale sau pot fi administrate direct în gura animalului

#### 4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Depășirea dozelor recomandate poate cauza surditate tranzitorie, probleme de echilibru electrolitic și hidric, efecte asupra SNC (letargie, comă, convulsii) și colaps cardiovascular. Se recomandă tratament simptomatic.

#### 4.11 Timp(i) de așteptare

Nu este cazul.

### 5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică : diuretice, furosemid

Codul veterinar ATC: QC03CA01

#### 5.1 Proprietăți farmacodinamice

Furosemidul este un diuretic de ansă puternic, care mărește volumul urinar. El inhibă resorbția electroliților în tubul renal proximal și distal și în segmentul ascendent al ansei lui Henle. Se mărește excreția ionilor de sodiu, a ionilor de clor și într-o mai mică măsură, a ionilor de potasiu, precum și excreția apei. Furosemidul nu are niciun efect asupra anhidrazei carbonice.

#### 5.2 Particularități farmacocinetice

Furosemidul este excretat în urină în formă neschimbată.

După administrarea orală a produsului (5 mg/kg), furosemidul este absorbit rapid, nivelurile plasmatiche maxime (C<sub>max</sub> din 2126 ng/ml) atingându-se în decurs de 1,1 ore. Timpul de înjumătățire terminal de eliminare este de 2,6 ore.

Furosemidul este eliminat predominant prin rinichi în urină (70 %) și în fecale. Legarea furosemidului de proteinele plasmatiche este de 91%, iar volumul de distribuție estimat este de 0,52 l/kg. Furosemidul se metabolizează în cantități foarte mici (principalul metabolit: acid 4-cloro-5-sulfamoil-antranilic, fără activitate diuretică).

La câini, după administrarea pe cale orală, furosemidul cauzează o creștere a volumului de urină în funcție de doză, care începe la 1 oră după administrare și atinge nivelul maxim la 2-3 ore după administrare, durând aproximativ 6 ore.

## **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

### **6.1 Lista excipienților**

Aromă de pui  
Extract de drojdie (*Saccharomices cerevisiae*)  
Maltodextrină  
Stearat de magneziu  
Dioxid de siliciu coloidal anhidru  
Celuloză microcristalină  
Croscarmeloză sodică  
Lactoză monohidrat

### **6.2 Incompatibilități majore**

Nu este cazul.

### **6.3 Perioadă de valabilitate**

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 30 luni  
Orice comprimat utilizat parțial ar trebui să fie utilizat în 72 ore

### **6.4 Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C  
Orice comprimat utilizat parțial trebuie reintrodus în blisterul deschis.

### **6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**

Blister din folie de culoare albă din PVC /PVDC/ aluminiu, sigilată termic x10 comprimate  
Cutie de carton x 1 blister x 10 comprimate (10 comprimate)  
Cutie de carton x 2 blistere x 10 comprimate fiecare (20 de comprimate)  
Cutie de carton x 10 blistere x10 comprimate fiecare (100 de comprimate)  
Cutie de carton x 12 blistere x 10 comprimate fiecare (120 de comprimate)  
Cutie de carton x 20 blistere x 10 comprimate fiecare (200 de comprimate)

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.


### **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Ceva Sante Animale România SRL,  
Str Chindiei, Nr 5, Sector 4,  
București 040185

Tel: (+4) 021 335 00 60  
Fax: (+4) 021 335 00 52  
ROMÂNIA




**8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

**9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

06.07.2015

**DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

**INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE**



**ETCHETARE ȘI PROSPECT**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie de carton x 1 blister x 10 comprimate (10 comprimate)  
 Cutie de carton x 2 blistere x 10 comprimate fiecare (20 de comprimate)  
 Cutie de carton x 10 blistere x 10 comprimate fiecare (100 de comprimate)  
 Cutie de carton x 12 blistere x 10 comprimate fiecare (120 de comprimate)  
 Cutie de carton x 20 blistere x 10 comprimate fiecare (200 de comprimate)

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Libeo 10 mg comprimate masticabile pentru câini  
 Furosemid

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE**

Un comprimat de 330 mg conține:

**Substanță activă:**

Furosemid ..... 10 mg

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Comprimat masticabil,

Comprimat în formă de trifoi, de culoare bej. Comprimatele pot fi divizate în sferturi egale.

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

Cutie de carton cu 10 comprimate  
 Cutie de carton cu 20 de comprimate  
 Cutie de carton cu 100 de comprimate  
 Cutie de carton cu 120 de comprimate  
 Cutie de carton cu 200 de comprimate

**5. SPECII ȚINTĂ**

Câini

**6. INDICAȚIE (INDICAȚII)****7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

**8. TIMP(I) DE AȘTEPTARE****9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

**10. DATA EXPIRĂRII**



EXP {lună/an}

**11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C  
Orice comprimat utilizat parțial trebuie reintrodus în blisterul deschis și utilizat în decurs de 72 de ore.

**12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz**

Numai pentru uz veterinar – se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

**14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR”**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Ceva Sante Animale România SRL,  
Str Chindiei, Nr 5, Sector 4,  
București 040185  
Tel: (+4) 021 335 00 60  
Fax: (+4) 021 335 00 52  
ROMÂNIA

**16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

**17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

Serie

**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII**

Blister din PVC /PVDC/ aluminiu, sigilat termic, x10 comprimate

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Libeo 10 mg comprimate masticabile pentru câini  
Furosemid

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**



**3. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

**4. NUMĂRUL SERIEI**

Serie

**5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.

ANERA m 4



**PROSPECT**

## PROSPECT

### Libeo 10 mg comprimate masticabile pentru câini

#### 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

##### Deținătorul autorizației de comercializare

Ceva Sante Animale România SRL,  
Str Chindiei, Nr 5, Sector 4,  
București 040185  
Tel: (+4) 021 335 00 60  
Fax: (+4) 021 335 00 52  
ROMÂNIA

##### Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Ceva Santé Animale  
Boulevard de la Communication  
Zone Autoroutière  
53950 LOUVERNE  
Franța

#### 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Libeo 10 mg comprimate masticabile pentru câini  
Furosemid

#### 3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Un comprimat de 330 mg conține:

##### **Substanță activă:**

Furosemid ..... 10 mg

Comprimat masticabil

Comprimat în formă de trifoi, de culoare bej. Comprimatele pot fi divizate în sferturi egale

#### 4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Tratamentul ascitei și al edemului, în special asociate cu insuficiența cardiacă

#### 5. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la câinii care suferă de hipovolemie, hipotensiune sau deshidratare.

A nu se utiliza în caz de insuficiență renală cu anurie.

A nu se utiliza în caz de deficit de electroliți.

A nu se utiliza în cazul hipersensibilității față de furosemid, de sulfonamide sau de oricare dintre excipienți.

#### 6. REACȚII ADVERSE

Este posibil să apară reactivitate încrucișată la sulfonamide.

În cazuri rare, medicamentul poate cauza apariția de fecale moi. Aceste simptome sunt trecătoare și nu necesită încetarea tratamentului.

Ca urmare a acțiunii diuretice a furosemidului, medicamentul poate cauza hemoconcentrație și insuficiență circulatorie. În cazul unui tratament prelungit, pot apărea deficit de electroliți (inclusiv hipokaliemie, hiponatremie) și deshidratare.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate)

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

## 7. SPECII ȚINTĂ

Câini

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Cale orală.

Între 1 și 5 mg furosemid/kg greutate corporală pe zi, adică între ½ și 2,5 comprimate de produs per 5 kg greutate corporală, administrat în doză unică sau împărțită în două administrări zilnice.

În funcție de severitatea edemului sau ascitei sau în cazuri refractare, doza zilnică poate fi dublată.

Exemplu privind o doză-țintă de 1 mg/kg per administrare:

	Comprimate per administrare
	LIBEO 10 mg
2 – 3,5 kg	1/4
3,6 – 5 kg	½
5,1 – 7,5 kg	3/4
7,6 – 10 kg	1
10,1 – 12,5 kg	1 1/4
12,6 – 15 kg	1 1/2

Pentru câini de 15,1 kg până la 50 kg greutate corporală utilizați Libeo 40 mg comprimate.

Pentru menținere, dozele trebuie adaptate de către veterinar la doza minimă eficientă, în funcție de reacția clinică a câinelui la terapie.

Poate fi necesară adaptarea dozelor și a programului de administrare în funcție de starea animalului.

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Comprimatele sunt aromate și pot fi amestecate cu puțină mâncare oferită înaintea mesei principale sau pot fi administrate direct în gura animalului

Dacă tratamentul este administrat seara chiar înainte de culcare, acesta poate cauza diaree neconvenabilă pe timpul nopții.

Instrucțiuni privind divizarea comprimatului: Așezați comprimatul pe o suprafață plană, cu partea crestată în jos (cu fața convexă în sus). Cu vârful arătătorului, apăsați ușor perpendicular pe mijlocul comprimatului, pentru a-l rupe în două jumătăți pe lățime. Pentru a obține sferturile, apăsați apoi ușor cu degetul arătător pe mijlocul unei jumătăți, pentru a o rupe pe lungime.

## 10. TIMP(I) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.

Orice comprimat utilizat parțial trebuie reintrodus în blisterul deschis și utilizat în decurs de 72 ore.

A nu se utiliza după data de expirare menționată pe cutia de carton și pe blister după „EXP.” Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

## 12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Eficacitatea terapeutică poate fi redusă în cazul consumului crescut de apă potabilă. Dacă starea animalului permite acest lucru, consumul de apă trebuie limitat la nivelurile normale din punct de vedere fiziologic pe durata tratamentului.

### Precauții speciale pentru utilizare la animale

Comprimatele fiind aromate, acestea trebuie păstrate într-un loc sigur, astfel încât animalele să nu aibă acces la ele.

Furosemidul trebuie utilizat cu precauție în cazul în care există deja un dezechilibru electrolitic și/sau hidric, insuficiență hepatică (poate precipita coma hepatică) și diabet. În cazul tratamentului prelungit se recomandă monitorizarea frecventă a stării de hidratare și a electroliților din ser.

Cu 1-2 zile înainte și după începerea tratamentului cu diuretice și inhibitori ECA, se recomandă monitorizarea funcției renale și a stării de hidratare.

### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută față de furosemid li se recomandă să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Spălați mâinile după utilizare.

Nu manipulați acest produs dacă știți că sunteți sensibil(ă) la sulfonamide, deoarece hipersensibilitatea față de sulfonamide poate duce la hipersensibilitate față de furosemid. Dacă prezentați simptome după expunere, cum ar fi o erupție cutanată, consultați medicul și arătați-i acest avertisment. Umflarea feței, a buzelor sau a ochilor sau dificultatea de a respira sunt simptome mai grave și necesită urgent îngrijiri medicale.

În caz de ingerare accidentală, consultați imediat medicul și arătați-i prospectul sau eticheta de pe ambalaj.

Gestație și lactație În urma studiilor de laborator s-au constatat efecte teratogene.

Nu s-a determinat siguranța administrării produsului la femelele gestante și în lactație, deoarece furosemidul este eliminată în lapte.

La animalele gestante și în lactație, produsul trebuie utilizat numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc realizată de către veterinarul curant.

### Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Administrarea simultană de substanțe care afectează echilibrul electrolitic (corticosteroizi, alte diuretice, amfotericină B, glicozide cardiace) necesită monitorizarea atentă.

Administrarea concomitentă de aminoglicozide sau cefalosporine poate duce la creșterea nefrotoxicității.

Furosemidul poate spori riscul de alergii la sulfonamidă.

Furosemidul poate modifica necesarul de insulină în cazul animalelor cu diabet.

Furosemidul poate reduce excreția medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene.

Poate fi necesară modificarea regimului de dozare în cazul tratamentului pe termen lung, în combinație cu inhibitori ECA, în funcție de reacția animalului la terapie.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi) epășirea dozelor recomandate poate cauza surditate tranzitorie, probleme de echilibru electrolitic și hidric, efecte asupra SNC (letargie, comă, convulsii) și colaps cardiovascular.

Se recomandă tratament simptomatic.

### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

### **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

### **15. ALTE INFORMAȚII**

#### Dimensiuni de ambalaje:

Cutie de carton cu 10 comprimate

Cutie de carton cu 20 de comprimate

Cutie de carton cu 100 de comprimate

Cutie de carton cu 120 de comprimate

Cutie de carton cu 200 de comprimate

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Ceva Sante Animale România SRL,  
Str Chindiei, Nr 5, Sector 4,  
București 040185  
Tel: (+4) 021 335 00 60  
Fax: (+4) 021 335 00 52  
ROMÂNIA

