


MARBOCYL 2%, solutie injectabila pentru bovine (vitei prerumegatorii si rumegatorii) si suine

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

APPROVED

Alderic SCHEUFHOUT
Regulatory Affairs Officer
14/09/2016

VETOQUINOL S.A.


VETOQUINOL S.A.
Veterinary Specialities
Magny-Vernois
70200 LURE - France
Tel: +33-3-84-62-55-56
Fax: +33-3-84-62-55-56

A.S.

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MARBOCYL 2%, 20 mg/ml, soluție injectabilă pentru bovine (viței prerumegători și rumegători) și suine

2. COMPOZITIE CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml soluție injectabilă contine :

Substanța activă :

Marbofloxacină..... 20.0 mg

Excipienți :

Edetat disodic 0.1 mg

Tioglicerol 0.5 mg

Metacrezol 2.0 mg

Excipienți până la..... 1 ml

Pentru o listă completă a excipientilor, a se citi secțiunea 6.1.

3. FORMĂ FARMACEUTICĂ


Soluție injectabilă.

Soluție lăptăoare de culoare galben verzuie pana la galben maronie.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii tintă

Bovine (viței prerumegători și rumegători) și suine


VETOQUINOL S.A.

Veterinary Specialities

Magny-Vernois

70200 LURE - France

Tel +33-3-84-62-55-55

Fax +33-3-84-62-55-56

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor tintă

La bovine (viței prerumegători și rumegători)

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de specii sensibile de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* și *Mycoplasma bovis*.

La suine

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de specii sensibile de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*.

4.3 Contraindicații

A nu se administra în cazul infecțiilor bacteriene cu rezistență la alte fluorochinolone (rezistență încrucisată).

A nu se administra animalelor care au fost depistate anterior cu hipersensibilitate la marbofloxacină sau alte chinolone.

A.S.


VETOQUINOL S.A.
Veterinary Specialties
Magny-Vernois
70200 LURE - France
Tél +33-3-84-62-55-55
Fax +33-3-84-62-55-56

4.4 Atentionări speciale pentru fiecare specie și tintă

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru administrarea la animale

Recomandari privind utilizarea cu prudenta

La utilizarea produsului trebuie să se tina seama de politicile oficiale si locale privind antimicrobienele.

Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afectiunilor clinice cu raspuns insuficient sau care se preconizeaza ca vor avea un raspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene.

Ori de cate ori este posibil, fluoroquinolonele trebuie utilizate doar in urma efectuarii analizelor de susceptibilitate.

Utilizarea produsului care se abate de la instructiunile furnizate in RCP poate spori prevalenta bacteriilor rezistente la fluoroquinolone si poate scadea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorita potentialului de rezistență incrucesata.

Precauții speciale pentru persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

In caz de ingestie, contact accidental cu pielea sau autoaccidentare, solicitatati imediat sfatul medicului si prezentati prospectul sau eticheta produsului. Persoana care manipuleaza produsul medicinal veterinar trebuie sa poarte echipament de protectie.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Administrarea pe cale subcutanată si intramusculară poate cauza edem trecător la locul injectării. Administrarea pe cale intramusculară poate cauza durere și leziuni inflamatorii la locul injectării. Leziunile inflamatorii persistă aprox. 6 zile la suine și 12 zile la viței.

4.7 Utilizarea în timpul gestației și al lactației

Utilizarea în perioada de gestație: studiile de laborator pe animale (șobolani, iepuri) nu au identificat efecte teratogene, embriotoxic sau alte efecte toxice maternale ale marbofloxacinei.

Utilizarea în perioada de lactație: se va face pe baza evaluării balantei risc-beneficiu de către medicul veterinar

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

4.9 Cantități de administrat și cale (căi) de administrare

La vitei prerumegători și rumegători:

Doza recomandată este de 2mg/kg greutate corporală/zi (1 ml/10kg), pe cale subcutanată sau intramusculară, timp de 3 până la 5 zile. Prima administrare poate fi făcută intravenos.

La suine:

A.S.


Tratamentul bolilor respiratorii: doza recomandată este de 2 mg/kg greutate corporală/zi (1 ml/10kg greutate corp) pe cale intramusculară, timp de 3 până la 5 zile.

Pentru asigurarea unei dozari corecte trebuie determinata cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de cate ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot)

Nu s-au observat reacții adverse, altele decat cele mentionate pentru administrarea unei singure doze în urma administrației unei doze de 3 ori mai mare decât cea recomandată. Supradozarea poate cauza apariția unor tulburări neurologice acute care vor trebui tratate simptomatice.

4.11 Timp de așteptare

	Vîței prerumegători și rumegători	Suine	Tel +33-3-84-52-55-55 Fax +33-3-84-52-55-56
Carne și organe	4 zile	2 zile	

VETOQUINOL S.A.

Veterinary Specialities

Magny-Vernois

70200 LURE - France

Acest produs medicinal veterinar nu este autorizat pentru a fi administrat la animalele ce produc lapte pentru consum uman.

5. Proprietăți farmacologice

Grupa farmacoterapeutică: Antibacteriene pentru utilizare sistemica; Quinolone și Quinoxaline antibacteriene, fluorochinolone

ATC Vet code: QJ01MA93

5.1. Proprietăți farmacodinamice:

Marbofloxacină este un agent antimicrobian sintetic, bactericid, ce aparține grupei fluorochinolone și care acționează prin inhibarea girazei ADNului. și-a dovedit eficiența împotriva mai multor bacterii Gram pozitive, în special *Staphylococcus* și Gram negative (*Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica* și *Actinobacillus pleuropneumoniae*) dar și *Mycoplasma* (*Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma hyopneumoniae*). Poate apărea rezistență la *Streptococcus*.

5.2. Particularități farmacocinetice:

În urma administrației subcutanate sau intramusculare la bovine și suine a dozei recomandate de 2 mg/kg, marbofloxacină este imediat asimilată și atinge concentrații maxime în plasmă de 1.5 µg/ml în mai puțin de 1 oră.

Biodisponibilitatea se apropie de 100 %.

Marbofloxacină face legături slabe cu proteinele plasmatiche (mai puțin de 10% la suine și 30% la bovine) și difuzează considerabil. În majoritatea țesuturilor (ficat, rinichi, piele, plămâni, vezica urinară, uter) atinge concentrații mai mari decât în plasmă.

Marbofloxacină se elimină încet la vîței pre-rumegători ($t_{1/2} = 5-9$ ore) și la porci ($t_{1/2} = 8-10$ ore), mai repede la vîțele rumegătoare ($t_{1/2} = 4-7$ ore), mai ales în formă activă prin urină și fecale.

6. Particularități farmaceutice

A.S.

6.1 Lista excipientilor

Gluconolactonă, edetat disodic, manitol, tioglicerol, metacrezol, apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinară.

6.3 Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar asa cum este ambalat pentru vanzare: 24 luni

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

6.4 Precauții speciale de depozitare

A se pastra la o temperatura mai mica de 25°C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Ambalaj primar:

Flacon din sticlă de culoare maronie de tip II cu 10, 20, 50, 100 si 250 ml. Flaconul se închide cu dop din cauciuc clorobutil si capsă din aluminiu.

Ambalaj secundar:

Cutie de carton cu 1 flacon x 10 ml

Cutie de carton cu 1 flacon x 20 ml

Cutie de carton cu 1 flacon x 50 ml

Cutie de carton cu 1 flacon x 100 ml

Cutie de carton cu 1 flacon x 250 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate..

-VETOQUINOL S.A.

Veterinary Specialities

Magny-Vernois

70240 LURE - France

Tél +33-3-84-62-55-55

Fax +33-3-84-62-55-56

7. NUMELE SI ADRESA PERMANENTĂ SAU SEDIUL ÎNREGISTRAT AL DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois

B.P. 189,

F - 70204 LURE CEDEX

FRANTA

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

140166

A.S.

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI / REÎNNOIRI A AUTORIZAȚIEI

24.11.2008/28.07.2014

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Aprilie 2016

INTERDICȚII PENTRU VANZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Se elibereaza nurnai pe baza de reteta veterinara.

VETOQUINOL S.A.


Veterinary Specialities

Magny-Vernois

70200 LURE - France

Tel +33-3-84-62-55-55

Fax +33-3-84-62-55-56




A.S.

ETICHETĂ ȘI PROSPECT

MARBOCYL 2%, solutie injectabila pentru bovine (vitei prerumegatori si rumegatori) si suine

VETOQUINOL S.A.
Veterinary Specialities
Magny-Vernois
70200 LURE - France
Tel +33-3-84-59-55-55
Fax +33-3-84-59-55-56



A.S.

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITATI MICI DE AMBALAJ PRIMAR

Flacon de sticla de tip II cu 10, 20 si 50 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MARBOCYL 2%, 20 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine (vitei prerumegatori și rumegatori) și suine.
marbofloxacina

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ/E ACTIVĂ

Marbofloxacina..... 20.0 mg/ml

3. CONȚINUT ÎN GREUTATE, ÎN VOLUM SAU ÎN NUMĂR DE DOZE

10 ml, 20 ml, 50 ml

4. CALE /CĂI DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale subcutanată și intramusculară.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

5. TEMP DE AȘTEPTARE

	Vîtei prerumegători și rumegători	Suine
Carne și organe	4 zile	2zile

6. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS

7. DATA EXPIRARII

Expira: luna/an
După prima deschidere, se va utiliza pana la 28 zile.

8. MENTIUNEA "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR"

Numai pentru uz veterinar.

VETOQUINOL S.A.
veterinary Specialities
Maigny-Vernois
20210 LURE - France
Tél: +33-3-84-62-55-55
Fax: +33-3-84-62-55-56

A.S.

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR
Flacon de sticla de tip II cu 100 și 250 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MARBOCYL 2%, 20 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine (vitei prerumegatori și rumegatori)
și suine.
marbofloxacina

2. DECLARAREA SUBSTANȚE ACTIVE ȘI ALTE SUBSTANȚE

1 ml conține :

Marbofloxacină..... 20.0 mg
Edeat disodic..... 0.1 mg
Tioglicerol 0.5 mg
Metacrezol 2.0 mg

~~VETOQUINOL S.A.~~
~~Veterinary Specialities~~
~~Magny-Vernois~~
~~70200 LURE - France~~
Tél +33-3-84-62-55-55
Fax +33-3-84-62-55-56

3. FORMĂ FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

4. CONȚINUT ÎN GREUTATE, ÎN VOLUM SAU ÎN NUMĂR DE DOZE

100 ml, 250 ml

5. SPECII TINTĂ

Bovine (vitei prerumegatori și rumegatori) și suine.

6. INDICAȚII

A se citi prospectul înainte de utilizare.

7. METODA SI CALE /CĂI DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

	Vitei prerumegători și rumegători	Suine
Carne și organe	4 zile	2 zile

9. ATENȚIONĂRI SPECIALE, DACA SUNT NECESARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRARII

.Expira: luna/an...

A.S.

După prima deschidere, se va utiliza pana la 28 zile.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se pastra la temperaturi mai mici de 25°C.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DIN UTILIZAREA UNOR ASTFEL DE PRODUSE

Orice produs medicinal veterinar nefolosit sau deșeuri obținute din folosirea acestor produse medicinale veterinare trebuie reciclate in conformitate cu cerintele nationale

13. MENTIUNEA "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR" ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONE PRIVIND VÂNZAREA ȘI UTILIZAREA

Numai pentru uz veterinar.

Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara.

14. MENTIUNEA "A NU SE LĂSA LA INDEMÂNA COPIILOR"

A nu se lasa la indemana si vederea copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

VETOQUINOL S.A.
Magny-Vernois
B.P. 189,
F - 70204 LURE CEDEX
FRANTA


VETOQUINOL S.A.
Veterinary Specialities
Magny-Vernois
70200 LURE - France
Tel : +33-3-84-62-55-55
Fax : +33-3-84-62-55-56

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

140166

17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie>lot>numar

A.S.

INFORMATII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

cutie de carton cu 1 flacon x 10 ml, cutie de carton cu 1 flacon x 20 ml, cutie de carton cu 1 flacon x 50 ml, cutie de carton cu 1 flacon x 100 ml, cutie de carton cu 1 flacon x 250 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MARBOCYL 2%, 20 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine (vîtei prerumegatori și rumegatori) și suine.

marbofloxacină

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANTE

1 ml conține:

Marbofloxacină	20.0 mg
Edetat disodic	0.1 mg
Tioglicerol	0.5 mg
metacrezol	2.0 mg

3. FORMĂ FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

4. DIMENSIUNE AMBALAJ

Cutie de carton cu 1 flacon x 10 ml
Cutie de carton cu 1 flacon x 20 ml
Cutie de carton cu 1 flacon x 50 ml
Cutie de carton cu 1 flacon x 100 ml
Cutie de carton cu 1 flacon x 250 ml

VETOQUINOL S.A.

Melegny Specialities

Magny-Vernois

77200 L'URE - France

Tel +33-3-84-62-55-55

Fax +33-3-84-62-55-56

5. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vîtei prerumegatori și rumegatori) și suine.

6. INDICAȚII

La vîtei prerumegători și rumegători

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de speciile sensibile de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* și *Mycoplasma bovis*.

La suine

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de speciile sensibile de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*.

A.S.

7. METODĂ ȘI CALE DE ADMINISTRARE

La viței prerumegători și rumegători:

Doza recomandată este de 2mg/kg greutate corporală /zi (1 ml/10kg), pe cale subcutanată sau intramusculară, timp de 3 până la 5 zile. Prima administrare poate fi făcută intravenos.

La suine:

Tratamentul bolilor respiratorii: doza recomandată este de 2 mg/kg greutate corporală/zi (1 ml/10kg greutate corporală/zi) pe cale intramusculară, timp de 3 până la 5 zile.

8. TEMP DE AȘTEPTARE

	Viței prerumegători și rumegători	Suine
Carne și organe	4zile	2 zile

9. ATENȚIONĂRI SPECIALE, DACĂ ESTE NECESAR

A se citi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRARII

Expira : luna/an

După prima deschidere, se va utiliza pana la 28 zile.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se pastra la o temperatura sub 25°C.

12. Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinarne neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

13. MENTIUNEA "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR" ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONI LA VÂNZAREA ȘI UTILIZAREA , dacă este cazul

Nuramai pentru uz veterinar.

Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara.

14. MENTIUNEA "A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR"

A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor.

VETOQUINOL S.A.
Veterinary Specialities
123 Avenue Vernois
91190 CURE - France
Tél. +33 1 61 62-55-55
Fax. +33 1 61 62-55-56

A.S.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

VETOQUINOL S.A.
Magny-Vernois
B.P. 189,
F - 70204 LURE CEDEX
FRANTA

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

140166

17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot>sarja>BN>

VETOQUINOL S.A.
Veterinary Specialties
Magny-Vernois
70200 LURE - France
Tél. (03) 84 62 55 55
Fax (03) 84 62 55 56



A.S

PROSPECT

MARBOCYL 2%, 20 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine (vitei prerumegatori și rumegatori) și suine.

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A CELUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Detinătorul autorizației de comercializare

VETOQUINOL S.A.
Magny-Vernois
B.P. 189,
F - 70204 LURE CEDEX
FRANTA

Producători responsabili pentru eliberarea seriei

VETOQUINOL S.A.
Magny-Vernois
B.P. 189,
F - 70204 LURE CEDEX
Franta

sau

VETOQUINOL BIOWET SP.ZO.O.
ul. Kosynierow Gdynskich 13-14
66-400 Gorzow Wlkp
Polonia

VETOQUINOL S.A.
Veterinary Specialities
Magny-Vernois

7200 LURE - France

+33-3-84-62-55-55

+33-3-84-62-55-56

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MARBOCYL 2%, 20 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine (vitei prerumegatori și rumegatori) și suine.
marbofloxacina

3. DECLARAȚIA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

1 ml conține:

Substanța activă:

Marbofloxacină..... 20.0 mg

Excipienti:

Gluconolactonă, edetat disodic, manitol, tioglicerol, metacrezol, apă pentru preparate injectabile

4. INDICAȚII

La vitei prerumegători și rumegători

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de speciile sensibile de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* și *Mycoplasma bovis*.

La suine

A.S.

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de specile sensibile de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*.

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra în cazul infecțiilor cu bacterii rezistente la alte fluorochinolone (rezistență încrucișată).

A nu se administra la animalele depistate anterior cu hipersensibilitate la marbofloxacină sau alte chinolone.

6. REACȚII ADVERSE

Administrarea pe cale subcutanată și intramusculară poate cauza edem trecător la locul injectării. Administrarea pe cale intramusculară poate cauza durere și leziuni inflamatorii la locul injectării. Leziunile inflamatorii persistă aprox. 6 zile la suine și 12 zile la viței.

În cazul în care observați efecte secundare grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vîtei prelumegători și rumegători) și suine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

La viței prelumegători și rumegători:

Doza recomandată este de 2mg/kg greutate corporală/zi (1 ml/10kg) pe cale subcutanată sau intramusculară, timp de 3 până la 5 zile. Prima administrare poate fi făcută intravenos.

La suine:

Tratamentul bolilor respiratorii: doza recomandată este de 2 mg/kg greutate corporală /zi (1 ml/10kg greutate corporală/zi) pe cale intramusculară, timp de 3 până la 5 zile.

Pentru asigurarea unei dozari corecte trebuie determinata cu acuratețe greutatea corporala a animalelor ori de cate ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

A nu se utilizează dacă observați semne de deteriorare ale flaconului.

10. TEMP DE ASTEPTARE

VETOQUINOL S.A.

Veterinary Specialties

Montigny-Vernois

FRANCE - France

33-3-84-62-55-55

33-3-84-62-55-56

	Vîtei prelumegători și rumegători	Suine
Carne și organe	4 zile	2 zile

11. PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra la temperatura sub 25°C.

A nu se utilizează după data expirării marcata pe eticheta

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului: 28 zile

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A.S.

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru administrarea la animale

La utilizarea produsului trebuie să se tina seama de politicile oficiale si locale privind antimicrobienele.

Floroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afectiunilor clinice cu răspuns insufficient sau care se preconizeaza ca vor avea un răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene.

Ori de cate ori este posibil, floroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.

Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate în RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la floroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potențialului de rezistență încrucișată.

Precauții speciale pentru persoana care administrează produsul medicinal la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

În caz de ingestie, contact accidental cu pielea sau autoinjectare, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului. Persoana care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie să poarte echipament de protecție.

Utilizarea în perioada de gestație sau de lactație

Utilizarea în perioada de gestație: studiile de laborator pe animale (șobolani, iepuri) nu au identificat efecte teratogene, embriotoxice sau alte efecte toxice maternale ale marbofloxacinei.

Utilizarea în perioada de lactație: se va face pe baza evaluării balantei risc-beneficiu de către medicul veterinar

Supradozare (simptoame, proceduri de urgență, antidot)

Nu s-au observat reacții adverse, altele decât cele menționate pentru administrarea unei singure doze, în urma administrării unei doze de 3 ori mai mare decât cea recomandată. Supradozarea poate cauza apariția unor tulburări neurologice acute care vor trebui tratate simptomatic.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

13. Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar nefolosit sau deșeuri obținute din folosirea acestor produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale


14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Aprilie 2016

15. ALTE INFORMAȚII

Ambalaje:

Cutie de carton cu 1 flacon x 10 ml



A.S

Cutie de carton cu 1 flacon x 20 ml
Cutie de carton cu 1 flacon x 50 ml
Cutie de carton cu 1 flacon x 100 ml
Cutie de carton cu 1 flacon x 250 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate..

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

VETOQUINOL S.A.
Veterinary Specialities
Magny-Vernois
70300 LURE - France
Tel +33-3-84-62-55-55
Fax +33-3-84-62-55-56

AS