



ND-SINCO-BRONVAC

VACCINULUI ULEIOS INACTIVAT
CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE (BOALA DE NEWCASTLE),
SINDROMULUI CĂDERII OUATULUI (EGG DROP SYNDROME)
ȘI A BRONȘITEI INFECȚIOASE AVIARE

COMPOZIȚIE

Vaccin mixt, inactivat ce conține:

- virusul pseudopestei aviare (NCD) cu titrul de minimum 10^9 DIE₅₀/ml
- virusul sindromului căderii ouatului (EDS) cu titrul de minimum $10^{7.5}$ DIE₅₀/ml
- și virusul bronșitei infecțioase aviare (BI) cu titrul $\geq 10^{6.5}$ DIE₅₀/ml

PREZENTARE

Emulsie uleioasă omogenă de culoare albă.

ACȚIUNE IMUNOLOGICĂ

Imunitatea începe să se instaleze la 2–3 săptămâni de la vaccinare, se definitivează după 4 săptămâni de la aceasta și durează cel puțin 6 luni. Pentru întreținerea imunității păsările se revaccinează la interval de 6 luni.

INDICAȚII

Vaccinul se recomandă în profilaxia specifică a pseudopestei aviare, sindromului căderii ouatului și bronșitei infecțioase aviare, la tineretul sănătos din efectivele de reproducție și selecție, vaccinat anterior contra pseudopestei și bronșitei infecțioase aviare cu produsele vii corespunzătoare. Se administrează înainte de transferul în sectorul de adulte (115–126 zile) acolo unde s-au constatat căderi ale producției de ouă datorate virusului EDS₇ și/sau bronșitei infecțioase aviare. Se poate administra și după vaccinuri inactivate monovalente (NEDEVAC, SINCOVAC), în care caz rapelul la 4 săptămâni cu vaccinul ND-SINCO-BRONVAC determină un efect "booster", care asigură o imunitate superioară, constantă, uniformă în efectiv și progeneri.

ADMINISTRARE ȘI DOZAJ

Administrarea se face pe cale intramusculară (mușchii coapsei sau ai pieptului) sau subcutanat (regiunea occipitală). Doza de vaccin este 0,5 ml.

Înainte de folosire produsul se aduce la temperatura camerei, pentru fluidizare. În timpul vaccinării flaconul cu vaccin se agită puternic.

REAȚII POSTVACCINALE

Nu s-au constatat reacții generale.

Uneori poate apărea o reacție locală care se remite în scurt timp.

CONTRAINDICAȚII

Vaccinul ND-SINCO-BRONVAC nu se administrează la efective în care evoluează alte boli.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

La temperaturi între 2 °C și 8 °C, ferit de lumină și îngheț.

AMBALAJ

Flacoane ce conțin 100 ml, 200 ml și 400 ml produs, reprezentând 200, 400 și, respectiv, 800 doze vaccinale.

VALABILITATE

24 luni.

PRODUCĂTOR



Societatea Națională "Institutul Pasteur" S.A.
Calea Giulești nr. 333, sector VI, București, cod 060269
Tel. (01)220.69.20 Fax (01)220.69.15

Rugăm însoțiți orice reclamație cu numărul seriei înscris pe etichetă

Dr. A. Rdebe