

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

“NEDEVAC”

VACCIN ULEIOS CONTRA PSEUDOPESTE AVIARE (BOALA DE NEWCASTLE)

COMPOZIȚIE

Suspensie de virus Newcastle, tulpina La Sota, cu titrul de $10^{9.5}$ DIE₅₀/ml inactivat cu formol și încorporat într-un adjuvant uleios.

ACȚIUNE IMUNOLOGICĂ

Imunitatea se instalează în 2-3 săptămâni și durează cel puțin 6 luni.

INDICAȚII

În profilaxia specifică bolii de Newcastle.

Se vor vaccina numai păsările sănătoase începând cu vârsta de 4 săptămâni. Este recomandat ca vaccinarea cu NEDEVAC să fie precedată de cel puțin o imunizare cu vaccin viu (tulpina La Sota sau LS₇₉); intervalul dintre vaccinarea cu vaccinuri vii și vaccinul NEDEVAC este de minimum 2 săptămâni.

MOD DE APLICARE ȘI DOZAJ

Administrarea se face pe cale intramusculară (mușchii coapsei sau ai pieptului) sau subcutan (treimea superioară a gâtului față dorsală) în doza de 0,5 ml.

Înainte și în timpul vaccinării flaconul cu vaccin se agită puternic.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

REAȚII POSTVACCINALE

Nu produce reacții generale; la locul de inoculare poate să apară un nodul care se resoarbe în 1-2 săptămâni.

CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează păsările bolnave.

PREZENTARE

Flacoane cu 50, 100 și 200 ml vaccin reprezentând 100, 200 și 400 doze.

CONSERVARE ȘI TRANSPORT

La temperatura de 2-8⁰C, ferit de lumină și îngheț.

VALABILITATE

În limita termenului înscris pe flacon.

OBSERVAȚII

Înainte de folosire se lasă la temperatura camerei 2-3 ore și se agită pentru omogenizare.
Se va folosi instrumentar steril.

PRODUCĂTOR



Societatea Națională "Institutul Pasteur" S.A
Calea Giulești nr. 333, sector VI, București, cod 77826
Tel.(01)220.69.20 Fax (01)220.69.15

Rugăm însoțiți orice reclamație cu
numărul seriei înscris pe etichetă