

PROSPECT

NEOTYL

– unguent intramamar pentru bovine –

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:

„ S.N. INSTITUTUL PASTEUR S.A”

Str. Calea Giulesti nr. 333, Bucuresti, sector 6, România.

Tel. : 021 220.69.20

Fax : 021 220.69.15

e-mail: pasteur@pasteur.ro

PRODUCATOR PENTRU ELIBERAREA SERIEI:

„ S.C PASTEUR – FILIALA FILIPEȘTI S.R.L”

Calea Giulesti nr. 333, sector 6, București, România

Tel: 021 220.69.20

Fax: 021 220.69.15

e-mail: pasteur@pasteur.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

NEOTYL – unguent intramamar pentru bovine

Substanțe active: Neomicina sulfat, Tilozina tartrat, Prednisolon, Vitamina A palmitat

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Fiecare seringă conține :

Substanțe active:

- Neomicina (sub formă sulfat)100 mg
- Tilozină (sub formă tartrat).....250 mg
- Prednisolon..... 10 mg
- Vitamina A palmitat.....10000 U.I.

Excipienți:

- Alcool benzilic90 mg

Butilhidroxianisol, dioxid de siliciu coloidal, parafină solidă, parafină lichidă, vaselină.



4. INDICAȚII

Tratamentul mastitelor (mamitelor) cu exprimare clinică (acute, subacute și cronice) în perioada de lactație, cât și a mastitelor subclinice din perioada repausului mamar.

5. CONTRAINDICAȚII

Se va evita tratamentul animalelor alergice la neomicină sau tilozină sau celor cu disfuncții hepatice.

6. REACȚII ADVERSE

Posibile reacții alergice, locale sau sistemice.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

- Bovine

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează intramamar, după mulgerea completă și igienizare (spălare, aseptizare) a sfertului mamar afectat.

Doza este de 10 g produs (o seringă) / sfert afectat / zi. Durata tratamentului: 3-5 zile în funcție de evoluția clinică a bolii.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de administrarea intramamară a produsului, ugerul trebuie muls complet iar mameloanele și ugerul trebuie spălate cu apă caldă și dezinfectate. Se va avea grijă ca la îndepărtarea murdariei de pe uger să nu se atingă vârful mameloanelor. După spălare, se usucă toată suprafața cu grijă și fiecare mamelon se șterge cu câte o lavetă de bumbac îmbibat cu o soluție antiseptică (de exemplu Germostop pentru uger)

Vârful seringii trebuie introdus în mamelon suficient de adânc, dar nu total pentru a nu răni pereții canalului galactoform, iar conținutul seringii trebuie injectat în fiecare canal în timp ce mamelonul este ținut ferm. După inoculare se face un masaj ușor pentru o bună distribuție a produsului la nivelul ugerului.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 28 zile

Lapte: 7 zile

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura mai mică de 25°C.

A se feri de îngheț.

A se proteja de lumina directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie.



Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 1 an

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A se aduce seringă la temperatura corpului (25-35°C) înainte de administrare.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:

15. ALTE INFORMAȚII

Acțiune farmacoterapeutică

NEOTYL este o combinație de două antibiotice (neomicină și tilozină), cu spectru antibacterian lărgit, având acțiune asupra unor germeni Gram pozitivi și Gram negativi. Are mare putere de pătrundere și remanentă în canalele galactofore. Administrarea simultană a prednisolonului reduce reacția inflamatorie asociată fenomenelor infectioase.

Concomitent, vitamina A asigură buna funcționare a tesuturilor epiteliale cât și regenerarea acestora.

Neomicina este un aminoglicozid bactericid și este activ împotriva bacteriilor aerobe. Nu este activ față de bacteriile anaerobe, dar este activ față de bacteriile care trăiesc facultativ "in vitro" în condiții de mediu anaerob.

Tilozina este un macrolid ale cărui componente sunt active împotriva celor mai multe bacterii Gram-pozitive, Mycoplasma și numeroase bacterii Gram-negative.

Este un antibiotic bacteriostatic și are același mecanism de acțiune ca și al eritromicinei (inhibă sinteza proteinelor) și același spectru de activitate. Prednisolonul este un glucocorticoid sintetic. În medicina veterinară, prednisolonul este folosit în formulele preparatelor cu antibiotice destinate administrării intramamare în tratamentul mastitelor la bovine. Doza uzuală de prednisolon este de 10 mg pe sfert infectat. tratamentul poate fi repetat la intervale de 12 ore pentru maxim 3 tratamente.

Vitamina A stimulează creșterea normală a celulelor epiteliale. participă la desfășurarea proceselor metabolice la nivel celular și datorită numeroaselor duble legături din moleculă joacă și un rol important în dinamica proceselor oxido-reducătoare. Local vitamina A se aplică pe piele, pe mucoase în forme medicamentoase adecvate.



Prezentare

Seringi de plastic cu 10 g unguent.

Cutie carton cu 50 seringi x 10 g unguent.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

