

NEWVAC LaSota

VACCIN VIU CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE
(BOALA DE NEWCASTLE)

COMPOZIȚIE

Suspensie de virus Newcastle liofilizat - tulpina lentogenă LaSota cultivată pe ouă embrionate de găină. Conține min. $10^{6,6}$ D₅₀/doză. Aspect: pastilă compactă de culoare alb gălbuie.

ACȚIUNE IMUNOLOGICĂ

Imunitatea se instalează după 14-21 zile de la vaccinare. Durata și intensitatea imunității depind de vârsta puiilor, starea de sănătate și de întreținere. Condițiile de igienă și de creștere pot influența instalarea imunității.

INDICAȚII

Imunizarea activă contra bolii de Newcastle (ND) la găini, curci, bibilici, fazani, porumbei. Se vaccinează păsările clinic sănătoase și cu stare de întreținere corespunzătoare.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Vaccinarea se poate face pe mai multe căi:

Vaccinarea în apa de băut: utilizată în orice sistem de creștere, se efectuează reconstituind vaccinul într-o cantitate de apă curată care să asigure 20 ml apă/puiul sub vârsta de 30 zile și 30 ml de apă/puiul mai mare (250 doze/5 l apă; 500 doze/10 l apă). Înainte de vaccinare păsările vor fi însetate 2-4 ore.

Oculoconjunctival sau nazal: 1 doză se reconstituie în 0,1 ml diluant (200 doze în 20 ml diluant sau 500 doze în 50 ml diluant) și se aplică în fiecare sac conjunctival sau fantă nazală. Metoda se recomandă în orice sistem de creștere pentru primele două vaccinări.

Vaccinarea intramusculară sau subcutană: inocularea se face în mușchii pectorali, coapsă sau s.c. cu 0,5 ml/pasăre adultă din vaccinul reconstituit în diluant (100 doze/50 ml; 200 doze/100 ml; 500 doze/250 ml). Pentru pui și în funcție de seringile din dotare se poate folosi o cantitate mai mică de diluant 0,2-0,3 ml/pui. Se recomandă aplicarea vaccinării parenterale după cea orală sau oculoconjunctivală.

Vaccinarea prin aerosoli: se aplică prin reconstituirea vaccinului în apă, în așa fel încât fiecărei păsări să-i revină o doză vaccinală cuprinsă într-o cantitate de apă ce variază de la 0,2-2 ml, în funcție de generatorul de aerosoli folosit și de vârsta păsărilor. Se aplică în ferme în care vaccinarea anterioară s-a efectuat cu tulpina LS₉ sau cu tulpina LaSota parenteral.

Vârsta la care se vaccinează păsările contra pseudopestei respectă următoarea schemă de principiu:

- ▶ prima vaccinare în a 2-a săptămână de viață;
- ▶ a 2-a vaccinare în a 4-a săptămână de viață;

Pentru o protecție îndelungată este necesară revaccinarea. Schemele sunt alcătuite de medicul veterinar în funcție de vaccin și situația epidemiologică din zonă.

În gospodăriile individuale, după primele 2 vaccinări cu vaccin viu, se recomandă vaccinarea intramusculară cu vaccin inactivat uleios NEDEVAC sau cu un vaccin inactivat uleios polivalent (ND-SINCOVAC, ND-SINCOGUMBOINVAC, TETRAINVAC).

REAȚII POSTVACCINALE

După vaccinarea prin aerosoli a efectivelor infectate cu germeni condiționat patogeni pot apare fenomene inflamatorii ale aparatului respirator și ale ochilor. Aceste reacții locale dispar în 3-4 zile.

CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează păsările clinic bolnave, cele aflate într-un interval de 10-14 zile față de alte vaccinări sau în perioada de vârf a ouatului.

AMBALAJ

Flacoane conținând 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 sau 3000 de doze.

DEPOZITARE

La temperatura de 2-8°C, ferit de lumină.

VALABILITATE

În limita termenului de valabilitate înscris pe etichetă.

PRECAUȚII

Generatoarele electrice de aerosoli nu trebuie să modifice (încălzească) temperatura diluției de vaccin.

Apa folosită la vaccinare (aerosoli sau apă de băut) va fi lipsită de detergenți, substanțe toxice, dezinfectante, medicamente, încărcătură bacteriană și/sau micotică.

În cazul administrării oculoconjunctivale sau nazale se va calibra picurătorul pentru a se obține 20 de picături dintr-un ml de vaccin diluat.

PRODUCĂTOR



Societatea Națională "INSTITUTUL PASTEUR" S.A.

Calea Giulești nr. 333, 060269, București - ROMÂNIA

tel: 021-220 64 86; fax: 021-220 69 15

e-mail: pasteur@pasteur.ro

Însoțiți orice reclamație cu eticheta produsului.