

NEWVAC LS₇₉

VACCIN VIU CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE (BOALA DE NEWCASTLE)

COMPOZIȚIE

Suspensie de virus Newcastle - tulpina lentogenă LS₇₉ cultivată pe ouă embrionale de găină. Conține minimum $10^{4.6}$ D₅₀/doză.

AȚIUNE IMUNOLOGICĂ

Imunitatea se instalează după 14-21 zile de la vaccinare. Durata și intensitatea imunității depind de vârsta puiilor, starea de sănătate și de întreținere. Condițiile de igienă și de creștere pot influența instalarea imunității.

INDICAȚII

Imunizarea activă contra bolii de Newcastle (ND) la găini, curci, biblici, fazani, porumbei. Tulpina LS₇₉ este mai puțin stresantă decât tulpina LaSota, fiind foarte bine tolerată de pui la vaccinările în masă (aerosoli, apă de băut).

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Vaccinarea se poate face pe mai multe căi:

Oculoconjunctival sau nazal: doza se reconstituie în 0,1 ml diluant (200 doze în 20 ml sau 500 doze în 50 ml). Metoda se recomandă în orice sistem de creștere.

Vaccinarea intramusculară sau subcutană: inocularea se face în mușchii pectorali, coapsă sau s.c. cu 0,5 ml/pasăre adultă din vaccinul reconstituit în diluant (100 doze/50 ml; 200 doze/100 ml; 500 doze/250 ml). Pentru pui și în funcție de seringile din dotare se poate folosi o cantitate mai mică de diluant 0,2-0,3 ml/pui.

Vaccinarea prin aerosoli: se aplică prin reconstituirea vaccinului în apă, în așa fel încât fiecarei păsări să-i revină o doză vaccinală cuprinsă într-o cantitate de apă ce variază de la 0,2 - 2 ml, în funcție de generatorul de aerosoli folosit și de vârsta păsărilor.

Vaccinarea în apa de băut: utilizată în orice sistem de creștere, se efectuează reconstituind vaccinul într-o cantitate de apă care să asigure 20 ml apă/puiul sub vârsta de 30 zile și 30 ml de apă/puiul mai mare (250 doze/5 l; 500 doze/10 l). Înainte de vaccinare pui/găinile vor fi privați de apă 2-4 ore.

Vârsta la care se vaccinează păsările contra pseudopestei respectă următoarea schemă de principiu:

- ▶ prima vaccinare în a 2-a săptămână de viață;
- ▶ a 2-a vaccinare în a 4-a săptămână de viață.

Pentru o protecție îndelungată este necesară revaccinarea. Schemele sunt alcătuite de medicul veterinar în funcție de vaccin și situația epidemiologică din zonă.

În gospodăriile individuale, după primele 2 vaccinări se recomandă revaccinarea pe cale intramusculară cu vaccin inactivat uleios Nedovac sau cu un vaccin inactivat uleios polivalent (ND-SINCOVAC, ND-SINCOGUMBOINVAC).

REAȚII POSTVACCINALE

După vaccinarea prin aerosoli pot apărea fenomene inflamatorii ale aparatului respirator și ale ochilor. Aceste reacții locale dispar în 3-4 zile.

CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează păsările clinic bolnave, cele aflate la un interval de 10-14 zile față de alte vaccinări sau în perioada de vârf a ouatului.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

AMBALAJ

Flacoane conținând 100, 200, 250, 500, 1000 sau 2000 de doze, însoțite de diluantul corespunzător.

DEPOZITARE

La temperatura de 2-8°C, ferit de lumină și îngheț.

VALABILITATE

12 luni.

PRECAUȚII

Generatoarele electrice de aerosoli nu trebuie să modifice (încălzescă) temperatura suspensiilor de vaccin.

Apa folosită la vaccinare (aerosoli sau apă de băut) va fi lipsită de detergenți, substanțe toxice, dezinfectanți, medicamente. Încălzitură bacteriană și/sau micotică.

În cazul administrării oculoconjunctivale sau nazale se va calibra picurătorul pentru a se obține 20 de picături dintr-un ml de vaccin diluat.

PRODUCĂTOR



Societatea Națională
"INSTITUTUL PASTEUR" S.A.

Calea Giulești nr. 333, 060269, București - ROMANIA

tel: 021-220 64 66; fax: 021-220 69 15

e-mail: pasteur@pasteur.ro

Rugăm însoții orice reclamație cu eticheta produsului.