

NOBILIS® IB multi + ND + EDS

VACCIN MIXT INACTIVAT CONTRA BRONȘITEI, PSEUDOPESTEI ȘI SINDROMULUI CĂDERII OUATULUI

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

Descriere

Nobilis IBmulti+ND+EDS se prezintă sub forma unui flacon ce conține un lichid uleios, omogen, de culoare albă.

Compoziție

Fiecare doză de 0,5 ml conține:

IBV M41: ce induce $\geq 4,0 \log_2$ unități VN

IBV 249G: ce induce $\geq 4,0 \log_2$ unități VN

EDSV: ce induce $\geq 6,5 \log_2$ unități IH

NDV: ce induce $\geq 4,0 \log_2$ unități IH pe 1/50 dintr-o doză sau ≥ 50 unități PD₅₀

Mod de acțiune

Vaccinul conține 2 tulpini de virus bronșitic (serotipul M41 și o tulpină variant (249G) ce aparține serotipului D207/D274, o tulpină a virusul pseudopestei și virusul EDS. Imunitatea pentru cele 3 virusuri durează toată perioada de ouat.

Indicații

Vaccinul se recomandă pentru imunizarea reproducătorilor și ouătoarelor contra bronșitei infecțioase, pseudopestei și sindromului căderii ouatului.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave. Vaccinul nu se administrează 2 săptămâni după vaccinarea cu vaccinuri vii și cu 2-4 săptămâni înainte de începerea ouatului.

Efecte adverse

La locul de inoculare poate să apară un mic nodul care se resorbe în timp.

Doze și mod de administrare

Fiecare pasare se vaccinează intramuscular (în piept sau picior) sau subcutanat (pe față dorsală a gâtului) cu 0,5 ml vaccin. Flacoanele de 500 ml sunt pentru 1000 de păsări.

Program de vaccinare:

Nobilis IBmulti+ND+EDS se administrează în jurul vârstei de 14-20 săptămâni (la transfer). Înainte de vaccinarea cu Nobilis IBmulti+ND+EDS, tineretul va fi vaccinat cu vaccinuri vii: antbronșitic și antipseudopesteos. (Pentru EDS76 nu este necesară o primă vaccinare cu virus viu) Efectul imun cel mai bun se obține când intervalul dintre vaccinarea cu virus viu și cea cu virus inactivat este mai mare de 4 săptămâni. În zone cu risc ridicat de infecții cu bronșită și pseudopestă care se manifestă prin reacții serologice intens pozitive, se poate renunța la prima vaccinare cu vaccin viu.

Perioada de așteptare

Carne = 0 zile; Ouă = 0 zile.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe. Nu s-au observat interacțiuni la vaccinarea simultană cu alte vaccinuri Intervet inactivate.

Precauții

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15 - 25°C) și se va agita pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril.

Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatură de 2 - 8°C (la frigider), la întuneric și ferit de îngheț.

Flacoanele deschise se folosesc în interval de 3 ore.

Valabilitate


24 luni de la data fabricației

Prezentare

Flacoane de 500 (250 ml) sau 1000 de doze (500 ml).

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.



A nu se lăsa la îndemâna copiilor

Producător-Ambalator:

Laboratorios Intervet SA, Polígono Industrial, Salamanca, Spania

Proprietar :


Intervet International B.V., Boxmeer-Olanda

Importator și Distribuitor:

Intervet România S.R.L., București,

Șos. Nicolae Titulescu, nr. 88 B, sector 1

Tel: 021.223.40.16/17/18; Fax: 021.223.40.00



[Signature]