

NOBILIS® IB multi + ND

VACCIN MIXT INACTIVAT CONTRA BRONȘITEI INFECȚIOASE ȘI PSEUDOPESTEI AVIARE

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

Descriere

Nobilis IB multi+ND se prezintă sub forma unui flacon ce conține un lichid uleios, omogen, de culoare albă.

Compoziție

Fiecare doză de 0,5 ml conține:

IBV M41: ce induce $\geq 4,0 \log_2$ unități VN

IBV D274: ce induce $\geq 4,0 \log_2$ unități VN

NDV Clone 30: ce induce $\geq 4,0 \log_2$ unități IH pe 1/50 dintr-o doză sau ≥ 50 unități PD_{50}

Virusurile sunt cultivate pe ouă embrionate SPF, inactivate cu formalină și emulsionate cu un adjuvant uleios.

Mod de acțiune

Vaccinul conține tulpinile imunogene de virus bronșitic (serotipul M41 și o tulpină variant 249G, ce aparține serotipului D207/D274) și o tulpină imunogenă, Clone 30, a virusul pseudopestei. Imunitatea pentru cele 3 virusuri durează toată viața economică a păsării.

Indicații

Vaccinul se recomandă pentru vaccinarea de rapel a reproducătorilor și ouătoarelor contra bronșitei infecțioase și pseudopestei.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave. Vaccinul nu se administrează 2 săptămâni după vaccinarea cu vaccinuri vii și cu 4 săptămâni înainte de începerea ouatului.

Efecte adverse

La locul de inoculare poate să apară un mic nodul care se resoarbe în timp.

Doze și mod de administrare

Fiecare păsăre se vaccinează intramuscular (în piept sau picior) sau subcutanat (1/3 inferioară a faței dorsale a gâtului) cu 0,5 ml vaccin. Flacoanele de 500 ml sunt pentru 1000 de păsări.

Program de vaccinare:

Nobilis IB multi+ND se administrează în jurul vârstei de 16-20 săptămâni (la transfer).

Înainte de vaccinarea cu Nobilis IB multi+ND, tineretul va fi vaccinat cu vaccinuri vii: antibronșitic și antipseudopestos. Efectul imun cel mai bun se obține când intervalul dintre ultima vaccinare cu virusuri vii împotriva bolii Newcasttle și a bronșitei infecțioase, și cea cu virus inactivat este mai mare de 4 săptămâni.

În zona cu risc ridicat de infecții cu bronșită și pseudopestă care se manifestă prin reacții serologice intens pozitive, se poate renunța la prima vaccinare cu vaccin viu.

Perioada de așteptare

Carne = 0 zile; Ouă = 0 zile.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe. Nu s-au observat interacțiuni la vaccinarea simultană cu alte vaccinuri Intervet Inactivate.

Precauții

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15 - 25°C) și se va agita pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril.

Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2 - 8°C (la frigider), la întuneric și ferit de îngheț.

Flacoanele deschise se folosesc în întregime în interval de 3 ore.

Valabilitate

24 luni de la data fabricației

Prezentare

Flacoane de 500 ml cu 1000 de doze.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor

Producător-Ambalator:

Laboratorios Intervet SA, Poligono Industrial, Salamanca, Spania

Proprietar :

Intervet International B.V., Boxmeer-Olanda

Importator și Distribuitor:

Intervet România S.R.L., București,

Șos. Nicolae Titulescu, nr. 88 B, sector 1

Tel: 021.223.40.16/17/18; Fax: 021.223.40.00