

NOBILIS® IB + ND + EDS

VACCIN MIXT INACTIVAT CONTRA BRONȘITEI, PSEUDOPESTEI ȘI SINDROMULUI CĂDERII OUATULUI

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

Descriere

Nobilis IB + ND + EDS se prezintă sub forma unui flacon ce conține un lichid uleios, omogen, de culoare albă, cu seringibilitate bună.

Compoziție

Conține tulpinile imunogene ale virusurilor:

- bronșitic (serotipul Massachusetts B.I. cu $\geq 6,0 \log_2$ unități IH);
- pseudopestos (tulpina lentogenă Clona 30 cu ≥ 50 unități PD₅₀);
- sindromului căderii ouatului (EDS '76 cu $\geq 6,5 \log_2$ unități IH).

Virusurile sunt inactivate cu formol și emulsionate cu un adjuvant uleios.

Mod de acțiune

Vaccinul imunizează reproducătorii și ouătoarele față de: serotipul Massachusetts al virusului B.I., virusul pseudopestei și virusul EDS. Imunitatea pentru cele 3 virusuri durează toată perioada de ouat.

Indicații

Vaccinul se recomandă pentru imunizarea reproducătorilor și ouătoarelor contra bronșitei infecțioase, pseudopestei și sindromului căderii ouatului.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave. Vaccinul nu se administrează 2 săptămâni după vaccinarea cu vaccinuri vii și cu 2-4 săptămâni înainte de începerea ouatului.

Efecte adverse

La locul de inoculare poate să apară un mic nodul care se resoarbe în timp.

Doze și mod de administrare

Fiecare pasăre se vaccinează intramuscular (în piept sau picior) sau subcutanat (pe fața dorsală a gâtului) cu 0,5 ml vaccin. Flacoanele de 500 ml sunt pentru 1000 de păsări.

Program de vaccinare:

Nobilis IB + ND + EDS se administrează în jurul vârstei de 16-20 săptămâni (la transfer). Înainte de vaccinarea cu Nobilis IB+ND+EDS, tineretul va fi vaccinat cu vaccinuri vii: antibronșitic și antipseudopestos. (Pentru EDS '76 nu este necesară o primă vaccinare cu virus viu) Efectul imun cel mai bun se obține când intervalul dintre vaccinarea cu virus viu și cea cu virus inactivat este mai mare de 6 săptămâni. În zone cu risc ridicat de infecții cu bronșită și pseudopestă care se manifestă prin reacții serologice intens pozitive, se poate renunța la prima vaccinare cu vaccin viu.

Perioada de așteptare

Carne = 0 zile; Ouă = 0 zile.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe. Nu s-au observat interacțiuni la vaccinarea simultană cu alte vaccinuri Intervet inactivate.

Precauții

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15 - 25°C) și se va agita pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril.

Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2 - 8°C (la frigider), la întuneric și ferit de îngheț.

Flacoanele deschise se folosesc în interval de 10 ore.

Prezentare

Flacoane de 500 ml pentru 1000 de doze.

Flacoane de 250 ml pentru 500 de doze.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nr. și dată Licență: 75825/6 - 29.04.1999

Proprietar-Producător-Ambalator:

Intervet International B.V., Boxmeer-Olanda și / sau Companiile aparținând Grupului Intervet.

Importator și Distribuitor:

Intervet România S.R.L., București,

Șos. Nicolae Titulescu, nr. 88 B, sector 1

Tel: 01.223.40.16/17/18; Fax: 01.223.40.00