



## **NOBILIS® RT+IB multi + ND + EDS**

**VACCIN MIXT INACTIVAT CONTRA RINOTRAHEITEI AVIARE, BRONȘITEI, PSEUDOPESTEI ȘI SINDROMULUI CĂDERII OUATULUI**

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

### **Descriere**

Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS se prezintă sub forma unui flacon ce conține un lichid uleios, omogen, de culoare albă.

### **Compoziție**

Fiecare doză de 0,5 ml conține:

IBV M41:	ce induce $\geq 4,0 \log_2$ unități VN
IBV 249G:	ce induce $\geq 4,0 \log_2$ unități VN
TRT tulpina BUT1#8544	ce induce $\geq 9,5 \log_2$ unități ELISA
EDSV tulpina BC14:	ce induce $\geq 6,5 \log_2$ unități IH
NDV tulpina Clona 30:	ce induce $\geq 4,0 \log_2$ unități IH pe 1/50 dintr-o doză sau $\geq 50$ unități PD <sub>50</sub>

### **Mod de acțiune**

Vaccinul conține 2 tulpini de virus bronșitic (serotipul M41 și o tulpină variant (249G) ce aparține serotipului D207/D274, o tulpină de virus TRT, o tulpină a virusul pseudopestei și virusul EDS. Antigenele sunt încorporate într-o emulsie apă-în-ulei pentru prelungirea stimulării imunității. Imunitatea pentru cele 3 virusuri durează toată perioada de ouat. ✓

### **Indicații**

Vaccinul se recomandă pentru imunizarea reproducătorilor și ouătoarelor contra rinotraheitei infecțioase, bronșitei infecțioase, pseudopestei și sindromului căderii ouatului.

### **Contraindicații**

Nu se vaccinează păsările bolnave. Vaccinul se administrează la minim 2 săptămâni după vaccinarea cu vaccinuri vii și înainte cu 2-4 săptămâni înainte de începerea ouatului.

### **Efecte adverse**

La locul de inoculare poate să apară un mic nodul care se resoarbe în timp.

### **Doze și mod de administrare**

Fiecare pasăre se vaccinează intramuscular (în piept sau picior) sau subcutanat (pe fața dorsală a gâtului) cu 0,5 ml vaccin. Flacoanele de 500 ml sunt pentru 1000 de păsări.

### **Program de vaccinare:**

Nobilis IBmulti+ND+EDS se administrează în jurul vârstei de 14-20 săptămâni (la transfer). Înainte de vaccinarea cu Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS, tineretul va fi vaccinat cu vaccinuri vii: anti ART, antibronșitic și antipseudopestos. (Pentru EDS'76 nu este necesară o primă vaccinare cu virus viu) Efectul imun cel mai bun se obține când intervalul dintre vaccinarea cu virus viu și cea cu virus inactivat este mai mare de 4 săptămâni.

### **Perioada de așteptare**

Carne = 0 zile; Ouă = 0 zile.

### **Incompatibilități și interacțiuni**

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe. Nu s-au observat interacțiuni la vaccinarea simultană cu alte vaccinuri Intervet inactivate.

### **Precauții**

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15 - 25°C) și se va agita pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril.

### **Supradozare**

La doze duble nu apar simptome clinice.

### **Păstrare**

La temperatura de 2 - 8°C (la frigider), la întuneric și ferit de îngheț. Flacoanele deschise se folosesc în interval de 3 ore.

### **Valabilitate**

18 luni de la data fabricației

**Prezentare**

Flacoane de 500 (250 ml) sau 1000 de doze (500 ml).

**Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje**

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor

**Producător-Ambalator:**

Laboratorios Intervet SA, Poligono Industrial, Salamanca, Spania

**Importator și Distribuitor:**

Intervet România S.R.L., ILFOV,

Șos. De Centură nr.27 – 28, com. Chiajna

Tel: 021.223.40.16/17/18; Fax: 021.223.40.00