

ANEXA n. 1



ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobilis Salenvac T vaccin inactivat împotriva *Salmonella Enteritidis* și *Salmonella Typhimurium* utilizat la puii de găină

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanță activă:

Per doză de 0,5 ml:

Celule de *Salmonella Enteritidis* PT 4 inactivate cu formalină: 1×10^9 celule, ce induc ≥ 1 RP*

Celule de *Salmonella Typhimurium* DT104 inactivate cu formalină: 1×10^9 celule ce induc ≥ 1 RP*

Excipienți

Adjuvant: hidroxid de aluminiu :

125 mg

Conservant: thiomersal:

0,065 mg

* RP = potență relativă = media răspunsului imun la testul de potență pe iepuri, mai mare sau egal cu a unui lot de referință a cărui eficacitate s-a demonstrat pe păsări

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă de culoare albă, uleioasă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Puii de găină (reproducție și rase ușoare)

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru imunizarea activă a puilor de găină și pentru imunizarea pasivă a progenilor pentru reducerea colonizării la nivelul cecumului și a excreției prin fecale de *S. Enteritidis* și *S. Typhimurium*.

Imunizarea activă:

Debutul imunității: 4 săptămâni după a doua administrare.

Durata imunității: până la aproximativ 56-60 săptămâni la puii vaccinați la 12 și 16 săptămâni.

Indicații secundare: In cazuri excepționale pot fi vaccinați puii începând cu vîrstă de o zi în scopul de a-i proteja într-un mediu în care există riscul infectării timpurii în faza de creștere (din punct de vedere epidemiologic acest risc a fost indicat de îmbolnăviri recente cu *Salmonella* sau de presiuni infecțioase mari la fermă).

Imunitatea pasivă:

Debutul imunității: prima zi după eclozionare

Durata imunității: cel puțin pana în ziua 14 după eclozionare

Imunitatea pasivă este transferată de la părinți până la vîrstă de cel puțin 59 săptămâni.

4.3 Contraindicații

Nu se utilizează pentru găini în perioada de ouat.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

Nu există studii privind efectul prezenței anticorpilor maternali asupra răspunsului imun la vaccinare. De aceea atunci când situația epidemiologică impune administrarea la puii de o zi, se vor vaccina cu Salenvac T doar puii proveniți din efective de părinți nevaccinate și neinfecțate.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Vaccinarea produce un răspuns serologic la pui care poate interfeza cu programele de supraveghere ce se bazează doar pe teste serologice, fără confirmare bacteriologică. Deci vaccinul nu ar trebui utilizat în cazul monitorizării infecției cu *S. Enteritidis* și/sau *S. Typhimurium* în efective doar prin detectare serologică. Vaccinarea poate produce și reacții încrucișate la testul de aglutinare în placă pentru *S. Pullorum/Gallinarum*. Pentru diagnosticul diferențial ar trebui folosite metode specifice serologice și bacteriologice.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Pentru utilizator:

Acest produs medicinal veterinar conține ulei mineral. Auto-injectarea/injectarea accidentală poate provoca dureri puternice și inflamații, în special dacă injectarea se face în articulație sau în deget, iar în cazuri rare poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu sunt acordate îngrijiri medicale imediat.

În cazul unei injectări accidentale cu acest produs medicinal veterinar, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs. Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului.

Pentru medic:

Acest produs medicinal veterinar conține ulei mineral. Chiar dacă au fost injectate cantități mici de produs, injectarea accidentală cu acest produs poate provoca inflamație accentuată, care poate conduce, de exemplu, la necroză ischemică și chiar pierderea unui deget. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată și spălarea zonei injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Vaccinul conține adjuvant iar în urma vaccinării poate apărea o inflamație temporară la locul inoculării. La puii de 4 săptămâni sau mai mari (ce primesc o doză de vaccin de 0,5 ml), după vaccinare rareori apar mici noduli tranzitorii, palpabili la locul inoculării (ce ating o dimensiune de maxim 1 cm²), evidențiați imediat după vaccinare și care persistă în general doar 1-2 zile. Examenul histopatologic al locului inoculării la 2 și 3 săptămâni după administrarea unei doze unice, a evidențiat asocierea vaccinării cu un răspuns inflamator intramuscular ce presupune infiltrarea locală cu macrofage și limfocite.

Vaccinarea poate fi asociată și cu o stare de letargie, oboseală și șchiopături cu o durată de până la 2 zile.

La puii de o zi (care primesc 0,1 ml) reacțiile sunt mai pronunțate.

Se va avea în vedere că inflamațiile locale postvaccinale sunt în general mult mai evidente decât în cazul administrării a 0,5 ml vaccin la păsări de 4 săptămâni sau mai mari, și rar se poate constata inflamarea întregului picior. Aceste reacții sunt temporare și în majoritatea cazurilor se rezolvă în 7 zile. În mod foarte rar pot fi detectate inflamații până la 15 zile de la administrare. În plus după vaccinare, frecvent de păsări pot prezenta semne de letargie, oboseală și șchiopături precum și o reducere a sporului de creștere.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:



- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul traiului)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)

4.7 Utilizare în perioada de ouat

Nu se utilizează la păsări în perioada de ouat.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu există informații disponibile referitoare la siguranță și eficacitate în urma utilizării simultane a acestui vaccin cu orice alt vaccin. De aceea, se recomandă ca niciun alt vaccin să nu fie administrat în interval de 14 zile înainte de sau după vaccinarea cu acest produs.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Vaccinarea standard:

Injectarea intramusculară a unei doze de 0,5 ml.

Imunizarea activă:

Se vor administra două vaccinări la interval de patru săptămâni.

Vârstele recomandate pentru vaccinare sunt de 12 și 16 săptămâni.

Vaccinarea de urgență (în mediu cu risc epidemiologic mare):

Injectarea intramusculară a unei doze de 0,1 ml la puii de o zi.

După un interval de 4 săptămâni se va repeta vaccinarea cu o doză 0,5 ml.

Imunizarea pasivă:

Se vor administra două vaccinări la interval de patru săptămâni.

Vârsta recomandată pentru prima vaccinare este de 6 săptămâni și pentru vaccinarea secundară la 13-16 săptămâni.

În cadrul programului de control pentru reducerea incidenței infectiei cu Salmonela un rol important îl au și măsurile de igienă și practicile de bună administrație.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Reacții similare cu cele descrise după o singură doză (vezi 4.6), dar mult mai pronunțate după administrarea unei doze duble.

4.11 Timp de așteptare

Zero zile.

5. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE

Vaccin inactivat pentru stimularea imunității active și imunității pasive a progenilor împotriva *S. Enteritidis* și *S. Typhimurium*.

Codul veterinar ATC: QI01AB01

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

Gel de hidroxid de aluminiu

Tris

Acid maleic
Clorid de sodiu
Formaldehidă
Tiomersal
Apa distilată

6.2 Incompatibilități

A nu se amesteca cu niciun alt vaccin sau produs imunologic.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani
După prima deschidere a containerului, se va utiliza în decurs de 10 ore.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 ° C - 8° C)

A se proteja de lumină

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Cutie de carton ce conține flacon multidoze de polietilenă cu densitate mică, de 250 ml sau 500 ml sigilat cu capsulă de aluminiu aplicată peste un dop de cauciuc. Ambalajul și închiderea sunt în conformitate cu Ph.Eur.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5830 AN Boxmeer
The Netherlands

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

14.12.2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE


Importul, vânzarea, eliberarea și/sau utilizarea Nobilis Salenvac T este sau poate fi interzisă în anumite State Membre, pe întregul teritoriu sau pentru anumite zone ale teritoriului acestora, în conformitate cu politica națională referitoare la sănătatea animalelor. Orice persoană care intenționează să importe, să vândă, să elibereze și/sau să utilizeze Nobilis Salenvac T trebuie să consulte autoritatea competentă în domeniul a Statului Membru respectiv, referitor la politicile de vaccinare existente, înainte de a efectua importul, vânzarea, utilizarea și/sau furnizarea.





ANEXA III
ETCETARE ȘI PROSPECT

ANEXAT



A. ETICHETARE

**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU
AMBALAJUL PRIMAR**

Cutie de carton ce conține flacon multidoze de polietilenă cu densitate mică, de 250 ml sau 500 ml.

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobilis Salenvac T vaccin inactivat împotriva *Salmonella enteritidis* și *Salmonella typhimurium* utilizat la puii de găină

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Per doză de 0,5 ml:

S. Enteritidis PT 4:

1×10^9 celule, ce induc ≥ 1 RP*

S. Typhimurium DT104:

1×10^9 celule ce induc ≥ 1 RP*

Adjuvant: hidroxid de aluminiu

Conservant: thiomersal

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă de culoare albă, uleioasă

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Flacoane de 250/ 500 ml

5. SPECII ȚINTĂ

Puii de găină (reproducție și rase ușoare)

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru imunizarea activă a puilor de găină și pentru imunizarea pasivă a progenilor pentru reducerea colonizării la nivelul cecumului și a excreției prin fecale de *S. Enteritidis* și *S. Typhimurium*.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Injectari I.M. cu 0,5 ml

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TEMPORALITATE

Zero zile.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Păstrați flaconul împreună cu prospectul în cutie.

10. DATA EXPIRĂRII

<EXP {lună/an}>

După desigilare/deschidere, se va utiliza în decurs de 10 ore.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C)
A se proteja de lumină

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

13. MENTIUNE „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONE PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar
Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară

14. MENTIUNE „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5830 AN Boxmeer
The Netherlands

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS**

<Serie> < Lot> < BN>{număr}



Alceste



B.PROSPECT

PROSPECT
Nobilis Salenvac T vaccin inactivat împotriva *Salmonella Enteritidis* și *Salmonella Typhimurium*
utilizat la puii de găină

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE
ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL
PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5830 AN Boxmeer
The Netherlands

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobilis Salenvac T vaccin inactivat împotriva *Salmonella Enteritidis* și *Salmonella Typhimurium*
utilizat la puii de găină

**3. DECLARAȚIA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR
INGREDIENTE (INGREDIENȚI)**

Per doză de 0,5 ml:

Celule de *Salmonella enteritidis* PT 4 inactivate cu formalină: 1×10^9 celule, ce induc ≥ 1 RP*

Celule de *Salmonella typhimurium* DT104 inactivate cu formalină: 1×10^9 celule ce induc ≥ 1 RP*

Adjuvant: hidroxid de aluminiu :	125 mg
Conservant: thiomersal:	0,065 mg
Gel de hidroxid de aluminiu	
Tris	
Acid maleic	
Clorid de sodiu	
Formaldehida	
Tiomersal	
Apa distilată	

* RP = potență relativă = media răspunsului imun la testul de potență pe iepuri, mai mare sau egal cu a unui lot de referință a cărui eficacitate s-a demonstrat pe păsări

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru imunizarea activă a puilor de găină și pentru imunizarea pasivă a progenilor pentru reducerea colonizării la nivelul cecumului și a excreției prin fecale de *S. Enteritidis* și *S. Typhimurium*.
Imunizarea activă:

Debutul imunității: 4 săptămâni după a doua administrare.

Durata imunității: până la aproximativ 56-60 săptămâni la puii vaccinați la 12 și 16 săptămâni.

Indicații secundare: În cazuri excepționale pot fi vaccinați puii începând cu vîrstă de o zi în scopul de a-i proteja într-un mediu în care există riscul infectării timpurii în fază de creștere (din punct de vedere epidemiologic acest risc a fost indicat de îmbolnăviri recente cu *Salmonella* sau de presiuni infecțioase mari la fermă).

Imunitatea pasivă:

Debutul imunității: prima zi după eclozionare

Durata imunității: cel puțin pana în ziua 14 după eclozionare

Imunitatea pasivă este transferată de la parinti până la vîrstă de cel puțin 59 săptămâni.



5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează pentru găini în perioada de ouat.

6. REACȚII ADVERSE

Vaccinul conține adjuvant iar în urma vaccinării poate apărea o inflamație temporară la locul inoculației. La puții de 4 săptămâni sau mai mari (ce primesc o doză de vaccin de 0,5 ml), după vaccinare rareori apar mici noduli tranzitorii, palpabili la locul inoculației (ce ating o dimensiune de maxim 1 cm²), evidențiați imediat după vaccinare și care persistă în general doar 1-2 zile. Examenul histopatologic al locului inoculației la 2 și 3 săptămâni după administrarea unei doze unice, a evidențiat asocierea vaccinării cu un răspuns inflamator intramuscular ce presupune infiltrarea locală cu macrofage și limfocite.

Vaccinarea poate fi asociată și cu o stare de letargie, oboseală și șchiopături cu o durată de până la 2 zile.

Se va avea în vedere că inflamațiile locale postvaccinale sunt în general mult mai evidente decât în cazul administrării a 0,5 ml vaccin la păsări de 4 săptămâni sau mai mari, și rar se poate constata inflamarea întregului picior. Aceste reacții sunt temporare și în majoritatea cazurilor se rezolvă în 7 zile. În mod foarte rar pot fi detectate inflamații până la 15 zile de la administrare. În plus după vaccinare, frecvent de păsări pot prezenta semne de letargie, oboseală și șchiopături precum și o reducere a sporului de creștere.

Reacții similare cu cele descrise după o singură doză, dar mult mai pronunțate după administrarea unei doze duble.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Puții de găină (reproducție și rase ușoare)

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Vaccinarea standard:

Injectarea intramusculară a unei doze de 0,5 ml.

Imunizarea activă:

Se vor administra două vaccinări la interval de patru săptămâni.

Vârstele recomandate pentru vaccinare sunt de 12 și 16 săptămâni.

Vaccinarea de urgență (în mediu cu risc epidemiologic mare):

Injectarea intramusculară a unei doze de 0,1 ml la puții de o zi.

După un interval de 4 săptămâni se va repeta vaccinarea cu o doză 0,5 ml.

Imunizarea pasivă:

Se vor administra două vaccinări la interval de patru săptămâni.

Vârsta recomandată pentru prima vaccinare este de 6 săptămâni și pentru vaccinarea secundară la 13-16 săptămâni.

În cadrul programului de control pentru reducerea incidenței infecției cu Salmonela un rol important îl au și măsurile de igienă și practicile de bună administrație.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Flaconul trebuie agitat bine înainte de utilizare.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C).

A se proteja de lumină. A se feri de îngheț.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe etichetă

După prima deschidere a containerului se va utiliza în decurs de 10 ore.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu există studii privind efectul prezenței anticorpilor maternali asupra răspunsului imun la vaccinare. De aceea atunci când situația epidemiologică impune administrarea la puii de o zi, se vor vaccina cu Salenvac T doar puii proveniți din efective de părinți nevaccinate și neinfecțiate.

Vaccinarea produce un răspuns serologic la pui care poate interfera cu programele de supraveghere ce se bazează doar pe teste serologice, fără confirmare bacteriologică. Deci vaccinul nu ar trebui utilizat în cazul monitorizării infecției cu *S. Enteritidis* și/sau *S. Typhimurium* în efective doar prin detectare serologică. Vaccinarea poate produce și reacții încrucisate la testul de aglutinare în placă pentru *S. Pullorum/Gallinarum*. Pentru diagnosticul diferențial ar trebui folosite metode specifice serologice și bacteriologice.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Pentru utilizator:

Acest produs medicinal veterinar conține ulei mineral. Auto-injectarea/injectarea accidentală poate provoca dureri puternice și inflamații, în special dacă injectarea se face în articulație sau în deget, iar în cazuri rare poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu sunt acordate îngrijiri medicale imediat.

În cazul unei injectări accidentale cu acest produs medicinal veterinar, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.

Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului.

Pentru medic:

Acest produs medicinal veterinar conține ulei mineral. Chiar dacă au fost injectate cantări mici de produs, injectarea accidentală cu acest produs poate provoca inflamație accentuată, care poate conduce, de exemplu, la necroză ischemică și chiar pierderea unui deget. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată și spălarea zonei injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

Nu există informații disponibile referitoare la siguranță și eficacitate în urma utilizării simultane a acestui vaccin cu orice alt vaccin. De aceea, se recomandă ca nici un alt vaccin să nu fie administrat în interval de 14 zile înainte de sau după vaccinarea cu acest produs.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Reacții similare cu cele descrise după o singură doză (vezi 6), dar mult mai pronunțate după administrarea unei doze duble.

Incompatibilități A nu se amesteca cu niciun alt vaccin sau produs imunologic.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ



Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru uz veterinar

Flacoane multidoze de polietilenă flexibile, de 250 ml sau 500ml

Importul, vânzarea, eliberarea și/sau utilizarea Nobilis Salenvac T este sau poate fi interzisă în anumite State Membre, pe întregul teritoriu sau pentru anumite zone ale teritoriului acestora, în conformitate cu politica națională referitoare la sănătatea animalelor. Orice persoană care intenționează să importe, să vândă, să elibereze și/sau să utilizeze Nobilis Salenvac T trebuie să consulte autoritatea competență în domeniul Statului Membru respectiv, referitor la politicile de vaccinare existente, înainte de a efectua importul, vânzarea, utilizarea și/sau furnizarea.

