

Anexa ur. 1



ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Noroclav 75 mg comprimate masticabile aromate pentru câini și pisici

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conține:

Substanțe active:

Amoxicilină (ca amoxicilină trihidrat)	60,00 mg
Acid clavulanic (sub formă de clavulanat de potasiu)	15,00 mg

Excipienți:

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat masticabil.

Comprimat rotund, de culoare maro deschis, cu o linie pe una din fețe și pe fața opusă marcat cu „75”

Comprimatele pot fi împărțite în două părți egale.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Pisici și câini.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Tratamentul următoarelor infecții determinate de tulpi de bacterii producătoare de beta-lactamază sensibile la amoxicilină în combinație cu acid clavulanic.

Infecții ale pielii (inclusiv piodermite superficiale și profunde) determinate de specii sensibile de *Staphylococcus spp.*

Infecții ale tractului urinar determinate de specii sensibile de *Staphylococcus spp* sau *Escherichia coli*.

Infecții ale tractului respirator determinate de specii sensibile de *Staphylococcus spp.*

Enterite determinate de specii sensibile de *Escherichia coli*.

Infecții dentare (de exemplu gingivite);

Este recomandat ca la începerea tratamentului să fie efectuate teste pentru determinarea sensibilității. Tratamentul trebuie efectuat numai dacă a fost demonstrată sensibilitate față de această combinație.

4.3 Contraindicații

Produsul nu trebuie administrat la iepuri, hamsteri, porci de Guinea sau gerbili. Se recomandă prudență în utilizarea lor la orice alte erbivore mici.

Produsul nu este indicat pentru cazurile determinate de *Pseudomonas* spp.
Nu se utilizează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la penicilină și alte beta-lactamice.
Nu se utilizează la animalele care au grave disfuncții renale însoțite de anurie sau oligurie.
Nu se utilizează în cazurile cunoscute de rezistență la această combinație.
Nu se administrează la cabaline și animale rumegătoare.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu se cunosc.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Când este posibil produsul va fi utilizat numai având la bază teste de sensibilitate.
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor menționate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la antimicrobienele beta-lactamice și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte clase de antimicrobiene determinată de posibila rezistență încrucișată.

Reglementările oficiale și locale referitoare la substanțele antimicrobiene trebuie luate în considerare atunci când produsul este utilizat.

La animalele cu insuficiență hepatică și renală trebuie să fie evaluate atent cantitățile administrate.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Penicilinile și cefalosporinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) ca urmare a injectării, inhalării, ingestiei sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la penicilină poate conduce la reacții încrucișate cu cefalosporinele și vice versa. Reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi ocazional grave.
Nu manipulați acest produs dacă știți că sunteți sensibil sau dacă ați fost sfătuit să nu lucrați cu astfel de preparate.

Manipulați acest produs cu grijă pentru a evita expunerea, luând toate măsurile de precauție recomandate.

Dacă dezvoltați următoarele simptome după expunere, cum ar fi o erupție cutanată, trebuie să solicitați sfatul medicului și prezentați medicului acest prospect. Umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultăți în respirație sunt simptome mult mai grave și necesită îngrijire medicală de urgență.

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

La animalele tratate pot apărea reacții de hipersensibilitate la penicilină.
Pot să apară ocazional reacții alergice (de exemplu reacții cutanate, anafilaxie). Tratamentul trebuie întrerupt în caz de apariție a reacțiilor alergice.
În cazuri foarte rare utilizarea produsului poate conduce la tulburări gastro-intestinale (voma, diaree, anorexie).

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Până la această dată studiile pe animale de laborator nu au evidențiat apariția de efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxic. Cu toate acestea, deoarece nu au fost efectuate studii asupra pisicilor și cățelilor gestante sau în lactație este recomandat să utilizați produsul numai după o evaluare a balanței beneficiu-risc efectuată de către medicul veterinar.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

Cloramfenicolul, macrolidele, sulfonamidele și tetraciclinele pot inhiba efectul antibacterian al penicilinelor datorită acțiunii bacteriostatice rapide. Trebuie să fie luat în considerare potențialul de reacții alergice încrucișate cu alte peniciline. Penicilinele potențează efectul aminoglicozidelor.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Administrare: pe cale orală.

Rata de dozare: în total 12,5 mg substanțe active combinate/kg greutate corporală (egal cu 10 mg de amoxicilină + 2,5 mg de clavulanat/kg greutate corporală).

Frecvența dozării: Tabelul următor este conceput ca un ghid de administrare a produsului la doza standard de 12,5 mg/kg de două ori pe zi.

Trebuie determinată cât mai precis posibil greutatea corporală pentru a se asigura o dozare corectă.

Greutate corporală (kg)	Număr de comprimate administrate de două ori pe zi
≤ 2	Utilizați comprimate de 50 mg
[2,1- 3,0]	½
[3,1- 6,0]	1
[6,1- 9,0]	1½
[9,1- 12,0]	2
>12	Utilizați comprimate de 250 sau 500 mg

Dacă câinii sau pisicile nu acceptă comprimatele din mâna sau castron acestea pot fi zdrobite și se pot adăuga într-o cantitate mică de alimente.

Majoritatea cazurilor obișnuite răspund la terapie după 5 - 7 zile. În cazul în care nu se observă nicio ameliorare după 5-7 zile, trebuie reevaluat diagnosticul.

În cazurile cronice sau refractare, o perioadă mai lungă de tratament poate fi necesară de exemplu în boli cronice ale pielii 10-20 zile, cistite cronice 10-28 zile, boli respiratorii 8 - 10 zile.

În cazul în care nu se observă nici o ameliorare după două săptămâni, trebuie reevaluat diagnosticul.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Produsul are un grad scăzut de toxicitate la speciile țintă. După supradozarea produsului pot să apară frecvent ușoare simptome gastro-intestinale (diaree, senzație de vomă și vomă).

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: antibacteriene beta-lactamice, peniciline

Codul veterinar ATC: QJ01CR02.

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Amoxicilina este un antibiotic beta-lactamic și în structura acesteia conține inelul beta-lactamic și inel tiazolidin comun pentru toate penicilinele. Amoxicilina prezintă activitate împotriva bacteriilor sensibile Gram-pozițive și Gram-negative.

Antibioticele beta-lactamice împiedică formarea peretelui celular bacterian prin interferarea cu etapa finală de sinteză a peptidoglicanului. Ele inhibă activitatea enzimelor transpeptidază, care catalizează legarea încrucișată dintre unitățile de polimeri glicopeptidici care formează peretii celulelor. Ei

exercită o acțiune bactericidă, dar produce liza numai a celulelor în creștere. Acidul clavulanic este unul dintre metaboliții naturali ai streptomycetului *Streptomyces clavuligerus*. El are o structură asemănătoare cu nucleul penicilinelui, inclusiv deținerea unui inel beta-lactamic. Acidul clavulanic este un inhibitor de beta-lactamază care acționează inițial competitiv, dar în cele din urmă ireversibil. Acidul clavulanic va pătrunde în peretele celular bacterian și se leagă de ambele beta-lactamaze extracelulare și intracelulare.

Amoxicilina este scindată de β-lactamază și prin urmare combinația cu un eficient inhibitor al β-lactamazei (acid clavulanic) extinde gama de bacterii împotriva cărora este activă și include specii producătoare de β-lactamază.

In vitro, amoxicilina potențată este activă împotriva unei game largi de bacterii cu importanță clinica aerobe și anaerobe, incluzând:

Gram-pozițive:

Staphylococcus spp. (inclusiv tulpini care produc β-lactamază)

Streptococcus spp.

Gram-negative:

Escherichia coli (inclusiv cele mai multe tulpini care produc β-lactamază)

Pasteurella spp.

Proteus spp.

Rezistența este demonstrată în rândul *Enterobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa* și *Staphylococcus aureus* meticilino-rezistent.

Câini și pisicile diagnosticate cu infecții de *Pseudomonas* nu ar trebui să fie tratați cu această combinație de antibiotic.

Este raportată o tendință de rezistență la *E. coli*.

Rezistență

Prevalența rezistenței dobândite poate fi crescută la *E. coli*.

Rezistența se dezvoltă în special prin producerea de inhibitor rezistent la beta-lactamază sau hiperproducția de beta-lactamază.

La unele tulpini de *Staphylococcus aureus* (*S. aureus* meticilino-rezistent, MRSA) și de *Staphylococcus pseudintermedius*, rezistența la toate beta-lactamicile este conferită de modificarea proteinelor întâi din peretele celular (peniciline legate de proteine). Acest lucru este adesea asociat cu rezistență la mai mulți compuși antimicrobieni cu rezistență încrucișată.

Pseudomonas aeruginosa și *Enterobacter* spp. pot fi considerate ca fiind întrinsec rezistente la combinație.

5.2 Particularități farmacocinetice

Amoxicilina este bine absorbită după administrarea orală. La câini biodisponibilitatea sistemică este de 60-70%. Amoxicilina (pKa 2,8) are un volum relativ mic de distribuție, un nivel scăzut de legare de proteinele plasmatic (34% la câini) și un timp de înjumătărire terminal scurt datorită excreției tubulare active prin rinichi. După absorbție cele mai mari concentrații se regăsesc în rinichi (urină) și bilă și apoi în ficat, plămâni, inimă și splină. Distribuirea amoxicilinelui la lichidul cefalorahidian este redusă cu excepția cazului în care meningele este inflamat.

Acidul clavulanic (pK1 2,7) este de asemenea bine absorbit după administrarea orală. Penetrarea lichidului cefalorahidian este slabă. Legarea de proteinele plasmatic este de aproximativ 25% și timpul de înjumătărire prin eliminare este scurt. Acidul clavulanic este greu eliminat prin excreție renală (nemodificat în urină).

După administrarea orală a dozei recomandate de 12,5 mg substanțe active combinate/kg la pisici, s-au observat următorii parametrii: C_{max} de 9,17 µg/ml și AUC de 53,27 µg.oră/ml pentru amoxicilină și C_{max} de 2,32 µg/ml și AUC de 13,33 µg.oră/ml pentru acid clavulanic.

După administrarea orală a dozei recomandate de 12,5 mg substanțe active combinate / kg la câini, s-au observat următorii parametri: C_{max} de 8,92 $\mu\text{g}/\text{ml}$ și AUC de 46,29 $\mu\text{g} \cdot \text{oră}/\text{ml}$ pentru amoxicilină și C_{max} de 2,21 $\mu\text{g}/\text{ml}$ și AUC de 8,99 $\mu\text{g} \cdot \text{oră}/\text{ml}$ pentru acid clavulanic.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Amidonglicolat de sodiu, de tip A
Povidonă K30
Pulbere de ficat de porc uscată pulverizată
Extract de drojdie
Dioxid de siliciu hidratat
Stearat de magneziu
Celuloză microcristalină

6.2 Incompatibilități

Nu este cazul.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 15 luni.

Părți de comprimate neutilizate se aruncă imediat.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A se păstra în loc uscat.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Blistere (aluminiu/aluminiu) în cutii de carton cu 28, 56, 224 și 504 comprimate, fiecare blister conține 14 comprimate.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

7. DETINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Camlough Road
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Irlanda de Nord

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA III

ETICHETARE ȘI PROSPECT

Annexa ur. 3

A. ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

{Cutie carton}

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Noroclav 75 mg comprimate masticabile aromate pentru câini și pisici
Amoxicilină și acid clavulanic

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Fiecare comprimat conține:

Amoxicilină	60 mg
(ca amoxicilină trihidrat)	
Acid clavulanic	15 mg
(sub formă de clavulanat de potasiu)	

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat masticabil.
Comprimatele pot fi împărțite în două părți egale.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

28 comprimate
56 comprimate
224 comprimate
504 comprimate

5. SPECII ȚINTĂ

Pisici și câini.

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Citiți prospectul înainte de utilizare.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TEMPORIZARE

9. ATENTIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospecțul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Părți de comprimate neutilizate se aruncă imediat.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe cutia de carton și blister după {EXP}.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: cititi prospectul.

13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ ȘI VEDERE COPILOR”

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Irlanda de Nord

Distribuit de:

SC Maravet SRL

RO-430000, Str. Maravet nr.1

Baia Mare, România

Tel/Fax: +40 262 211 964; E-mail: office@maravet.com

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

BN{număr}

INFORMATII MINIME CARE TREBUIE INSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII

{Blistere}

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Noroclav 75 mg comprimate masticabile aromate pentru caini si pisici
Amoxicilina si acid clavulanic

2. NUMELE DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

Norbrook Laboratories Limited.

3. DATA EXPIRARII

EXP {lună/an}

4. NUMARUL SERIEI

BN{numar}

5. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Annexa ur. 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

B. PROSPECT

PROSPECT PENTRU

Noroclav 75 mg comprimate masticabile aromate pentru câini și pisici

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down,
BT35 6JP
Irlanda de Nord

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Noroclav 75 mg comprimate masticabile aromate pentru câini și pisici
Amoxicilină și acid clavulanic

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDENȚI)

Fiecare comprimat conține:

Amoxicilină	60 mg
(ca amoxicilină trihidrat)	
Acid clavulanic	15 mg

(sub formă de clavulanat de potasiu)

Comprimat rotund, de culoare maro deschis, cu o linie pe una din fețe și pe față opusă marcat cu „75”

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Tratamentul următoarelor infecții determinate de tulpini de bacterii producătoare de beta-lactamază sensibile la amoxicilină în combinație cu acid clavulanic.

Infecții ale pielii (inclusiv piodermite superficiale și profunde) determinate de specii sensibile de *Staphylococcus spp.*

Infecții ale tractului urinar determinate de specii sensibile de *Staphylococcus spp.* sau *Escherichia coli*.

Infecții ale tractului respirator determinate de specii sensibile de *Staphylococcus spp.*

Enterite determinate de specii sensibile de *Escherichia coli*.

Infecții dentare (de exemplu gingivite);

Este recomandat ca la începerea tratamentului să fie efectuate teste pentru determinarea sensibilității. Tratamentul trebuie efectuat numai dacă a fost demonstrată sensibilitate față de această combinație.

5. CONTRAINDICAȚII

Produsul nu trebuie administrat la iepuri, hamsteri, porci de Guinea sau gerbili. Se recomandă prudență în utilizarea lor la orice alte erbivore mici.

Produsul nu este indicat pentru cazurile determinate de *Pseudomonas* spp.

Nu se utilizează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la penicilină și alte beta-lactamice.

Nu se utilizează la animalele care au grave disfuncții renale însotite de anurie sau oligurie.

Nu se utilizează în cazurile cunoscute de rezistență la această combinație.

Nu se administrează la cabaline și animale rumegătoare.

6. REACȚII ADVERSE

La animalele tratate pot apărea reacții de hipersensibilitate la peniciline.

Pot să apară ocazional reacții alergice (de exemplu reacții cutanate, anafilaxie). Tratamentul trebuie întrerupt în caz de apariție a reacțiilor alergice.

În cazuri foarte rare utilizarea produsului poate conduce la tulburări gastro-intestinale (vomă, diaree, anorexie).

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Pisici și câini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare: pe cale orală.

Rata de dozare: în total 12,5 mg substanțe active combinate/kg greutate corporală (egal cu 10 mg de amoxicilină + 2,5 mg de clavulanat/kg greutate corporală).

Frecvența dozării: Tabelul următor este conceput ca un ghid de administrare a produsului la doza standard de 12,5 mg/kg de două ori pe zi.

Trebuie determinată cât mai precis posibil greutatea corporală pentru a se asigura o dozare corectă.

Greutate corporală (kg)	Număr de comprimate administrate de două ori pe zi
≤ 2	Utilizați comprimate de 50 mg
[2,1- 3,0]	½
[3,1- 6,0]	1
[6,1- 9,0]	1½
[9,1- 12,0]	2
>12	Utilizați comprimate de 250 sau 500 mg

Dacă câinii sau pisicile nu acceptă comprimatele din mâna sau castron acestea pot fi zdrobite și se pot adăuga într-o cantitate mică de alimente.

Majoritatea cazurilor obișnuite răspund la terapie după 5 - 7 zile. În cazul în care nu se observă nicio ameliorare după 5-7 zile, trebuie reevaluat diagnosticul.

În cazurile cronice sau refractare, o perioadă mai lungă de tratament poate fi necesară de exemplu în boli cronice ale pielii 10-20 zile, cistite cronice 10-28 zile, boli respiratorii 8 - 10 zile.

În cazul în care nu se observă nici o ameliorare după două săptămâni, trebuie reevaluat diagnosticul.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Trebuie determinată cât mai precis posibil greutatea corporală pentru a se asigura o dozare corectă și pentru a evita subdozarea sau supradozarea.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A se păstra în loc uscat.

Părți de comprimate neutilizate se aruncă imediat.

A nu se utilizează acest produs veterinar după data expirării marcată pe cutia de carton și blister după {EXP}.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Când este posibil produsul va fi utilizat numai având la bază teste de sensibilitate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor menționate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la antimicrobienele beta-lactamice și pot scădea eficacitatea tratamentului cu alte clase de antimicrobiene determinată de posibila rezistență încrucisată.

Cloramfenicolul, macrolidele, sulfonamidele și tetraciclinele pot inhiba efectul antibacterian al penicilinelor datorită acțiunii bacteriostatici rapide. Trebuie să fie luat în considerare potențialul de reacții alergice încrucisate cu alte peniciline.

Penicilinile potențează efectul aminoglicozidelor.

Până la această dată studiile pe animale de laborator nu au evidențiat apariția de efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxic. Cu toate acestea, deoarece nu au fost efectuate studii asupra pisicilor și cățeelor gestante sau în lactație este recomandat să utilizați produsul numai după o evaluare beneficiu-risc efectuată de către medicul veterinar.

La animalele cu insuficiență hepatică și renală trebuie să fie evaluate atent cantitățile administrate.

Reglementările oficiale și locale referitoare la substanțele antimicrobiene trebuie luate în considerare atunci când produsul este utilizat.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Penicilinile și cefalosporinele pot cauza hipersensibilitate (alergie) ca urmare a injectării, inhalării, ingestiei sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la penicilină poate conduce la reacții încrucisate cu cefalosporinele și vice versa. Reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi ocazional grave.

Nu manipulați acest produs dacă știți că sunteți sensibil sau dacă ati fost sfătuți să nu lucrați cu astfel de preparate.

Manipulați acest produs cu grijă pentru a evita expunerea, luând toate măsurile de precauție recomandate.

Dacă dezvoltăți următoarele simptome după expunere, cum ar fi o erupție cutanată, trebuie să solicitați sfatul medicului și prezentați medicului acest prospect. Umflarea feței, buzelor sau ochilor sau dificultăți în respirație sunt simptome mult mai grave și necesită îngrijire medicală de urgență.

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinară trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

Natura și compoziția ambalajului primar

Blistere (aluminiu/aluminiu) în cutii de carton cu 28, 56, 224 și 504 comprimate, fiecare blister conține 14 comprimate.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Amoxicilina este un antibiotic cu spectru larg activ împotriva unei game largi de bacterii Gram-pozițive și Gram-negative. Cu toate acestea, multe bacterii cu importanță clinică produc enzima β-lactamază, care distrugă acest antibiotic. Aceste enzime sunt inactivate de acidul clavulanic, astfel microorganismele devin sensibile la amoxicilină.

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.
SC Maravet SRL, RO-430000, Str. Maravet nr.1, Baia Mare, România, Tel/Fax: +40 262 211 964; E-mail: office@maravet.com